

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLVMINIS XIX. PARS II.

LIPSIAE MDCCLXXIII.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud J. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briaffon, Venetiis apud I. B. Pascali, Patavii apud Io. Manfr ,
Holmiae apud L. Saluium.




I.

Medical Transactions published by the college of physicians in London. Volume the second. London: printed for S. Baker and I. Dodsley. MDCCLXXII. 8. alph. i. pl. I I $\frac{1}{2}$ *).

i. e.

Tractationes medicae, a Collegio medicorum Londinensi editae. Vol. II.

I.

 *De febre hectica.* Auctore GVILIELMO p. i.
HEBERDEN, med. doct. et Reg. societ. soc. **). Agit Cl. Auctor de signis potissimum, quibus febris hectica ab aliis distinguatur, atque tum quaedam de eius cura ex sua ipsius experientia addit. Est febris
N 2 haec

*) Volumen primum harum tractationum indicatum est in comm. nostr. Vol. XVII. p. 195. Versio huius etiam Voluminis iam edita est a Cl. CAROLO CHRISTIANO KRAVSIO, atque praefatio addita, in qua iniustam sui reprehensionem a se remouet, atque quaedam ad nonnullas tractationes commentatur.

**) lecta d. 2. iul. 1768.

haec generatim et diiudicatu et curatu difficillima. Varias enim induit formas, quoad paroxysmorum vim, tempus, exitum, atque alias mutationes. Signum tamen certum huius febris perhibet Noſter, ſi, ſudore finito, febreque continuante, ipſa in febre redeat frigus. Rheumatici dolores aegros, hac febre laborantes, excruciant, praefertim tum, cum ab vlcere, aeri expoſito, orta fuerit febris; aliis ſubito artus ipſumque corpus intumeſcunt.

Praeterea hac febre interdum homines, ſani viſi, ſubito inuaduntur, ita, vt acutae ſimilis videatur: quae quidem paullo poſt vehementia ſua remittat; deinde tamen oſtendat, ab interna cauſſa eam ſuſtineri, cum nunquam fere curari poſſit. Pulsus celeris ſignum eius eſt, et ſemper quidem periculolum: non tamen, pulſu tardo praefente, periculo vacat. Sequitur plerumque glandularum obſtructionem, indeque mulieres quinquaginta circiter annorum frequenter ea occupantur.

p. 12.

Cura, pro varietate cauſſae, diuerſa eſt. In febre, a paruo vulnere, aſam foetidam atque opium laudat. Plerumque ſymptomatis tantum occurrendum; non tamen prorſus deſperandum, cum naturae viae ſint abditae. Ita hecticos a labe visceris abdominalis refert, omnibus remediis fruſtrantentatis, tumere incepiſſe, atque, tumore hoc abſcedente, conualuiſſe: quam naturae viam Auctor imitari tentauit; non tamen eodem cum ſucceſſu. Cortici Peruiano in hac febre vix quidquam tribuit, neque noxium iudicat; ſed balnea adhibere vetat, cum iis febris augeatur, ac mors acceleretur.

p. 18.

2) *Ad pulſus differentias annotationes*, factae ab EODEM *). Frequentiam pulſus, quam in theoria pulſus

*) lectae eodem die.

pulsus et praxi solam sufficere iudicat, Cl. Auctor quibusdam observationibus illustrat; ac primo quidem diuersam eam pro varia aetate determinat, deinde signa, quae ea praebeat, affert. Pulsat infantis neonati arteria tempore vnus minuti primitus centies vel quadragies, sensimque immittitur eius celeritas, donec duodecimo anno numerus pulsuum eodem tempore sit septuagesimus, atque ita fere conueniat cum numero adulti hominis, quem ad octuagesimum accedere cognitum sit.

p. 23.

Si iam pulsus infantis sit pulsibus viginti tardior, quam numerus naturalis primus (130), cerebrum affectum indicatur. In febre inflammatoria si pulsus aduultorum vno minuto primo centesimum numerum superat, periclitantur aegri; nisi abscessu morbus mutetur, vel adsint rheumatismi acuti. Celeritate cito imminuta, reliquis signis malis, morbum cerebrum petiisse apparet. Itaque, quamuis in morbis plerisque celeritas est signum certum periculi: non tamen medicis licet securis esse in pulsu vel naturali simili, vel tardiore, praesentibus aliis grauibus symptomatis. Si pulsuum numerus quadragesimo sit minor vnus minuti primi tempore; non omnes eius ictus sentiri coniicit Noster, cum debilitas pulsus semper sit adiuncta. Pulsuum intermittentem, sine aliis grauibus symptomatis, immerito malum signum haberi iudicat, idque exemplis confirmat, et mulieris, quae pulsu intermittente per vitam praedita, cancroque vteri tandem mortua, nulla laesionis internae signa obtulit; et aliorum, quibus regularis pulsus fuerit signum morbi, reconualescentiae contra rediens pulsus irregularis. Dolore pulsuum accelerari dubitat, exemplis nephriticorum, contrarium ostendentibus.

P. 34. 3) *Relatio de ptyalismo insolito et eius cura*, communicata GEORGIO BAKERO M. D. et soc. colleg. med. et Reg. soc. a IOANNE POWERO chirurgo Polesworthensi in Warwickshire *). Puella, sedecim annorum, teneri habitus, de reliquo sana, mense aprilis 1751 continuo salivae fluxu afficiebatur. Quantitas salivae, per diem excreta, erat varia, ad duas mensuras accedens; qualitate vero, salivae sanae erat similis. Omnibus fere et medicamentis, et regiminis regulis frustra adhibitis, morbus per duo annos eadem vehementia continuabat. Quare Cl. POWERS suspicatus externum corpus huius profluvii causam esse, meatum auditorium externum disquisivit, inuenitque magnam lanæ, ibi repositae, quantitatem: quaeeducta, salivae profluvium sensim quidem imminuebatur; quod tamen, cum, propter consuetum salivae affluxum, aliquamdiu continuaret, Noster ita remouit, ut iuberet aegram panis frustula interdum manducare, ac salivam deglutire.

P. 39. 4) *Historia de ore clauso*, communicata IACOBO HARVEY M. D. S. C. M. et R. S. a D. GUILIELMO CARTER. **) Vocatus Cl. CARTERVS ad aegrum, 27 annorum, sanae constitutionis, cui, postquam vulnere in interno pedis dextri malleolo laesus esset, os clausum ita erat, ut, praeter fluidissima, nihil deglutire posset: inuenit eum adeo spasmis contractum, ut, praeter dicta, etiam crura, et spina dorsi essent immobilia; caput antrosum ductum, et frequenter convulsus: sensibus sanis, appetituque integro praeditus, pulsu naturali paullo tardiore ac pleniore. Adhibitis iam, sine effectu, extracto Thebaico ac magna moschi quantitate: Noster vesicatorium intra humeros applicuit, inunxitque os et

*) lecta eodem die.

**) lecta eodem die.

os et spinam dorsi oleo lateritio, ac purgantem tincturam sacram ialappae cum syrupo rhamni cathartici exhibuit, quolibet tertio die repetendam. Diebus interpositis spatio nycthemeri dedit olei succini guttas triginta, asae foetidae grana viginti, et olei amygdalini vncias quatuor. His medicamentis, per quatuordecim dies exhibitis, aeger ita sanatus est, ut egredi posset, ore primum libero, dein spina mobili, tandem cruribus flexibilibus factis.

5) *Hydrophobiae exemplum*, auctore b. NICO- p. 46.
LAO MVNKLEY. M. D. et Reg. societ. soc. *)
Vir, 36 annorum, die 11 iulii, anni 1760. mordebatur a cane rabido. Medicus praesens venae sectione vncias decem sanguinis emitti curabat, suadebatque, ut ad balneandum mare proficisceretur aeger. Qui, eo profectus, et ibi per decem dies commoratus, balneo solo usus est. Post mensem tristior factus, die 19 aug. difficile deglutiebat. Hoc in statu Noster aduocatus, inuenit aegrum tristem, cute non adeo calente, pulsu debili, oculis turgidis, lingua arida. Aeger morsum canis celabat, ac, cum ei potus praeberetur, vehementer perterritus, confuse exclamauit, id fieri non posse. Atque haec quidem symptomata intra horae spatium exorta sunt. Sequenti die facies magis erat horrida, aegerque continuo tenacissimam exspuebat pituitam, ut exspuendo sonus ederetur. Sensibus tamen omnibus fruebatur, neque falsa in eo obseruabatur imaginandi vis, praeter, quod mentione aquae facta vehementer moueretur atque exclamaret; nunquam tamen, instar canis, mordebatur. Ita ad secundam huius diei postmeridianam horam misere vivebat, qua moriebatur.

N 4

6) *Rela-*

*) lecta die eodem.

p. 59. 6) *Relatio de morbo pectoris*, Auctore G VILIELMO HEBERDEN *). Notatu dignum, quod tamen Cl. Auctor nullibi se descriptum legere meminit, hic describit morbi genus, illudque propter sedem sensumque suffocationis *anginam pectoris* nominat. Qui eo laborare incipiunt non mali quidquam sentiunt, praeter dolorem in pectore tum, cum obambulant; qui, iis quietis, evanescit. Morbo per quosdam menses continuato, dolor hic non protinus desinit; sed cubantibus etiam exoritur, vel interdum etiam stantibus. Plerumque viros, quinquagesimo anno maiores, occupat; exempla tamen et duorum iuuenum, et feminae paralyticae Cl. Auctori obuenerunt. Plerique subito moriuntur; alii ab eo per viginti annos cruciantur. Locus mali est sternum, in quo quidem variat, plerumque ad sinistrum latus vergens, atque interdum cum dolore sinistri brachii coniunctum. Causa eius incerta vel vlcus, vel spasmus videtur: hoc docent et symptomata, et levamen a vino et cardiacis; illud vero aegri confirmant, qui sanguinem exspuunt purulentum, sentiuntque illum e loco effluere affecto. Pulsus morbo durante non turbatur. Opiata, continuo adhibita, maximum lenimen afferunt. Mortuos aperire Cl. Auctor non potuit.

p. 68. 7) *De colica Pictonum*, Auctore R. WARREN, M. D. Reg. societ. et coll. medic. soc. et archiatro **). Egregia sane hac tractatione, ac digna, quae ipsa legatur, a Cl. Auctore enarrantur omnia huius morbi symptomata, pro diuersitate causarum, internarum et externarum varia; signa diagnostica,

*) lecta d. 21 iul. 1768.

**) lecta d. 4 aug. 1768.

stica, et prognostica, addunturque optima remedia: nos quaedam breuiter feligamus. In initio morbi aegri sentiunt dolores circa scrobiculum cordis, atque appetitus iis perit, obstructions aliaque accedunt. His postea auctis, sequuntur vomitus pituitae et biliosae materiae, dolores rheumatici ita omne corpus peruagantur, vt, externis partibus affectis, internae liberae videantur, donec paullo post dolores reuertantur ad priorem et veram eorum sedem. Cum dolores, qui continuo per quasdam horas saeuunt, posteaque vel exacerbantur, vel paullo remittunt, adsunt, musculi abdominales vel sunt nodosi, vel versus spinam dorsi contrahuntur: praeter ea sphincteres et ani, et vesicae contracti excretiones has impediunt. Morbum non antecedit frigus, pulsusque est quietus, ad quartum vel quintum diem, quo acceleratur; quod tamen Cl. Auctor magis vi medicamentorum, quam morbo tribuit. Versus morbi finem pedum articuli et digiti tument, instar podagricorum: accedunt sudores salutare, coniuncti nonnunquam cum exanthematibus; sentiunt aegri tormina, distincta a doloribus colicae: quae sequitur excretio aluina varia: et ita aeger est sanatus. Raro ante sextum diem tollitur morbus; malignus per mensem durat, finiturque vel paralyti extremitatum, vel, aliis grauibz symptomatis praegressis, morte. Differt colica pictonum a dysenteria, quod diutius, sine intermissu, continet, ac tenesmus, qui hanc sequitur, cum illa incipiat.

Primum bibant aegri decoctum calidum chamomillarum, vt vomitus sequatur, quod ter repetatur: deinde dentur tincturae Thebaicae guttae viginti, vncia vna aquae dilutae, vel opii gr. i. idque qualibet secunda vel tertia hora reiteretur. His per

24 horas continuatis, remissione sequente, aegro conueniens nutrimentum praebeatur. Regrediente morbo, priora remedia sunt continuanda, donec tensio abdominis remittat, accedantque signa finis morbi: tum dentur purgantia lenia, quae, si dolor redit, seponenda sunt, opioque continuandum: hinc non cito danda purgantia. Si opiata, per os sumpta non iuuant, clysmata lenientia, addita tinctura Thebacia, sunt iniicienda, addendaque fomenta et alia externa lenientia. Post morbum cauendum frigus. Si obstructio remanet, morbus, ne recidat, metuendum est: hinc remedia, quibus intestina molliantur et laxentur, ad quae pertinent aquae Bathenses, dentur. Venae sectio non instituenda est, neque nimii vomitus excitandi.

His quasdam 32 hominum, simul hoc morbo affectorum, historias subiungit: vnus eorum, initio epileptico insultu afficiebatur, atque, doloribus colicis remittentibus, capite rursus tacto, ac si chorea S. Viti correptus esset, post 14 dies moriebatur: quibusdam os et fauces a materia acri, per vomitum reiecta, erodebantur: alii delirabant: omnes, cum post 4 dies curati viderentur, morbo iterum occupabantur.

p. 90. 8) *Historia et cura difficilis deglutitionis, ortae a spasmu oesophagi*, communicata a THOMA PERCIVAL. M. D. et R. S. S. *) Puella tredecim annorum, tenerae et irritabilis naturae, per quosdam annos difficili laborabat deglutitione: quae, si per quosdam menses cessaret, denovo sine causa euidenti reuertebatur, vt aegra ita plane exsiccaretur. Solida deglutienda ad cardiam vsque facile descendebant, quorsum si venerint, protinus conuulsive reiciebantur; neque fluida retinebantur, nisi

*) lecta d. 9 august 1769.

nisi calida, vel lente et parua in copia deglutita. Conquerebatur aegra de quodam vehementi pruritu ventriculi. Causa huius morbi latebat. Cum Cl. Auctor morbum spasmodicum esse cum tumore oesophagi coniiceret, praecepit interne assumi antispasmodica et resoluentia, quibus mercurium dulcem addebat; extus vero imponi emollientia atque antispasmodica linimentis atque emplastris. Praeter ea disposuit, ut pedes fouerentur, diaeta mollis et nutriens aegrae exhiberetur, corpus leniter moueretur et clysmata nutrientia immitterentur. Cum medicamentum resoluens mercuriale et deiectionem, et erosionem gingivarum salivationemque excitaret, post trium septimanarum usum non ulterius adhibebatur. Reliquis autem per duo circiter menses continuatis, aegra solida deglutire poterat, sicque plane conualuit.

Subiungit quasdam annotationes, quarum prima ostendit, in cura huius morbi diligenter esse inquirendum, an a spasmis, an vero a scirrhus glandularum morbus pendeat: deinde vesicatoria et antispasmodica volatilia hoc in morbo commendat, putatque, electricitatis vim in spasmodicis chronicis oesophagi cerni; tum vapores stimulant, e. g. asae foetidae, in fauces admissos, utiles existimat: ac denique clysteres nutrientes, balnea, emollientibus et nutrientibus repleta, in iis adhibenda suadet, de quorum sanitate pene confectum sit.

9) *De calculis corporis humani tractatio, qua* p. 105. *ostenditur esse eosdem diuersi generis.* Auctore AMBROSIO DAWSON M. D. et coll. medic. soc. *) Quam ipse iam intuitus docet diuersitatem calculorum, eam chemica disquisitione certius cognosci ostendit Cl. Auctor. Usus est ad calculorum

*) lecta d. 15 aug. 1769.

lorum naturam determinandam et lixiuio caustico, facto e salis tartari vncia vna, calcis viuae vnciis duabus et dimidia, vel tribus, et aquae fluuiatilis vnciis viginti quatuor; et spiritu salis marini acido. Cum his separatim instituit experimenta, quae enarrat, et vidit calculos varios, varia ratione ad menstruum solui; alios calculos menstruo alcalino solui et acidum respuere; alios ab acido tangi, in alcalino contra irresolutos manere; quosdam alternantem acidi et alcalini menstrui requirere vim; nonnullos in neutro horum menstruorum solui; esse denique in vno homine calculos oppositi generis. Generatim notat mutationes, in superficie calculorum, qui lixiuio caustico soluuntur, conspiciendas, vt nimirum remaneant in eadem vesiculae paruae, eaque fiat coloris obscurioris, secedantque brunae laminae: tum calculi fiant albidiores, menstruumque colore viridescente desinat. A calculis, acido solutis, minus sedimenti deiciebatur, quam ipse calculus fuerat: hinc suspicari quis posset, aerem fixum constituisse calculum atque auolasse; sed euaporatione edoctus vidit Cl. Auctor, haerere illud solutum in menstruo. Quum igitur tam varia requirantur menstrua, quibus calculi soluantur, diligenter disquirendum est in curatione calculosorum, quatenus sit eorum natura; atque suadet Cl. Auctor, vt plura menstrua quaerantur, quibus calculi solui possint: quibus inuentis, facile etiam inuenire putat rationem, ea corpori humano applicandi.

p. 123. 10) *De morbis hepatis tractatus*. Auctore G V I L I E L M O H E B E R D E N *). Non morbos hepatis solum, verum imprimis mala ex bile deprauata laesioneque in ductibus eiusdem orta, hic experientia

*) lecta d. eodem.

rientia sua cognita et definita, ample satis pertractat Cl. Auctor. Obstructionem ductuum biliferorum frequentem, vix vero semper periculosam iudicat. Deinde agit de origine calculorum, eosque in cystide fellea nasci, vel saltim ibi crescere putat: Tum symptomata obstructorum ductuum refert, pulsusque tardo ab inflammatione distinguit; hocque praesente et dolore ad scrobiculum cordis percepto, icterum secuturum praevideri posse affirmat. Dolor vehementissimus tum sentitur, cum ad intestinum duodenum venerit lapis: qui non, nisi opio dato, mitigatur. Non concedit Cl. Auctor icterum nasci ab infarcto duodeno, vel, quod SYDENHAMVS vult, in hysterico morbo; neque, quod ictericis obiecta lurida videantur. Magnos calculos nonnunquam sine multis incommodis adeste posse putat; naturamque moliminibus mala magna auertere probat exemplo, quo mulier calculum oliuae magnitudine excreuit, posteaque sana facta est.

Iam quaedam icteri symptomata, eorumque p. 137. causas refert; pruritus oritur ab acrimonia bilis commixtae sanguini: interdum icterici ad diarrhoeam sunt dispositi, per quam ab ileo morbo icterus distinguitur: horror cum ictero coniunctus, et bis vel ter per diem rediens, oritur a calculo, in intestinum labente: interdum alimenta amara ictericis videntur. Icterus saepe in iisdem hominibus redit, praesertim si a calculis oritur; raro tamen a calculis ortus icterus periculosus est, sed alii morbi accedunt, qui vitam finiunt.

Inter morbos ipsius hepatis Cl. Auctor inflam- p. 143. mationem et obstructionem lentam considerat: illa, iuncta cum febre, vel morte subita, vel lentiori per suppurationem finitur; haec, orta a scirrho, frequentior est, etiam cum febricula iuncta, et plerumque, accedente hydrope, aegro mortem inducit.

inducit. In obstructione vix dolor sentitur, nisi diaphragma vel aliae vicinae partes etiam affectae sint; aegri vero in humero dextro de sensu doloris conqueruntur. Pessimum signum est in hoc morbo icteri absentia. Morbos hepatis non, nisi in initio, curari posse affirmat. Inflammatione per abscessum finita, neque abscessu in ductum hepaticum vel ad exteras abdominis partes rupto, cum vomitu et odore foedo aegri subito moriuntur. Frequentissima obstructionis causa est abusus spirituosorum: inde tamen aquae Bathenses, quae in aliis ex ebrietate ortis morbis conducunt, in hoc morbo non adhibendae, cum symptomata augeant. Generatim id curandum medico, ut symptomata huius morbi moderentur, debilitetur febris hectica, ac ventriculus roboretur.

p. 153. His subiungit morbos, qui vel a corruptione, vel a nimia bilis copia nasci dicuntur. Non adeo periculosa habet abundantiam bilis, neque metuit, si in febribus lotium vel oculi bile tingantur. In febribus putridis causam a bile deriuandam esse negat, cum bilis nec quantitate, nec qualitate adeo sit deprauata. Plura tamen de his morbis non affert Cl. Auctor, cum ipsi in praxi non obuenerint.

p. 158. Iam ad curam horum morborum accedit. In obstructione ductuum biliariorum dolor leniendus est opiatibus solis, frequenter datis: vomitus, si adest, cum dolorem plerumque tollat, iuuandus; si abest ab initio, statim excitandus est: eo autem diutius protracto, opium exhibendum: purgantia vtilia censet, eaque reliquis praefert, quae blande vim suam exferant. In ictero, cum alio libera coniuncto, id videndum, ne nimia fiat, atque ut ventriculus amaris roboretur; pruritus vehemens opium requirit. In calculis curandis lithontriptica parum vtilia certaue iudicat. Fortissima enim eorum in calculis,

calculis, praeter quandam paucarum particularum solutionem, vix quidquam mutare, neque in vias calculorum venire posse. Eo tamen haec remedia iuuare concedit, vt, loco bilis, alimenta soluant. Reiiicit omnia specifica. Denique addit, biliarias p. 170. concrectiones plerumque causam esse doloris in ventriculo, et chronicae nauseae, sensusque plenitudinis: quam causam diligenter attendi iubet, iudicatque purgantia et vomitoria lenia optimi vsus esse.

II) EIVSDEM *de febre urticata tractatus.* *) Morbum hunc interdum esse periculi plenum iudicat, atque dein symptomata eius, causas, ac morbi historiam recenset. Causas disquirens, ample satis causas externas, quae similem effectum producant, enumerat: oriri interdum hunc morbum asserit ab externo cantharidum, internoque radicis valerianae vsu. Quamquam vero nonnunquam a causa interna nascitur; vix tamen remedia alternantia in cura eiusdem esse necessaria statuit. p. 173.

Morbi historia, communicata a Cl. MONSEY, haec est: vir, triginta annorum, macro corporis habitu, in aere libero solique exposito ambulans, pruritum sensit, qui eo augebatur, vt ardor dolorque accederent: aere libero relicto, morbus cessabat. A solis calore morbus non pendere videbatur: hyeme enim eundem dolorem percipiebat. Balneis salinis frustra vsus est. Cum aliquando ipso medio calidoque die balneum tentare vellet, exutusque ad mare tenderet, ita quidem morbo suo afficiebatur, vt cogeretur in terram se deicere; inde tamen lenimen quoddam sentiebat. Tandem ad Cl. MONSEY accedens, variis resoluentibus, frustra tentatis, mercurio dulci exhibito, cum eo, ad initia saluationis, vsus esset, curatus est. p. 185.

12) *Rabies*

*) lect. d. 15. august. 1770.

P. 192. 12) *Rabies canina, feliciter tractata*, communicata a W. WRIGHTSON, chirurgo *). Cum puer, quindecim annorum, a cane rabido laesus esset, Noster, quinto post morsum die aduocatus, ligatum illum inuenit. Tertia a morfu die puer vomitu affectus erat, sequenti nocte quietus dormiit, comeditque quarto die cum appetitu; postea vero somnolentia captus, postquam per horam dormiit, subito surrexit, rabidusque factus, ignem ipsum arripuit, seque aliosque mordere cupiit, ac latrauisse instar canis dicebatur. Noster igitur, post quatuordecim horas primi morbi impetus accedens, in eo inuenit languidam anxietatem, oppressionemque, atque in faucibus pectoreque sensum suffocationis, ita, ut paroxysmus redire videretur. Sensibus pollebat aeger, pulsu debili, at regulari praeditus, absentibus signis vel inflammationis, vel febris, vel sitis. Aquae, ei propinatae, paruum copiam bibit; paullo post vero eam deglutire non potuit. Crura eius obducta fuerunt crusta tenui, sicca, striis rubris interspersis.

P. 195. Primo venae sectio ad duodecim uncias sanguinis instituebatur, ac, cum inde spasmi minuerentur, tincturae Thebaicae guttae viginti aegro exhibebantur. Postea qualibet tertia hora pilulam ei dedit Noster, in qua opii granum vnum et dimidium continebatur, bolumque, qui confectus esset ex moschi granis quindecim, cinnabaris natiui granis decem, totidemque factitii, qualibet sexta hora assumendum. Extus collo imponebatur camphora, tinctura Thebaica soluta. His per duo dies adhibitis, die tertio spasmi cessarunt, praeter, quod difficilis deglutitio remaneret. Aluo obstructa, clyisma oleosum iniiciebatur: cumque ventriculus bolum non amplius ferret, ille omittebatur, et
opiate

*) lecta d. 15 august. 1770.

opiata pilula mane et vesperi continuabatur. Sequiebantur sudores critici. Urina per omnem morbum turbida et pauca erat. Sanus videbatur aeger, appetitu tantum carebat: quare medicamenta seponebantur, sicque aeger tandem conualuit.

13) Epistola ad D. ADEE, Auctore DANIE-
LE LYSONS *). Agit Cl. Auctor de vi corticis
interni *Ulni campestris* LINN., eamque in morbis
cutaneis cerni, quinque exemplis confirmat. Primum
est scabiei chronicae in muliere, quae autumno orie-
batur, et, per hiemem durans, vere iterum euanesce-
bat. Corticis huius decocto, data bis die mensura vna,
intra mensis spatium curata est. Neque quidquam
adhibitum fuit, nisi semel bolus mercurialis, em-
menagoga quaedam, extusve ceratum commune.
Alius etiam, totus crusta alba leprosa obductus,
cui extremitates tumidae dolebant, atque in qui-
busdam corporis locis pustulae erumpebant, cum
huius decocti dimidiam mensurae partem bis per
diem cum nitro sumisset, ac semel aluum purgan-
te mercuriali euacuasset, cadente post sex dies
omni leprosa crusta, septimanis quibusdam prae-
terlapsis sanus est factus.

Praeterea probat Cl. Auctor, huius remedii
usum, si diu satis continuetur, esse satis certum
exemplis, e quibus illud feminae cuiusdam affe-
ramus, quae exanthematis, vere et autumno rena-
scentibus, erosionibusque manuum ichorosis labo-
rans, decocto hoc, aliquamdiu adhibito, curata vi-
debatur; autumno vero malum reuertebatur. Hinc
mulier remedio diffisa ad tabacum confugit. Cum
autem vere sequenti morbus iterum rediret, de-
cocto

*) lecta d. 31 octobr. 1770.

cocto hoc rursus vsa est eo, vt exanthematà euanescerent; autumnoque decocti vsum prius repe-tebat, quam exanthemata erumperent. Atque ita perfecte est sanata. Decocti proportio haec est, vt corticis interni vlni vnciae quatuor aquae simplicis mensura vna coquantur. Saporis est leniter adstringentis; vere praeparatum, colorem offert purpureum: alio autem anni tempore magis est brunum. Auctor corticem sumsit tenerorum ramorum vel radicum; purgantem vim ei non tribuit. Curatione, ex voto succedente, prius pustulae augeri videntur.

p. 216. 14) *De quorundam fungorum noxiis effectis*, Cl. Auctore W. HEBERDEN *). Fungi, qui habebantur campestris, esi a viro mediae aetatis, muliereque eius, et eorum nato, symptomata haec produxerunt. Vir post 5 minuta rigidus totus, ne oculos quidem mouere poterat; obiecta ei colorem variare videbantur, sentiebatque palpitationem ventriculi, atque totum eius corpus intumuit. Inscius actorum, loqui non poterat. Post 4 horas parum sensit incommodi: sumto, cum iterum aegre se sentiret, vitrioli albi scrupulo vno, ter repetito, vomituque subsequente, in pristinam rediit valetudinem. Mulieri eadem enascebantur mala; diuturniora tamen et per mensem durantia. Laborabat enim sensu caloris grauitatisque in pectore, ventriculo et intestinis, cum simul flatibus et hysteriacis passionibus subdita esset. Puer, cum parum comedisset, aliquos tantum sensit spasmodicos affectus. Nulla generatim aderant signa acris veneni. Fungi dicuntur fuisse ad RAII synopsis duo, 1) Fungus parvus pediculo oblongo, pileolo hemisphaerico, ex albido subluteus; 2) Fungus minimus,

*) lecta d. 31 octobr. 1770.

mus, e cinereo albicans, tenui, at praelongo pediculo, paucis subtus striis.

15) *Historia hydrophobiae*, Auctore Cl. FALP. p. 221.
KENERO, chirurgo Southwellensi in Nottinghamshire *). Morfa a cane mulier, postera die, omnibus rabiei caninae symptomatis affecta, curata est solo fere mercurii usu. Praemisit Cl. Auctor venae sectionem, fricuitque partem laesam unguento mercuriali. Interne dedit bolum, factum ex turbethi mineralis granis tribus, tantundem camphorae, cum conferua cynosbatorum. Bolo per quatuor dies mane sumto, morbus continuo augeri visus est; quinto vero die sensus redierunt, nec paroxysmi adeo saevierunt. Cum ei aqua porrigeretur, respuit eam abhorrens: reiterata autem, etiam in spina dorsi, frictione, bolique usu continuato salivatio excitata est. Atque tum mulier revaluit.

16) *Relatio methodi correctae, magnesiæ albam parandæ*, Auctore THOMA HENRY Pharmacopoeo Manchestrensi, communicata a RICHARDO WARREN M. D. etc. **). Magnesiæ, quae vulgo adhibeatur, aut male esse paratam, aut, quod etiam peius est, creta vel calce remixtam putat Cl. HENRY. Hinc methodum offert, quae puram, albam, insipidam atque fere impalpabilem praebeat magnesiæ.

Est vero ea haec: sal catharticum amarum Epfomense solvatur in aequali aquae pondere; filtratur et sensim addatur solutio cinerum perlarum, quae leniter agitentur, donec inter se coagulae-
rint. Deinde protinus fundatur mixtura in vas,
O 2 aqua

*) lecta d. 31 octobr. 1770.

**) lecta d. 2 septembr. 1770.

aqua bulliente plenum, coquatur per quartam horae partem, ac tum refundatur in vas fictile, vitrea crusta obductum. Tum, puluere subsidente, aqua decoletur, eaque rursus feruida infundatur: quibus eo usque repetitis, donec liquor careat sapore salino, agitetur pulvis, ut subtiliores supernatent particulae; sicque decantetur in aliud vas, separataque aqua e magnesia, haec super cretam ponatur, ut aqua infugatur; post magnesia chartae includatur atque ad ignem siccetur. Ita etiam reliqua pars magnesia tractetur, obtinebiturque aequae subtilis pulvis. Quo maior aquae copia, eo succedit celerius paratio: multumque interest, ut aqua sit pura, celeriterque siccetur pulvis.

p. 235. 17) *Quaedam insolita exempla de curatione hydro-
pis*, collecta et communicata a GEORGIO BAKER, M. D. etc. Eo exempla, hic collecta, redeunt, ut doceant, copiosum potum, qui a multis noxius in hydrope habeatur, si aegri eum appetant, saepe hunc morbum tollere. Primum, a Cl. RHODIO communicatum, est viri ascitici, septuaginta annorum, qui morbo ita affectus erat, ut morti proximus videretur: hinc, ut vitam miseram leniret, quotidie bibit aquae frigidae mensuram unam et dimidiam. Atque hac quidem, per quatuordecim dies pota, symptomata usque aggrauabantur; tum vero, cum aqua et per alium, et per urinam excerneretur, aeger sanabatur. Aegra, cuius historiam Cl. HUNNIVS tradit, idem fere confirmat. Erat ea annos nata viginti, cum hydrope infestaretur: in quo morbo, multis incassum adhibitis, siti admodum cruciata aegra bibit tenuem ex arbitrio cereuisiam. Inde cutis findebatur, atque, magna aquae quantitate effluxa, sanitati aegra

*) lecta d. 9 septembr. 1771.

aegra quidem restituebatur; tandem tamen iterum incidebat in hydropem, quo etiam moriebatur. Reliqui duo aegri, vino pomato, largiter epoto, curati sunt; prior erat mulier, a partu praeternaturali, nimiaque lochiorum effusione hydropica facta; posterior, vir mediae aetatis, qui ex intemperantia sibi hunc induxerat morbum.

Alia hydropis curati historia a Cl. MVDGE p. 250. communicata, subiungitur. Mulier quaedam sensim increfcente hydrope affecta erat, qui, cum Cl. MVDGE aegram videret, iam per septemdecim annos eam occupauerat. Abdomen ita expansum erat, vt ascitico simillimum videretur; durities tamen eiusdem metum Nostro, vt et aliis medicis, iniecit, esse viscus quoddam scirrhosum. Quare nihil in ea curanda ausus est. Post duo annos, cum aegra rheumaticis doloribus in regione lumborum occuparetur, dabatur ei pulvis DOVERI, compositus maximam partem ex ipecacuanha et opio, eum quidem in finem, vt diaphoresis promoueretur. Sumto vero hoc puluere altera vice, aegra non solum dolorum lenimen sensit; sed etiam per lotium magnam aquae quantitatem eiecit, quod etiam secutum est, cum tertia vice puluerem sumeret. Atque sic hydrops, qui viginti propemodum annos durauerat, intra quadraginta et octo horas casu plane est curatus.

18) *Morbus Thomae Wood, molitoris Billerica- p. 259.*
*gensis, communicatus ab EODEM *).* Diaetam recte
 ordinatam, iustamque abstinentiam in morbis ma-
 ximi esse pendendam; putat Cl. BAKER hoc exem-
 plo probari. *Wood* enim ille dictus, a virili aetate
 gulae indulgens, quadragesimo aetatis anno admo-
 dum obesus redditus, quadragesimo secundo multis
 O 3 morbis,

*) lect. d. eod.

morbis, rheumatismis, insultibus arthriticis, epilepticisque, praesertim terribili suffocationis sensu laborabat. Quibus omnibus, diaeta sensim correctâ, paullatim quoque liberatus est. Qua adeo parcatandum usus est, ut cibo tantum vesceretur, qui ex pane bis cocto, et lacte pararetur, omnique potu, etiam aqua abstineret, motum corporis frequenter exerceret, somnoque ultra 6 horas non indulgeret. Insigni hinc animi hilaritate corporisque viribus fuit praeditus; perspirationem non percepit; pulsus eius tardus fuit, quadragies per minutum primum pulsans; urinae mensuram unam et dimidiam, ambrae instar coloratae, per diem excrevit: aluum semel duobus diebus euacuavit, ac frigoris tempestatumque vim non sensit.

P. 275.

19) *Observationes ad methodum hodiernam insitionis variolarum*, Auctore EODEM *). Observationibus et experientia sua continuata supplet hic Cl. Auctor, quae in prima tractatione deerant, ut ea, quae incerta et obiectioni subdita sunt, ex methodo insitionis expungantur; ea contra, quae insitionem corrigant, dignaque sint, quae assumantur, magis appareant. Quare primo disquirat, quatenus praeparatio generalis, neglecta aetatis, corporis habitus, et anni tempestatis ratione, ante insitionem per experientiam excusari queat. Atque hanc quidem generatim reprobendam esse et ratio, et experientia satis docent. Mercurium, quem tamquam praeparans, vi specifica praeditum, multi laudant, Ipse etiam Cl. Auctor in iis, ubi non aderat quoddam contraindicans, ut utile purgans dedit; non tamen ei, qua mercurio, vim quandam tribuit, sed potius in euacuatione ponit usum.

Cum

*) lect. d. 19 Sept. 1771.

Cum vero Cl. GATTI *) omnem praeparationem reiiciat; Noster mediam viam eligit, atque ad aegros attendi iubet, a quorum natura appareat, sintne euacuationes necessariae, an vero noceant. Deinde modum variolas inferendi diiudicat, eumque optimum censet, qui sit simplicissimus, et sola acu fiat, ommissis omnibus emplastris. Ita enim non mala solum externa, a perspiratione suppressa oriunda, esse abfutura; sed etiam certius praedici posse, sitne aeger a metu infectionis liber, nec ne, omnesque morbi mutationes quotidie ita attendi. Etsi non multum intersit, an pus crudum vel maturum adhibeatur; fluidum tamen et recens praefert.

Tum ipsam aegros in variolorum morbo tra- p. 292.
standi rationem definit. Ab initio purgantia, et fortiora, et saepius repetita, prout res requirunt, omninoque antiphlogistica medicamenta danda esse, frigidumque regimen tenendum. Diaphoretica et calida medicamenta igitur reiicit cuncta, neque illa indicari recte censet per lenem perspirationem, quae sit signum variolarum benignarum: eam enim prius vix sentiri nouimus, quam febre quodam modo remittente. Eruptione facta, praefertim si pustulae sunt copiosae, anodyna vtiliter dari dicit; SYDENHAMO tamen hic non credendum, qui liquido laudano nimis tribuit: opio enim raro, et non, nisi in summis doloribus, vtendum existimat Cl. Auctor. Iterum purgantium cautum vsum laudat; monet tamen etiam de cauendo eorum abusu, vnde plurima, praesertim tabis mala sequantur. Postea etiam liberi aeris accessum, de quo in priori tractatione amplius egit, vtilem praedicat: interim nimio eius vfu contagium diffundi

O 4

notat.

*) vid. EIVS D. réflexions sur la pratique de l'inoculation.

notat. Praeterea probat, variolos insertos prius finiri, quam naturales, confirmatque idem exemplis matrum lactantium, variolis infectarum; quarum infantibus quarto post eruptionem die varioli inferebantur, iique solito tempore morbo sanati sunt: matres vero postea variolis mortuae.

p. 311. De grauidarum mulierum, lactentiumque infantum insitione dubium euentum esse docet. Interdum quidem rem fauste successisse; nihilo tamen fecius, cum plures etiam moriantur, tentamen videri periculi plenum. Quod illustrat casus, qui Ipsi obuenit. Mulier sana, per sex menses grauida, cum ei varioli infererentur, symptomatis sat leuibus, pustulisque non adeo multis occupabatur, vsque ad diei quarti ab eruptione vesperam: qua abortus symptomata oriebantur, eique per subitam violentamque haemorrhagiam vitam eripuerunt. Non consentit cum Cl. MEAD, qui infantes liberos a variolis censet, si matres grauidae iis laborant, neque, quod infantes in vtero variolis ipsi infectentur.

p. 320. His subiungit quasdam quaestiones, aliis solendas. 1) cur, si nostri varioli conueniant cum Arabum variolis, RHazes et alii nihil dixerint de contagio, et de eo, quod semel tantum homines occupent? 2) Vnde pendeat diuersus effectus vnius variolorum miasmatis, naturalis vel per insitionem, vtrum a miasmatis ipsius natura, an a parte prius infecta? 3) cum quaedam sit similitudo inter virus variolosum et venenum animalium rabidorum, atque in vtrisque inflammatio antecedit communicationem cum reliquo corpore; vtile iudicat, partem affectam excidere ante communicationem.

18) *Relatio quorundam insolitorum morborum*, p. 325.

Auctore DONALDO MONRO M. D. etc. *)

1) *Insolitus scorbutus*. Vir, nouemdecim annorum, satis apta, animali tamen vsus diaeta, postquam patriam mutasset, vtereturque parco corporis exercitio: post dimidium fere annum occupabatur lassitudine ex minimo motu, faucium tumore, haemoptysi, rubrisque maculis intus in labiis, et genis; vuula, velum palati, lingua, et superficies interna buccarum erant nigra: quod ex nigro, congrumatoque sanguine proficiscebatur. Pulsus satis plenus et fortis; omneque corpus nigris maculis repletum. Noster statim venae sectionem instituere iussit, atque bibere mixturam salinam nitrosam, sequentique die aluum purgare. Atque, cum animaduerneret esse verum scorbutum, morbumque celerrime increfcere, diaetam omnino vegetabilem praescripsit, aliaque iunxit remedia salina, quibus addidit corticem Peruuianum. Morbus tamen semper increuerat, per mensem vsque: quo symptomata omnia celeriter cessarunt, aegerque non diu post sanatus euadebat.

2 et 3) *Venereorum ulcerum, et cariei in vertebrae colli historiae*. p. 337. Prima concernit virum, cui, gonorrhoea male curata, glans omnis exedebatur, totusque penis ad insignem intumuerat crassitiem, vlcerebusque erat obsessus. Is, cum mercurii, corticis Peruuiani, qui insigne alui profluuium excitauerant, aliorumque remediorum balsamicorum et cicutae, atque diaetae lacteae, inprimis sacchari vsus esset irritus, vlcerebus semper incrementibus adeo, vt tandem musculos exederent, haemorrhagia, quae ex arteria epigastrica, a cancro erosa, sequebatur, mortuus est.

*) lecta d. 4. decembr. 1771.

- p. 345. Altera continet viri quadragenarii morbum: qui, cum ante quosdam annos venereo morbo laborasset, postea febre hectica affectus est, doloreque vehementi in collo. Mortuus offerebat praeter pulmonum vlcera, abscessumque in cerebro, cariem primae vertebrae et ex secunda processus odontoidei.
- p. 348. 4. *Febris intermittens pertinax.* Febris haec, quae militem per duo annos vexauit, omnibus remediis, amaris, etiam cortici Peruuiano resistebat, donec, mercurio dato, saluatio excitaretur: qua finita, et cortice nutrienteque victu, dato aeger sanatus est.
- p. 353. 5. *Tumor cerebri, per os frontis protrusus.* Supra supercilia viri cuiusdam tumor, duos pollices latus, dimidiumque eleuatus, oriebatur a causa ignota: pulsabat, atque pressus dolores stuporemque excitabat; perforabat os frontis, cuius latera cariosa inde erant reddita. Nihil, quod ad eius curam spectaret, tentari poterat; sed aeger paullo post, aucto tumore, mortuus est: atque inuentum cerebrum e situ suo locatum, quod hunc tumorem effecerat.
- p. 358. 6. *Hydrocephalus.* Infantem, decem annorum, hydrocephalo enormi affectum refert, cuius ambitus sit duorum pedum atque quatuor pollicum, et longitudo octo pollicum. Interim infans sensu memoriaque pollet, ambulareque potest. Febris vero vel minima illum laedit.
- p. 361. 7. *Ossificatio in mesenterio.* Mulier sana, mense ante mortem, horroribus infestabatur, qui, dato cortice, euanuerunt: sanguinem postea expuit, sudoresque experiebatur colliquatiuos, diarrhoeamque, qua moriebatur. Post mortem aperta ostendebat pleuram pulmonibus concretam, pureque repletam cauitatem. Glandulae meseraicae
omnes

omnes erant induratae et plurimae etiam offi-
ficatae, constantes e pluribus lapillis, membrana
inuolutis. Ileum atque coli initium intumuit, in-
timaque eius tunica sphacelo tacta reperiēbatur.

19) *Relatio feliciter succedentis insitionis vario-* p. 366.
lorum in Iamaica, scripta a IOANNE QVIER me-
dic. practico ibidem, ad D. DONALD MONRO).*
Methodum inferendi exercuit Cl. Auctor, quae no-
uiter recepta est, vt regimen frigidum simul ob-
seruetur; praeparatio tamen retineatur: atque
ita quidem plurimos aethiopes curauit. Generatim
adultos aequae feliciter, atque infantes, atque
gravidas primis mensibus prospere inoculationem
subire monet. Sicque eodem successu eam admi-
nistrari refert in venereis, elephantiasi, morbis
cutaneis, vlceribusque inueteratis affectis. Insuper
affirmat morbosorum horum variolos fuisse mitio-
res iis, qui in sanis exorti sunt. Vsum vero mer-
curialium et purgantium in illis necessarium esse.
Victu utebantur aegri vegetabili, sique mercurio
saluatio excitari videbatur, similia vel oryza iis
praebebatur. Ex medicamentis, quae ad praepa-
rationem adhibentur, mercurio dulci et tartaro
emetico plurimum tribuit. Frequentes purgatio-
nes aethiopes ad hydropem ducere refert.

Nihil interesse putat, sitne pus ex bonis, an ex p. 393.
confluentibus pustulis desumptum, quin imo in po-
steriori casu fuisse pauciores variolas. Repetendam-
que iudicat insitionem, si post septem dies nulla
indicia fuerint inflammationis. Si inferuntur va-
rioli in hominibus, qui eos iam contagio accepe-
runt; nulla inde sequuntur damna. Emplastris
tum demum utitur Cl. Auctor, cum vlcera oriun-
tur. Quo citius et vehementius oritur inflamma-
tio,

*) lecta d. 14 decembr. 1771.

tio, eo facilius succedit morbus. Interdum facies, pectus, imo totum corpus et extremitates ante eruptionem variolorum obsessa sunt exanthematis, quae ab usu mercurii proficiscuntur. Tum igitur hunc seponendum esse patet; adhibenda contra antiphlogistica, liberoque aeri corpus exponendum. Disputat deinde de infectione, atque signum eiusdem dicit sensum prurientem axillarium glandularum: illosque, qui semel variolis laborarunt, liberos ab iis dicit.

P. 414. His subiungit alios quosdam cum variolis coniunctos morbos, ut ophthalmiam siccam, impetiginem et erysipelas, quorum curam simul addit.

P. 420. 20) *Observationes de veneno plumbi continuatae* *), Auctore GEORGIO BAKER. M. D. etc. **) Confirmantur hoc tractatu noxae, quae ex usu plumbi oriuntur. Potissimum et Cl. Auctor, et alii, qui observationes cum Eo communicarunt, viderunt post usum vini pomati, quod in vasis plumbeis repositum fuisset, vehementissimam colicam secutam esse, manusque pedesque non moueri potuisse. Idem comprobat usus saturninorum, quae intus sumpta dolores in intestinis, colicam, atque alia plurima mala excitauerunt, quod Cl. Auctor et aliorum probat testimonio, et sui ipsius experientia confirmat. Morbus Indorum ab eadem pendet causa, cum potum acidum vasis plumbeis seruent, atque etiam saccharum his in vasis paratur. Quare omnino plumbi usum et medicum externum Cl. Auctor reiicit. Effluvia plumbi esse venenata typographorum exemplo illustrat, qui, cum plumbeos calidosque typos imprudenter attingunt, paralyfi contra-

*) vid. medical Transact. Vol. I. p. 175. comm. nostr. Vol. XVII. p. 203 seqq.

**) lecta die. 11 Decembr. 1771.

contractioneque digitorum afficiuntur; hoc tamen in nostris terris, vbi frigefacti adhibentur typi, non valere cum Cl. KRAVSIO traduttore monemus. Eadem iis oboriuntur mala, qui specula parant.

Cura prophylactica consistit in vsu nutrimenti p. 456. vnciuosi lubricantisque; curatoria vero requirit euacuantia lenia, satis tamen agentia: plurima diaetae regimen, praecipue lactis sobrius vsus, praestat; in ipso paroxysmo opio vtendum. Aperti post mortem, qui colica laborauit, refert historiam; cui omnia viscera infimi ventris, praeter paruas concretiones in vesicula fellea, sana fuerant. Cerebri substantia reperiiebatur solito mollior, et sanguinis dimidia vncia extra vasa missa erat. Musculi fere plane destructi.

21) *Relatio duorum exemplorum veri scorbuti*, p. 471. *qui ortus erat ex defectu conuenientis alimenti*, Auctore FRANCISCO BILMAN M. D. et Cl. RADELIFFE communicata per Cl. BAKER *). Mulier quadragenaria lassitudine insigni vagisque per totum corpus doloribus occupabatur: dyspnoea praeterea laborabat, pulsu debili celerique, lingua bruna, faucibus spongiosis, sanguinem mox fundentibus, halitu foetido, omnique corpore emaciato, ita, vt pedum cutis, maxime rigida, tactu creparet. Pedes vlceribus pleni, atque, vti et antibrachium, crusta obducti. Post quemlibet motum tota fere obrigescebat. Iisdem symptomatibus morbi scorbutici affecta erat eiusdem soror; non tamen eodem in gradu. Ortus erat hic morbus a misera viuendi ratione, cum his mulieribus praeter theae potum, panisque vsu nihil datum esset. Curatae sunt aegrae, cum serum, ex herbis antiscorbuticis paratum, biberent, ac diaeta lactea cum malis

*) lecta eod. die.

malis aurantiis vterentur, et corticis Peruuiani tres drachmas per diem fumerent.

P. 486. 22) *Exemplum hydatidum, quae tussi eiiciebantur, relatum a IOANNE COLLET. M. D. communicatum et annotationibus auctum a D. BAKER *)*. Mulier, 33 anorum, tussi afficiebatur, qua, cum per quatuor annos grauibz fat symptomatis stipata durasset, tandem spatio quatuor mensium, 135 hydatides, variae magnitudinis eiiciebantur. Hydatides eiectae ruptae erant, nulla tamen, praeter tenacem pituitam, eas vel antecesserat, vel sequebatur aqua. Tumor quosdam ante morbum menses in inferiori regionis epigastricae parte oriebatur, extensus ad dextrum hypogastrium: omneque praeterea abdomen distensum, ac faccis refertum erat. Vsa est mulier pilulis resoluentibus ex gumi saponaceis et squilla compositis, atque mercurii dulcis paruum dosim assumpsit; quibus remediis ita restituta est, vt lectum relinquere posset, omnemque praeberet spem melioris valetudinis.

P. 492. Annotationes Cl. BAKERI hydatides in duas diuidunt species, alias regulariter quasi organisatas, et cum vasis per pedunculos nexas; alias cystidi communi inclusas, atque plerumque hepatis vicinas. Posterioris speciei hydatites, prius descriptas, fuisse affirmat, ac coniicit viam ex cystide per morbum effectam fuisse ad tracheae ramum.

P. 499. 23) *Quaestiones Auctore GVILIELMO HERDEN **)*. I. Cum crusta inflammatoria et in multis morbis inflammatoriis absit, et ex aliis causis oriatur, Auctor ad quaestionem, an eius praesentia methodum curandi dirigat, ita respondet,

*) lect. d. 14. decembr. 1771.

**) lect. d. 21 iul. 1768.

det, vt huic signo parum vel prorsus nihil tribuendum; sed ad alia symptomata respiciendum censeat.

2. Deinde negat symptomata periculosa her- p. 506.
niae incarceratae nasci a praeternaturali strictura
aperturae tendineae in musculo obliquo superiori.
Nam et dolores alio in loco sentiuntur, et proba-
bilius est, sequi symptomata ab intestinorum, per-
uerse positorum spasmo, quod comprobant auxilia
a balneis calidis, vsusque remediorum purgantium
per clysteres salutaris. Generatim in hoc morbo
vtilem inuenit Cl. Auctor copiosam et repetitam
venaesectionem, vsum balneorum calidorum reite-
ratum, vesicans abdomini applicatum, per clyste-
rem iniectum tabaci fumum, pilulas ex extracto
catarthico, iuncto opio, factas, atque solutionem sa-
lis catarthici.

3. *) *Dubitat de noxis camerarum, vestimentorum* p. 521.
ac lectorum humidorum, atque eas impuritati vapo-
rum tantum tribuit, multisque exemplis probare
annititur tantum abesse, vt aer humidus noceat,
vt etiam saepius sit salutaris. 4. *Aperiendae venae* p. 529.
in haemorrhagiis **) vsum in dubium vocat, cum
arteriae magnae per eam non contrahantur, paruae
vero per se concidant: aliaque laudat, frigidum
aerem, quietem, nutrimentum parcum, potum
acidulum opiata atque purgantia. Hinc tamen
nondum sequi cum Cl. KRAVSIO putamus, ve-
naesectionem in haemorrhagiis omnino esse ne-
gligendam.

*) lect. d. 15 august. 1770.

**) lect. d. 11. decembr. 1771.

II.

Vermehrtes und verbessertes Blackwellisches Kräuterbuch etc. Fünftes hundert, mit einer Vorrede Herrn D. C. I. TREWS; verlegt, gemahlt und in Kupfer gestochen von Nic. Fridr. Eisenberger. Nürnberg. 1765. fol. Text. plag. 20. Sechstes hundert, oder Beytrag zum blackwellischen Kräuterbuch; eine Sammlung der Gewächse, welche zum Arzneygebrauch in den Apotheken aufbehalten werden, deren Beschreibung und Kräfte angegeben, die Abbildungen grösstentheils nach der Natur gemacht, und alle Arten mit bewährten Nahmen der Kräuterlehrer erläutert sind: mit einer Vorrede Herrn D. CHRIST. GOTTL. LUDWIG herausgegeben, gemahlt, und in Kupfer gestochen, von Nic. Fridr. Eisenberger. Nürnberg 1773. fol. Text. plag. 20½. praefat. pläg. 1.

h. e.

Herbarium Blackwellianum emendatum et auctum etc. Centuria Vta: cum praefat. D. C. I. TREW; excudit figuras pinxit, atque in aes incidit Nic. Frid. Eisenbergerus. Nürnberg 1765. Centuria VIta: siue Herbarii Blackwelliani Auctuarium; cum Praefat. D. CHRIST. GOTTL. LUDWIG ibid. 1773.

Et si aliquoties nouae huius Herbarii editionis mentionem fecimus *); denuo tamen quaedam de eadem referre debemus, inprimis, cum opus
nunc

*) vid. commentar. nostr. vol. II. p. 73. vol. VI. p. 146 et vol. IX. p. 103 sqq.

nunc fit plane confectum atque absolutum. Blackwellianum textum ex Anglica in Latinam linguam translatum, nomina plantarum synonymica copiose apposita, plantas descriptione accurata illustratas, ipsasque delineationes fere omnes emendatas, et iconibus, quae floris fructusque speciales partes repraesentent, auctas fuisse: ideoque nouam hanc editionem priori multis modis praeferendam esse, inter omnes facile constat; multum autem augebitur operis praestantia, si ad auctarium respicimus, quo centum nouae plantae, a BLACKWELLIA omissae, medicatae et venenatae, alioque modo consideratione dignae, et viuis coloribus pictae et descriptae fuerunt. Et de hoc praecipue nunc dicendum erit, prius tamen nonnulla, quae historiam operis concernunt, praemittere debemus.

Ante triginta fere annos Illustris TREWIVS de edendo hoc, aut et emendando atque amplificando herbario cogitabat, sociumque eligebat EISENBERGERVM, virum, ob peritiam pingendi celeberrimum. Aliis vero negotiis obrutus non, nisi primam centuriam, commentario nouo illustrare potuit TREWIVS: hinc in elaborandis annotationibus nostri, eheu desideratissimi! LUDWIGII auxilium ideo praecipue implorauit, quia et apparatus librorum botanicorum copiosissimum, et hortum, rarissimarum plantarum copia instructissimum, possideret.

Ad officia quaecunque paratissimus Noster, lubentissime otium, si modo aliquod habuisset, in eodem perficiendo consumsisset; cum autem Ipsemet operi manum admouere non potuerit, amicis suis, Cll. BOSIO, et BOEHMERO spartam suam tribuit, vsumque bibliothecae et horti concessit; qui etiam centuriae II. III et IVtae textum elaborarunt, et dum postea publico munere, aliisque

negotiis impediti, elaborationem continuare haud potuerint; eandem tamen, ab aliis amicis, botanicesque peritis factam, examinarunt, ita, vt ab hac parte, collaboratorum scilicet, operis absoluti editio nullo modo retardata fuerit. TREWIVS autem cum et alios libros, ac praecipue EHRETI *plantas selectas*, annotationibus illustrandas, suscepisset, et novas, Blackwellianis tabulis addendas, icones pene multas, secundum naturae typum delineandas, pictori tradere voluisset, omnino fieri debuit, vt euulgatio operis retardaretur, et non exiguum damnum pateretur EISENBERGERVS.

Centuriis demum quinque absolutis, de auctario cogitabat TREWIVS, indicemque, cum centuria quinta exhibuit illarum plantarum, quae illud constituere deberent. Ast et illustris hic medicus anno sexagesimo nono diem obiit supremum, et egregius pictor, variis morbis vexatus, labores continuare non potuit, imo d. 5 aug. anno septuagesimo primo mortuus est. Auctarium itaque, modo inchoatum, perfici haud potuisset, nisi LUDWIGIVS omnem operam adhibuisset, aliorumque auxilia inuenisset. IOH. IAC. OTTO, celebris mercator Noribergensis, consanguineus TREWII AC EISENBERGERI, sumtus ad finendam huius herbarii editionem concessit, et cum plantarum, centuriae sextae destinatarum, icones, viuentis TREWIO, omnes nondum sculptae essent, deficientes suppleuerunt, aliasque substituerunt, ac omnibus annotationes addiderunt, Duumviri celeberrimi, SCHREBERVS et VOGELIVS, botanices Professores clarissimi. Nonnulla quoque ad conficiendum opus contulisse KNOLLIVM Med. Doctorem, indicemque generalem totius operis, quo variarum linguarum nomina exhibentur,

D. ZWIN-

D. ZWINGERUM, Medicum apud Noribergenses celebratissimum, concinnasse, ex praefatione, quam centuriae sextae praemisit, et paucis ante obitum mensibus conscripsit LUDWIGIVS, cognovimus.

His in genere praemonitis, ad centuriam quintam respicere, et quaedam partim de iconibus, partim de addito textu referre deberemus; cum vero omnia prioribus centuriis simillima inveniuntur, nolumus ea, quae in commendationem huius editionis alio tempore dicta fuerunt, repetere, potius statim ad auctarium nos conuertamus, et primo indicem delineatarum plantarum exhibeamus. Plantae itaque, quae centuria sexta accurate delineantur, et viuis coloribus belle pictae, continentur, sunt:

Aconitum Napellus.	Atropa belladonna.
— — lycoctonum.	Bellis perennis variet: fl.
— — Anthora.	multiplici rubro.
Actaea spicata.	Bidens tripartita.
Adonis vernalis.	Bromelia Ananas, fr. ro-
Aethusa Cynapium.	tundo et pyramidato.
Allium Victorialis.	Bryonia baccis nigris.
Amomi Cardamomi va-	Carlina acaulis.
riae species.	Carum Carui.
Anethum graueolens.	Chenopodium album.
Anthemis nobilis.	Cicer arietinum.
Arbutus Vua vrsi.	Cicuta virofa.
Arnica scorpioides.	Colchicum autumnale.
— — montana.	Conium maculatum.
Artemisia Pontica.	Conuoluulus Mechoa-
— — Abrotanum.	canna.
Asclepias Syriaca.	Croton Cascarilla.
Athamanta Meum.	Cucumis prophetarum.
Atriplex hortensis.	Cucurbita lagenaria.

Cuscuta Europaea.	Nigella aruensis.
Daphne Mesereum.	— — Damascena.
Daucus Carota.	Oenanthe crocata.
Dorsteniae species quaedam, inter quas etiam	Orchis bifolia.
Contraierua.	Panax quinquefolium.
Dracocephalum Moldauica.	Papauer Rhoeas.
Epidendrum Vanilla.	Phellandrium aquaticum.
Fumaria bulbosa.	Phytolacca decandra.
Gnaphalium arenarium.	Plantago Psyllium.
Helleborus niger, eiusque varietates.	Populus alba.
— — viridis cum duplici varietate.	Prunus Laurocerasus.
— — hyemalis.	Pyrola rotundifolia.
Heracleum Sphondylium.	Rhamnus Zizyphus.
Hieracium murorum.	Rheum palmatum.
Humulus Lupulus.	Rhodiola rosea.
Hyoscyamus niger.	Rhus Coriaria.
Impatiens noli tangere.	Salicornia herbacea.
Indigofera tinctoria.	Scilla maritima.
Leontodon Taraxacum.	Scutellaria galericulata.
Lichen Islandicus.	Selinum sylvestre.
Linnaea borealis.	Sium Nissi.
Lycopodium clauatum.	Solanum Melongena.
Lyfimachia nummularia.	— — tuberosum.
Lythrum Salicaria.	Taxus baccata.
Momordica Balsamina.	Teucrium Chamaepitys.
Nerium Oleander.	Triticum repens.
	Vaccinium oxycoccos.
	Verbascum Thapsus.
	Verbesina acmella.
	Zea Mays.

Praeterea Hippomane Mancinella, cum Visco purpureo, quod priorem arborem frequenter inhabitare solet, ex CATESBYO mutuata, eademque auctarii titulus ornatus fuit.

Infumt

Insunt ergo plantae eximiae, multaeque rariores, quorum spectat praecipue radicum *Ginseng* et *Ninfi* historia et *Panacis quinquefolii* icon, a Cel. EHRETO data; *Aemella Zeylanica*, *Dorsteniae* quatuor nondum definitae species, *Cardamomi* varii fructus, in officinis conseruati, et icon ex horto Malabarico desumpta, quae semina *Cardamomi minoris* exhibet. et s. p. Inter varias *Hellebori* icones occurrit vna, nondum determinata, *orientalis flore roseo* inscripta, quae vero multum conuenit cum *nigro*, huiusque duae aliae apponuntur varietates, quarum prior solo corollae colore differt, tum lutris, tum rubicundis venis variegato; altera copiosiores radicis fibras habet, et corollam viridescentibus et roseis venis pictam.

Aliae duae varietates cum *Helleboro viridi* proxime conueniunt, et modo radice, habituque minori differunt. Nonnullarum quoque plantarum, in prioribus centuriis minus accurate delineatarum, nouae additae fuerunt icones; vt sunt: *Taraxacum Leontodon*, *Verbascum Thapsus*, *Atriplex hortensis*, *Rhus Coriaria*; *Conii maculati* etiam repetita et emendata figura cernitur. *Solanum tuberosum*, iam Tab. 34. delineatum, variis radicum figuris illustratur, varietasque peculiaris additur floribus purpuris, tuberibusque nigricantibus conspicua. Plura in commendationem operis huius addere, superfluum esse existimamus, facileque speramus, fore, vt rei herbariae cultores, qui illud incompletum, vel prorsus non possident, eo nunc finito, vel partes suppleant, vel integrum sibi comparent. Integrum opus continet sex centurias plantarum, totidem, imo, cum nonnullae duplici tabula expressae sint, pluribus tabulis delineatarum, viuisque coloribus pictarum. Textus vero cum praefationi-

tionibus, indicibus, et variis auctorum, in opere citatorum, catalogis implet. 6 alph. 171. plag.

Iungamus hinc aliud, quod eadem ac Blackwellianum fata habuit, opus, et ante plures annos inchoatum, nunc demum absolutum fuit. Est illud:

III.

Allgemeines Blumen - Kräuter - Frucht und Gartenbuch, in welchem ganz neue, und nach der Natur abgemahlte Figuren von Blumen, Kräuter, Bäumen, Stauden, Früchte und anderen Gewächse vorgestellet werden. Nebst einer lateinischen und deutschen Beschreibung ihrer Theile etc. Ganz neu gezeichnet und mit Farben herausgegeben, in Nürnberg bey GEORG. WOLFGANG KNORR. Gedruckt bey Ioh. Ios. Fleischmann. 1750. fol. mai. Textus alph. 5. plag. 19. Indic. plag. 8. praefat. pl. 1.

h. e.

Thesaurus rei herbariae hortensisque vniuersalis, exhibens figuras florum, herbarum, arborum, fruticum, aliarumque plantarum prorsus nouas, natiuis coloribus depictas, atque idiomate tam Latino, quam Germanico describens eorundem partes, formam et habitum, nec non vsum in officinis pharmaceuticis, vita communi et medicina. apud GEORG. WOLFG. KNORRIVM.

Trecentas et vnā continet tabulas, eademque exhibent plantas, viuis coloribus, et vtplurimum nitide depictas, tercentum et triginta, quarum

quarum nonnullae quidem indigenae sunt et vulgares, aliae vero, et multae, exoticae ac rariores; et inter has succulentae variae, praecipue Aloes, Mesembryanthema, Cacti, Cotyledones etc. magnam operi aestimationem conciliabunt: hortensium etiam varietates, quae quandoque additae fuerunt, eius pretium potius augebunt, quam imminuent, cum fere omnes multiplici florum colore sese commendent.

Quaelibet autem icon plantam in naturali magnitudine, eiusque non modo totum habitum, sed et floris fructusque faciem optime repraesentat: minores quoque, et separatim appositae figurae floris fructusque partes, variis modis, naturali et aucta magnitudine, depictas exhibent, ita, ut omnibus, ad naturam accurate expressis, perfectisque iconibus non minorem gratiam reportauerit KNORRIVS, qui ab anno quinquagesimo ad sexagesimum primum, quo evivis secessit, tabulas omnes perfecit, delineavit, in aes incidit, elegantique penicillo pinxit, ac propriis sumptibus edidit.

Praeterea etiam de explicatione tabularum, iisdemque addendis annotationibus sollicitus fuit; quem laborem in se quidem suscepit Tubingensium Professor PHIL. FRIDR. GMELINVS; ast aliis laboribus impeditus, KNORRIVM sequi, et tabulis explicationem statim addere nec potuit, nec voluit. Tabulae enim nullo servato ordine, partitis vicibus, editae, et littera quadam adscripta notatae fuerunt, ita, ut, finito tandem opere, omnes secundum alphabeti ordinem collocari possint. Cum itaque ad vnam litteram pertinentes, siue vnam quasi classem constituentes plantae, non simul et vna vice, sed longiori saepius interposito tempore, in publicum prodirent, Commentator quoque non vna serie textum elaborare potuit. Hinc etiam

factum, vt maxima commentariorum pars, mortuo demum pictore, typis exarata fuerit, imo imperfectum mansisset opus, nisi beati viri haeredes et de hoc, et aliis, a KNORRIO inceptis, nondum vero absolutis, operibus seuerè cogitassent, nouamque curam adhibuissent.

Rogarunt itaque Cl. GMELINVM, vt laborem continuaret, qui etiam magnam commentationum partem successiue elaborauit; ast, praematura morte defunctus, vix dimidiam partem absoluere potuit. Licet vero Huius obitus nouam absoluendo operi moram fecerit; omnem tamen curam adhibuerunt haeredes, vt per alium, rei herbariae peritum, textus continuaretur; inuenerunt quoque eundem in BOSIO, Wittebergensium Professore; antequam vero Ille manum operi admoueret, ardenti febre an. 1770 obiit.

Huius autem vices, rogantibus haeredibus, in se suscepit alter Wittebergensis Professor, Cl. BOEHMERVS, et, quae deficiebant, suppleuit, absolutumque opus exhibuit. Licet vero textus a duobus Auctoribus conscriptus fuerit; satis tamen sibi similis existit. A constituto enim tramite non recessit BOEHMERVS, descriptiones modo plantarum, et characteres praecipue genericos magis contrahere, integra auctorum loca rarius adducere, repetitiones omnes sedulo euitare, et vtique breuitati studere voluit; cum e contrario GMELINVS variorum auctorum definitiones addiderit, quaeque de plantis singulis auctoris, veteres praecipue, tradiderunt, eorundem verbis repetierit, et hinc nimis copiosam, Lectoribus saepe molestam, commentationem exhibuerit. Praeter textum alia quoque BOEHMERVS praestitit, quae maiorem operi perfectionem conciliare deberent.

Non-

Nonnullis enim tabulis; siue plantis falsa adscripta fuerant nomina, speciesque non semper accurate determinatae; eiusmodi errores sollicitè correxit, et quatenam, in iconè repraesentata, fuerit planta, aperte docuit. Indices quoque generales nominum; ex variis linguis adductorum, composuit, et praefationem, mense ianuario 1771. signatam, historiam operis recensentem, praemisit.

Botanicis igitur, aliisque, qui consideratione plantarum delectantur, gratum fore hoc opus, certissime speramus, illudque omnibus commendamus, licet alphabeticus tabularum ordo, in utraque parte repetitus, et prioris partis explicatio, plagularum custode et paginis non cohaerens, aliquam difficultatem parere videatur; quae tamen nulla erit, cum absoluto nunc opere et textus, et tabulae facile in ordinem redigi, et compingi possint.

IV.

D. IOH. CHRISTLIEB KEMME *ordentlichen* Professor zu Halle, und Mitglieds der Röm. Kayf. Acad. der Naturf. *Einleitung in die Medicin überhaupt. Halle im Magdeb. verlegt Carl Hermann Hemmerde 1771. 8. 7 Bog.*

i. e.

D. IO. CHRISTLIEB KEMME *introductio in medicinam vniuersam.*

Variis dissertationibus iam clarus KEMMIVS in succincta praefatione de fine, quem sibi praefixit, loquitur, in usum scilicet academicum huncce conscripsit libellum, quo eo explicando studium medi-

cinae redderet facilius. Viam, quam alii sunt ante ipsum ingressi, magis reliquit, quam perrexit. Praemissis tum definitione, diuisione vsuque, diuidit tractationem ipsam in tres partes.

p. 6. Prima itaque pars de natura medicinae agens in quinque iterum distribuitur capita, quorum, cum singularia etiam a Cl. Auctore, praecipue in quarto fuerint praestita, dabimus nunc delineationem.

Primum caput tractat naturam, vsum, et necessitatem medicinae in genere. Natura vero determinatur ex obiecto docendique methodo: sub eo sanitatem et morbum a statu sano et morbofo distinguit; in hac scientiam medicinam esse ostendit. Quo melius pateat vsus, praemittit definitionem nostrae scientiae: ille vero consistit in eo, vt sanitatem praesentem conseruet, amissam restituat, deinde accuratiorem corporis humani exhibeat cognitionem, tum iudicium a iudice ferendum interdum determinet et tandem applicetur nonnunquam ad alia corpora animalia. Necessaria ideo inuenitur, quia naturae vires plerumque corruptae, vel iusto debiliores, mortales in prospiciendo suae sanitati imperiti, reperiuntur: quod denique et ex historia, et catalogis demortuorum conferendis constat luculentissime.

p. 10. In secundo capite theoreticas partes physiologiam primum, cuius obiecta sunt sanitas perfectissima, limitata, vita corporis humani, signa sanitatis, vitae et mortis; deinde pathologiam, huiusque partes recenset. In notula priori subiecta bene discernit actiones et functiones, in posteriore definit et diuidit causas, symptomata et signa, additque denique rationem, cur semiologia, et pathclogia chirurgica seorsim proponantur. Progreditur nunc ad practicas, primo ad diaeteticam, cuius subsidium est

est materia alimentaria: deinde ad therapiam, et, distinctione inter remedia medica et medicamenta facta, ad partes ab ea, ob nimium ambitum, disiunctas, ad materiam medicam puto, pharmacologiam, materiam chirurgicam progreditur. Hic simul definit venena, et refert ea iure ad pathologiam et therapiam generalem. Diuisa therapia in generalem, vbi LVDWIGII therapiam laudat in primis, et specialem, hanc dispescit in chirurgicam et in stricte sic dictam. Chirurgia constat ex materia, et pathologia chirurgica, et therapia, practica eius, ad partem spectans, pars, dicitur ars obstetricia. Medicina clinica est theoriae et praxeos medicae partium applicatio ad statum morbosum, ideoque non singularis pars est: huc etiam pertinet consultatoria. Tandem tertia praxeos pars medicina forensis sequitur.

Tertium caput de medicinae fontibus generalibus, experientia, ratione, vsu loquendi atque auctoritate agit: et deinde de specialibus tractat, nimirum de c. h. natura, animae corporisque nexu, et indole agendique modo aliorum extra nos positorum. Ex quibus egregias valdeque vtilis conclusiones in fine deriuat. p. 37.

Quartum caput de medicinae certitudine, quam nemo tam acute, quam Cl. Auctor elaborauit, agens, docet, medicum ciuium suorum salutem non in incerto ponere, modos concludendi, fontes incertitudinis et limites nostrae scientiae detegere. Itaque nunc se conuertit ad inuestigandam certitudinem sensuum internorum et externorum, fidei, ratiociniorum, tandemque fontium medicinae specialium. Ob occasionem, ipsi datam, fert suum de medicorum erroribus iudicium. Ex his praemissis colligit, medicinam iure nomen scientiae, eius vero partes practicas tam artis, quam scientiae nomen promereri, p. 46.

rerī, inque systema posse redigi. Hoc quidem adhuc est imperfectum; attamen non deridenda sunt omnia ideo facta tentamina: auctor enim systematis, non prorsus ingenio destitutus, magis magisque ad perfectionem illud perducet. Denique diiudicat hyphotheses in medicina.

P. 73. Quintum caput succinctam historiam ortus factorumque medicinae tradit.

p. 81. Secunda pars de medicina addiscenda exponit, requirit Cl. Auctor primum notitiam Graecae, Latinae, Anglicae, Gallicae et Italicae linguae, deinde philosophiam, mathesin, physicam. Haec ultima diuiditur ab eo in historiam et scientiam naturalem, illa continet zoologiam, quae supponit anatomiam: phytologiam, quae iterum in duas abit partes, in philosophiam botanicam, quam Auct. theoreticam, et botanicam, quam practicam nominat, postea etiam continet mineralogiam. Nunc de harum scientiarum usu, historiae medicinae diuisione, auxiliatricum scientiarum abusu, ordineque, quem tiro medicus in audiendis praelectionibus sequi debet, loquitur: denique monita sedecim valde utilia illi tradit.

p. 95. Tertia pars de medicina facienda agens, praemissis huc pertinentibus definitionibus, distribuitur in quatuor capita.


p. 96. Primum conuenientissime incipit ab usu experientiae et rationis in medicina, indeque docet, quomodo observationes de corpore humano aut sano, aut aegro, aut mortuo, porro de animalibus, medicamentis et venenis sint instituendae et ratio vsurpanda.

Secundo

Secundo in capite de medici practici officiis dis- p. 102.
ferit, generalibus et specialibus, quae vltima reipu-
blica, aegris, suis collegis, pharmacopolis, chi-
rurgis, obstetricibus sibi que ipsi debet praestare.
Addit hic quaedam de experientia practici vsuque
theoriae in praxi, et quaestionem illam mouet, an
theoriae peritus sit felix practicus? potest quidem
talis euadere, sed ideo nondum est; etenim qualitates
ad exercendam medicinam requiruntur, quas docet
solus vsus, vtpote magister optimus. Contra pra-
cticus, theoria non instructus, est medicafter.

Ad tertium caput nunc deuenimus, quod de p. 108.
medico docente seu professore simulque de lingua,
in qua docendum sit, agit: probare annititur hic
Cl. Auctor, Latinam non Germanicae esse prae-
ferendam.

Vltimum denique caput quam breuissime tra- p. 111.
dit scriptorum medicorum diuisionem, regularum
fontem et linguam, quibus in conscribendis libris
sit vtendum.



V.

Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et physiques sur l'oeil, et sur les maladies qui affectent cet organe; avec un précis des opérations et des remèdes qu'on doit pratiquer pour les guerir. Par Mr. JEAN JANIN, Maître en chirurgie, oculiste de la ville de Lyon cet. à Lyon chez les freres *Perisse* à Paris chez *P. F. Didot le jeune* 1772. 8. pagg. 474. praeter dedicationem et prooemium.

i. e.

Commentarii et observationes anatomico physiologico physicae super oculo ejusque morbis; cum synopsi operationum remediorumque, iis medentium, Auctore JO. JANIN.

Si scripta medica, quae iudicio ac ratione consignantur, grata nobis sunt, ea certe non minora videntur, quae, cum ad praxin ducant, rationem bonam, ab ipsa experientia, observationibus superstructa, confirmatam, produnt. Communicamus hic eiusmodi commentarium, qui, nouarum veritatum dives, concinnitate sua atque subtilitate bonisque et fidis observationibus plurima harum rerum scripta longe post se relinquit. Tractationibus ipse, quae omnes, etsi non iusto ordine sequantur, oculum spectant, compositus est. Praemittitur tractatio anatomico physiologica oculi, ubi breuiter Cl. Auctor, quae a Cel. *ZINNIO* *) fusius exposita sunt, congeffit; nec quidquam ibi inveni-

*) Descript. anatom. oculi humani cet. Gottingae 755. 4. It. Comm. nostr. Vol. V. p. 342.

invenimus, quod notatu admodum dignum sit, nisi, quod capsulam lentis in *crystallo - anteriorem*, densiorem, et *posteriorem* teneriorem diuidat, quae in maxima sua diametro conniveant: quodque cum aliis, qui sedem visus in retina ponant, conveniat.

Sermonem deinde adiecit, de necessitate ob- p. 31.
seruationum, vbi, quae per seculum circa oculum detecta sint, exponit, opinionesque varias physicorum de mechanismo visus addit. Duo, cum p. 38.
nondum de eo plane persuasus sit, instituit experimenta: Vitrum rubrum alteri, alteri caeruleum praefixit oculo, candelamque flammantem decem pedes a se remouit: illo clauso, caerulea, hoc vero clauso, rubra apparuit flamma; duobus apertis, violaceus erat color. Vitrum deinde caeruleum alteri oculorum praeposuit, et vtroque aperto, in caeruleascentem flamma vergebat colorem; nudo clauso caerulea, clauso armato, naturalis flammae color videbatur. Cum itaque imagines non, pro vti immediato visus organo inprimuntur, appareant; sed diversae confluant, putat Noster, confluxum hunc variorum radiorum extra oculum fieri debere: retinam instar speculi concavi esse, quo radii refringantur, et vterque oculus ex axi sua paralleli focum formet, per quem imago obiecti, obiectum ipsum inter et organon formata, transeat. Iam tria commentaria, quae cum duodecim sectionibus et appendice formularum totum opus absoluunt, sequuntur.

Agitur in primo commentario de viis lacrymae p. 57.
libus, secretionem lacrymarum earumque resorptione. Non omnes, quod plurimi anatomicorum defendunt, ex glandula lacrymali proueniunt lacrymae: maxima potius earum pars ex ductibus excre-

excretoriis, quos dicit, corneae exsudat; nec minorem earum copiam canales excretorii carunculae, coniunctivae, glandularumque Meibomianarum profundunt. Hinc quoque in morbis viarum lacrymalium nihil haecenus dictum est de atonia vel dilatatione praeternaturali ductuum excretoriorum corneae coniunctivaeque; nec ad glandulas Meibomianas obstructas, causam saepius viarum lacrymalium morbosarum, attenderunt auctores: veram denique hydrophthalmiae causam, ex obstructis canaliculis excretoriis corneae oriundae, plurimi neglexerunt. Singula iam haec persequitur. Cel. ZINN *), partem lacrymarum ex finibus articularum coniunctivae exsudare defendenti, assentitur quidem; ita tamen, ut affirmet, veras ibi, in statu morbofo admodum conspicuas, inueniri glandulas, unde lacrymae quoque proveniant, id quod

p. 61. tribus observationibus declarat. Palpebra enim inferiore depressa, axique bulbi versus superiora directa; nec non linteo carpto palpebram inter et globum immisso, omnibusque rite absterfis, guttarum nascentium, si experimentum iuste instituitur, in omni coniunctivae ambitu magna observatur copia. Pori quoque coniunctivae dilatati praesentiam glandularum haud dubie testari Noster putat.

p. 66. Secretionem fluidi aquei per poros corneae, a Cell. ST. YVES, PALFIN, WINSLOW cet. iam declaratam, maximam partem lacrymarum conficere, Noster, in naturam eius, quantitatem, receptaculum eius fontesque, unde redundet, inquirens probat. Deriuatur humor aqueus ex corpore vitreo, duplici lamina cellulari et capsulari composito: haec densior multis poris perforatur, per quos humor exsudat et in cameras deponitur; illa

*) l. c. cap. XIII. §. I. p. 44.

illa multo rarior plurimis cellulis, sibi invicem incumbentibus, quae lympham, a vasis lymphaticis, ex choroidea et retina huc delatis, acceptam, versus capsulae poros urgent, constat. Experimenta Cl. Auctoris, hac de re instituta, ulterius confirmant, quid de tunica corporis vitrei duplici, de cellulis sibi communicantibus, de humore per poros exsudante, aqueum augente et lacrymas inde conficiente probatum velit.

Deriuatur porro ex lente crystallina, et quidem p. 80. humore isto viscido limpido, qui capsulam inter et lentem ipsam colligitur: deponitur iste continuo in cameram posteriorem: ut inde sponte sequi putet, humorem hunc per omnem bulbi ambitum copiosius exsudare, eumque maximam partem lacrymarum constituere, id quod exemplis quibusdam magis illustrat. Glandula vero lacrymalis, cum omnibus, haecenus expositis, fontibus comparata, multo minorem lacrymarum effundit copiam. Ex caruncula porro lacrymali, quam ex plurimis minoribus glandulis, tunica inclusis, ductibusque suis excretoriis compositam vidit, humor sebaceus, cerumini aurium haud absimilis, et cum lacrymis confluent, exstillat: hinc cum eo, ex glandulis Meibomianis exsudante, partem lacrymarum constituit, coniunctivamque ab acredine defendit; minime vero, quod plurimi credunt, iste humor aggerem facit, quo lacrymae, fines suos excedentes, in faciem defluere impediuntur. Lacrymarum, p. 93. per viginti quatuor horas duas uncias secretarum, aliae absorptae in saccum lacrymale defluunt, aliae euaporant. Cucurbitula enim vitrea, ne aer atmosphaericus accederet, oculo applicata, roridum vaporem in parietibus eius internis observavit, qui in guttas sensim confluent per horam dimidiam ad viginti vel viginti quinque guttas ascenderet:

facco porro lacrymali assidue expresso, lacrymarum inde per horam vnam et dimidiam triginta circiter, vel triginta quinque collectarum habuit grana, quae cum euaporatis drachmam efficiunt, et hae in viginti quatuor horis ad sedecim adscendunt.

- p. 97. Ad receptacula lacrymarum iam Cl. Auctor deueniens in puncta lacrymalia primum inquit. Papillulam (*mammelon*) ascendentem descendentemque in utroque obseruauit, figuramque addit, qua, apertura palpebrarum maiori. minoriue, directio punctorum varia conspiciatur. Cum vero haec orificia iam dilatata, iam contracta vel clausa videret, sphincterem ibi quendam, quo, si irritantur, claudantur, defendit; quem exemplo illustrat, ubi, post exulcerationem tarforum profluvium lacrymarum sequebatur. Noster oculum perlustrans puncta dilatata, nec villo stimulo se contrahentia obseruauit, ut inde suspicaretur, sphincterem hac exulceratione destructum fuisse. Cum in canali lacrymali quoque motum vermicularem, quem ad faccum vsque continuatum suspicatur, perspiceret, probabile Ipse videtur, musculares in sacco lacrymali adesse fibras, quae in medio eius sphincterem, faccum iusto tempore contrahentem dilatantemque forment. Sic in canali quoque nasali sphincterem, a Cel. L E C A T sub nomine *ligamenti tendinei* iam descriptum, assumit; nec ab ipso hac in re dissentit, nisi, quod fibras ibi musculares defendat. Ex variis enim rebus patet, lacrymas in sacco per tempus, prouti vrina in vesica, retineri; quod vero sine sphinctere in canali nasali fieri non posset. Cum itaque faccus lacrymalis plenus sit, vesicae urinariae ad instar se contrahit, sphincterem canalis nasalis soluit, lacrymasque ita versus nares propellit: sub qualibet quoque emunctione narium aer

aer atmosphaericus sine sphinctere in saccum lacry-
malem intrat. Phaenomena reliqua, in obstru-
ctione canalis nasalis, quam saepius falso accusent,
oboriunda, inquirens ex sphinctere hoc, male affecto,
explicat: sic enim morbus, obstructione stilo, vel
filo traiecto sublata, saepius redit. In hoc itaque
statu sphincter iste iusto strictior relaxari debet.
Viis lacrymalibus, in cadauere disquisitis, canalis p. 114.
nasalis mediam partem constrictam detexit, et in
hac aequae, ac ad puncta lacrymalia circulares; in re-
liqua vero via longitudinales vidit fibras: Sacculus la-
crymalis superior pars multis paruulis gangliis, quae
post macerationem glandulas detexit, obsita erat,
ex quibus humor flavescentis exprimebatur, quem
acriorem factum, sphincterem ad maiorem contra-
ctionem stimulare putat; malamque interdum harum
glandularum dispositionem solam fistulae lacryma-
lis causam esse, probabile videtur. Vel, quod saepius
fieri putat, humor iste acrior parietes internos
arrodit, exsudat et defluit, quem ex colore flaves-
cente, puri non absimili, falso ex ulcere interno
deriuant, et ad fistulam lacrymalem transferunt.

Mechanismum lacrymarum resorptarum ex le- p. 130.
gibus hydraulicis declarat, ita, vt vias lacrymales
cum antlia (*pompe aspirante et foulante*) comparet,
et resorptionem ita explicet. Sub qualibet enim
palpebrarum actione ductus lacrymales ex fibris
suis longitudinalibus prolongantur, puncta lacry-
malia cum papillis emergunt, dilatantur, et diri-
guntur versus canthum internum, ibique in lacrymas
collectas immerguntur: retractis palpebris, quaeli-
bet papilla cito retrahitur, clauditur, lacrymas-
que ad instar pistilli in siphone porro vrget: con-
spirat cum ista actione motus vermicularis, vt ita
lacrymae in sacculum lacrymalem ducantur: iam hic

Q 2

plenus

plenus, se contrahens, lacrymas in canalem nasalem premit, sphincterem soluit, vt lacrymae exinde versus nares defluant. Lacrymarum huc ductarum partem per choanas narium in ventriculum descendere, digestioni inferuire, quid? quod per ipsas venas lacteas absorberi, humorumque circulo tradi putat.

- p. 137. Capsulam lentis crystallinae in altero commentario ita Cl. Auctor examinat, vt primo demonstret, lentem sola et vna tunica circumdari, capsulam porro membranis hyaloideae et retinae contiguam tantum esse, eamque ex duobus hemisphaeriis, in maxima sua diametro sibi contingentibus *) componi: quibus denique obseruationes et monita practica adiungit. Saepius iam obseruatum est, opacitatem lentis nunquam ad tunicam hyaloideam vsque continuari: et ita ex eo iam patet, tunicas has sibi non continuas esse. Si porro capsula cum obtuso instrumento ab humore vitreo processibusque ciliaribus separatur, glabra eius superficies in conspectum venit, nec vllam disruptionem prodit,
- p. 143. vnde suspicio continuitatis nasci possit. Patet hoc quoque ex hyaloideae minori crassitie et firmitate, qua intra digitos multo facilius, quam capsula, possit conteri. Si denique bulbus per aliquot dies in spiritu vini maceratur, capsula plane obscurata, hyaloidea vero pellucida apparebunt.
- p. 148. Vidit Cl. Auctor cataractam in pluribus operationibus subito propulsam: ex quo coniicit, capsulam, ab omni adhaesione cum partibus vicinis liberam, compressioni humoris vitrei, oscillationique processuum ciliarium, deficiente iam humore aqueo, cessisse, viamque per corneam apertam secutam esse. Vidit porro, qui ex cataracta connata,
- vel

*) vide supra p. 239.

vel postea ea adfecti coeci essent, qui post percussionem aliquam totius corporis, visum statim recuperarent; quod vero ex soluta capsula a partibus adhaerentibus, quae simul cum lente in cameram posteriorem hac vi prolapsa sit, tantummodo declarari posse putat. Cum etiam haud raro fieri soleat, ut capsula simul cum lente obscuretur, quod et Ipse saepius observavit, suadet, ut in operatione capsula non discissa simul cum lente extrahatur. Vidit enim, lente extracta, capsulam anteriorem p. 166. opacam relictam esse, quae visum turbaret; hac vero quoque extracta, visum restitutum esse.

Capsulam ante et post operationem cataractae p. 174. obscurari putat, idque vel ex humoris MORGAGNII depravatione, seu obstructione vasorum capsulae, vel ex percussione bulbi, aut ex incisione, in operatione cataractae iusto minore, ut inde lens transiens angustiam nimis extendat, irritet vel laedat, fieri posse asserit. Suadet ergo, ut cystotomus Cel. LA FAYE paullo amplior sit, quo eo maior in capsula fiat incisio: cum quoque saepius cuspis cystotomi in vagina sua obtusior reddatur, bene attendendum est, ne, cum capsula anterior admodum interdum firma sit et coriacea, cuspis dehiscat, neque incisio, quam tamen supponimus, facta sit.

Agit Noster in tertio commentario de pupilla p. 177. clausa. Vitium eiusmodi connatum, quod Cel. CHESELDEN *), communicavit, Cl. Auctor nunquam, sed semper per morbum inductum observavit. Accidit enim saepius, ut, post operationem cataractae, vel etiam per grauiorem inflammationem pupilla claudatur, et cum obscuratione et accretione capsulae lentis ad iridem coniuncta sit.

Q 3

Emen-

*) Mem. de l'academ. de chir. Tom. III. H. p. 115. vid. comm. nostr. Vol. VIII. p. 199.

- Emendationem eius in variis aegris ex methodo Cheseldiana tentavit; sed pupillam artefactam paucis diebus post denuo concretam vidit: cuius quidem causam paulo post in fibrarum radiatarum longitudinali discissione detexit. Cum enim casu radiatas has fibras verticaliter discinderet, vulnus postea non clausum, sed motum ibi, pupillae contrarium, observavit. Qua de causa deinde, in pupilla artificiali reddenda, fibras has verticaliter discindens meliorem habuit effectum, ita, ut, quamvis fibrae circulares pupillae immobiles essent, vulnus statim dilataretur, cum fibrae radiatae nunc
- p. 194. contraherentur; hae vero in atrophia oculi non strictae sunt, verticali tamen discissione haud contrahuntur, et vulnus concrevit: in tali casu operatio nulla. Cum et hactenus Noster incisionem versus angulum maiorem fecisset; iam in aegra eam versus internum instituit, bono quidem euentu, strabismo tamen relicto; quem ex axi utriusque bulbi antea conspirante, iam vero diuergente, ex-
- p. 202. plicat. Pupilla artificiali iusto maiore facta, aegra in lumine clariore nihil vidit; quod tamen vitium charta papyracea nigra, foramine in medio instructa, oculo in lumine clariore applicata, emendavit. Accidit interdum, ut suppuratio tamen visum turbet; quod vero iuxta prophylaxi et methodo mendendi cauetur. Methodum Cheseldianam, etsi
- p. 204. Noster hoc vitium a mala conformatione interdum oriri concedat, non probat; cum semper fere obscuratio lentis capsulaeque eius cum hoc vitio coniuncta esse soleat; ad quas tamen acus Cheseldiana non pertingat: ut ergo, pupilla quamvis artificiali reddita, denuo incisio ad extrahendam cataractam sit instituenda.

Sequuntur

Sequuntur iam obſervationes variae, quae ta. p. 207.
 men omnes oculum morboſum ſpectant. Conti-
 net ſectio prima octodecim obſervationes ſuper
 cataracta ſimplici et complicata, et plerumque feli-
 citer curata. In connata cataracta lentem oſſeam ex- p. 228.
 tractam vidit: myops alia poſt ſeptuageſimum an-
 num cataracta in utroque oculo afficiebatur; coecitas
 et myopia poſt operationem ceſſarunt: altera catara-
 cta paucis annis poſt feliciter quoque extracta, ob-
 iecta duplicia ſibi repraeſentabantur; ſed et hoc vi-
 tium iuſto regimine emendatum eſt. Opacitatem p. 250.
 Noſter ſaepius in oculo poſt operationem relictam
 vidit, quam *cataractam ſecundariam* vocat, et ex ob-
 ſcuritate capsulae, vel ex muco lentis, in capsula
 poſt operationem relicto, deriuat. Definitur illa
 ex colore lacteo, haec ſaueſcente, cum ſuperficie
 ſaepius inaequali. Si mucus iſte difficile vel plane
 non diſſolui poteſt, operatio ſtatim iſtituatur, ne
 ad parietes capsulae deductus ophthalmiam haud
 leuem, vel eius ad iridem adhaeſionem producat;
 priorem vero ſpeciem diſcutientibus tollere ſuadet,
 quippe quae bono ſuo effectū hic admodum ſe com-
 mendant; his vero non ſuccedentibus, cornea de-
 nuo aperta, capsula eximenda eſt. Vtramque ſpe-
 ciem exemplis, ubi eas obſervatas curavit, illuſtrat.
 Cataractae quinque ſpecies Cl. Auctor defendit:
 Primo enim ſola lens obſcurata ſaepiſſime occurrit; p. 268.
 color et conſiſtentia eius variant: in iunioribus
 lacteus et mollis; ſauus in adultioribus, niger,
 dura vel etiam oſſea, quam plerumque percuffio
 bulbi exitu producere ſolet. Deinde opacitas lentis
 cum obſcuratione humoris MORGAGNII et capſu-
 lae cryſtallinae coniuncta eſt, lente ſolida, liquida
 interdum, quam quidem obſervatio ſecunda teſtatur:
 Tum ſola pars anterior capsulae obſcurata eſt, in-
 terdum cum opacitate lentis coniuncta; porro

tunica hyaloidea opaca quartam speciem, auctore et obseruatore ST. YVES *) offert: Tandem humor MORGAGNII obscuratus quintam speciem tradit.

- p. 270. In qualibet vero operatione, quamuis varie debeat institui, id bene attendatur, vt duae tertiae corneae discindantur, capsulaque iusto modo aperiatur, ne pressione bulbi magna ad vrgendam lentem opus sit; si vero post operationem obscura quaedam macula post pupillam obseruetur, eam ex muco lentis, vel vitiosa capsula lentis nasci dictum est: vbi in primo casu leni pressione vel instrumento corpus peregrinum eximatur; in posteriore capsulae plerumque anterior pars obscurata forcipe, vel, quod difficilius videtur, forcice abscissa educatur. Ex malo euentu, quem aegri, cum oculum iusto citius radiis solis, iisque viuidioribus exponerent, habuerunt, putat Noster, oculum ante decimum post operationem diem non aperiendum esse. Concedit Cl. Auctor, maculas corneae, quas LEMERY **) *cataraetam externam* vocat, interno vsu cort. Peruu. discuti posse; veram vero et confirmatam cataractam vllis medicamentis, vel ipso cort. Peruu. quo Cl. HEBERDEN ***) eam curasse affirmat, tolli negat. Vasa enim lentis sunt minima, eorumque tunicae tenerrimae: oscillatio eorum vix conspicua, iisque semel obstructis, motus systalticus nullus; impetus potius humorum versus obstructionem rupturas vasorum, effusionemque fluidi obstructi producat necesse est. Ex quibus patet, stagnationem lymphae

*) vid. EIVSD. Traité des maladies des yeux.

**) vid. Pharmacopée universelle. Vol. I. edit. quint. 4. p. 113.

***) vid. Journal de médecine du mois Aout. 1769. p. 102. v. Comm. nostr. paulo infra.

phae obstructae lentis in vasis Zinnianis, quae non negat, nullo medicamento interno resolui posse.

Agit in sectione altera de fistula lacrymali simplici et complicata, et Cel. PETIT in eius caus-

farum scrutinio, paucis mutatis, sequitur. Vel enim glandulae Meibomianae morbosae humorem fecernunt, sphincterem canalis nasalis ad contractionem maiorem irritantem, quod et de humore, ex glandulis facci lacrymalis excreto, valet. Interdum vlcus facci lacrymalis eundem effectum producit: vel maior laxitas facci hydropem eius generat: vel denique tumor in partibus adiacentibus, ex obstructione humorum, vel exostosi ossis vnguis, aut apophyseos coronalis oriundus, vias lacrymales coangustare vel plane claudere poterit. Definit p. 289.

Noster primam speciem ex minori copia materiae, paucis lacrymis commixtae, expressae, ex sacco lacrymali non ita valde tumido, ex marginibus palpebrarum crassis, duris inuersisque, nec non ex vasis coniunctivae, potissimum palpebrae inferioris varicosis, et lippitudine chronica. Si vero glandulae facci lacrymalis vitatae in causa sunt, saccus lacrymalis magis tumidus conspicitur, materia exinde expressa crassior, varii coloris et cum lacrymis commixta est, marginibus palpebrarum coniunctivaeque sanis. Tumor partium vicinarum, ut causa fistulae lacrymalis, inde cognoscitur, si saccus lacrymalis expressus tumiditatem quandam retinet, materiaque expressa per puncta lacrymalia aequae, ac per nares egreditur: exostosis ita differt, ut tumor magis durus et inaequalis appareat: hydrops facci lacrymalis ex materia non purulenta, sed limpida egrediente indicatur. Exulceratio p. 294.

facci lacrymalis non, nisi post vulnera, contusiones,

Q 5

inter-

interdum ex miasmate venereo, cancroso cet. oritur. Verum denique pus flavescentis, viridis coloris malique odoris est; cum materia purulenta ex glandulis facci lacrymalis albida appareat. Iam diagnosi hac stabilita, quatuordecim observationibus eas illustrat, quae ex humore glandularum facci lacrymalis peruerso, vel ex constrictione sphincteris canalis nasalis, vel denique ex relaxatione facci lacrymalis cet. oriundae sunt. Puella caco-chymica lippitudine chronica ex polypo, in sacco lacrymali nato, per canalem nasalem transeunte et ex nare dextro propendente oriunda, laborauit: Sacco lacrymali discisso, polypoque eradicato et per nares depresso, fetaceum Noster, ne caro fungosa excresceret, per amplum admodum canalem traiciens vulnere linteum carptum, aqua mercuriali madidum immittebat: paullo post polypo recrudescente, lapide infernali eodem euentu vsus est: meliore postea oleo camphorae, ita, vt polypus non amplius appareret, canali quidem iusta magnitudine restituta, oculo tamen illacrymante relicto.

p. 331. Pertrahit Noster in sectione tertia chemosin, quam ab ophthalmia sic distinguit, vt in illa coniunctiua admodum tumida margines palpebrarum retrahat, palpebrasque a se inuicem diducat, vt cornea quasi occulta videatur; in hac vero sola inflammatio coniunctivae, interdum obstructio vel tumor palpebrarum cum copiosa secretione lacrymarum appareant. Luxuriantem partem coniunctivae Noster abscidit, cum chemosis ex metastasi anginae orta esset; vbi ex suppressione menstruorum ophthalmia nata erat, iisdem ex applicatione hirudinum ad labia pudendorum restitutis, aegra sanata est.

Señtio quarta obseruationes de vlceribus cor. p. 345.
neae continet. Benigna ea, pellucida; maligna vero
flaua, opaca et dolorifica sunt. Cognoscitur vlcus,
si bulbus, versus horizontem fixus, et a latere in-
spectus, superficiem corneae inaequalem, excaua-
tionibus plus minusue profundis conspicuam,
ostendit. Ex vlcere profundo alba cicatrix, ex su-
perficiali grisea relinquitur: cicatrices hae curatio-
nem non admittunt, et ita a pterygio s. panno diffe-
runt, quippe quae iustis remediis cedunt. In vlcere
benigno topica applicat; in maligno internis quo-
que opus est. Sic cort. Peruu. cum ex deprauata
massa humorum vniuersa vlcus, quod oculum fini-
strum occuparet, corneam obturaret, palpebras,
nares totamque faciem tumida redderet, ortum ef-
flet, optimo cum effectu vsus est.

Agit Cl. Auñtor in señaione quinta de relaxatio- p. 357.
ne et atonia palpebrae superioris cum bulbi cor-
ruptione complicata. Rarissime hunc morbum,
contra plurimos auñtores, ex paralyfi oriri defen-
dit: saepius eum ex relaxatione et praeternaturali
prolongatione cutis palpebrae, vel ex conuulsiua
contractione eius ortum vidit. In hoc casu palpebra
rigida et immobilis; in illo mollis est et cedit. Com-
prehendit Noster, si ex sola relaxatione oritur, cu-
tem superfluam cum forcipe, señaioneque transuer-
sali abscindit; monet vero, plus cutis versus an-
gulum minorem, quam maiorem abscindendum
esse, ne palpebra inaequaliter se claudat, muscu-
lisque parcendum esse. Si vero spasmus in causa
est, pediluuiis et collyriis vtitur.

Pertractatur in señaione sexta phtosis cum lae- P. 367.
sione bulbi complicata. Est ea reflexio tarforum
introrsum, vt inde cilia male dirigantur: ex qua-
rum

rum deinde frictione dolores, inflammatio coniunctivae, pterygia corneae, ulcera, quid? quod ipsa coecitas oriuntur. Differt ab ea distichiasis, rarissimus morbus, in qua cilia duplicia, extus alia, alia intus conspiciuntur: quam Noster non observatam hic omittit. In phtoseos vero cura id attendit, ut marginum palpebrarum iustam restituat directionem: eum in finem cutem palpebrarum superfluam forfice refecat, vulnusque emplastris glutinantibus, vel futura cruenta claudit. Accidit Ipsi, ut, cum cutim iam comprehendisset, aegra meticulosa caput subito retraheret, unde palpebrae valde ageretur extendereturque, ut etiam operationem differre cogeretur: quatuor diebus post iustam et naturalem conditionem palpebrae restitutam laetus vidit: id quod postea ex consilio, bono cum eventu instituit, cuius quidem causam reddere nequit.

P. 375. Agitur in sectione septima de ectropio. Palpebrae ex tumore earum extrorsum reflectuntur, cuius causam Noster ex depravatione lymphae, ex dispositione scrophulosa, vel ex metastasi seu obstructione glandularum Meibomianarum vel sacculi lacrymalis deriuat. Tumorem Cl. Auctor abscindit vel discutit, id quod priori praeferendum esse iudicat: utramque methodum exemplis illustrat.

P. 389. Iam ad staphyloma Noster in sectione octava accedit. Oritur hic tumor, si post vulnus, corneae inflicum, vel ulcus corneae, iris vel tunica humoris aquei prolabuntur; sed ex ulcere in superficie interna corneae et scleroticae staphylomatis species oriuntur, elevatione praeternaturali partis corneae vel scleroticae conspiciendae. In hac cornea transparentis manet; in illa coecitas plerumque adest.

Exstir-

Exstirpationem aequae, ac compressionem tumoris improbat. Cum malum incisioni rarissime cedat, p. 394. butyro antimonii Noster optimo cum successu usus est: parua enim eius portione tumorem semel quotidie vel alternis diebus tangens post quamlibet applicationem oculum cum lacte tepido eluit, et saepissime post tertiam applicationem staphyloma evanescit. Stimulando hic hoc medicamentum, non rodendo agit, nec escharam relinquit: parum enim applicatur, lacrymaeque affluentés acrimoniam inuoluunt, causticamque vim infringunt.

Sectio nona nouam methodum hypopyum p. 405. curandi offert. Cum discussio in hoc morbo incisioni et euacuationi materiae semper sit praefenda, remedia, ab aliis hunc in finem commendata, Nostro non satisfaciunt. Certum et tutum semper decoctum florum maluae expertus est: hoc enim decocto saepius de die oculum lauans per interualla fascia comprimente, hoc decocto madida, eum obtegit, ubi post decimum tertium vel quartum diem materiam semper discussam vidit.

Offert nobis sectio decima iridis, choroideae p. 415. contiguae, secessum. Docuerunt hactenus fere omnes anatomici, iridem choroideae continuationem; cuius vero contrarium Cl. HOIN *) detegens probauit. Is enim in pluribus cadauerum oculis iridem leuissima quidem tractione plane a choroidea separatam vidit: id quod et obseruationibus in viuis confirmatum habuit. Cui Noster assentitur, duobusque exemplis contiguitatem iridis cum choroidea illustrat. Virgini ex vlcere cor- p. 420. neae iris prolapsa staphyloma produxit, nec a cicatrice postea, staphylomate evanescente, separari potuit:

*) vid. mémoires de l'academie des sciences de Dijon an. 1768.

potuit: coecitate relicta, doloribus semper fere magnis perceptis, subito iam, cum in variis partibus iridis superioribus secessus fieret; cessantibus quinque hae pupillae artificiales visum aegrae quodammodo restituebant: dilatabantur hae contractebanturque non per radios solis, sed sola directione axis bulbi: ea enim versus inferiora fixa, diameter earum minima erat, versus horizontem maiorem, et versus superiora maxima.

Pertractatur in sectione vndecima motus iridis in confirmata coecitate superstes: in ea enim pupillas, ex varia radiorum lucis applicatione contractas dilatatasque se obseruasse duobus exemplis. monstrat: cuius causam in iridis cum choroidea contiguitate inesse autumat. Nam iris, nerueo muscularis tunica, nervos ex ganglio lenticulari accipiens, in paralyfi nerui optici non afficitur; quod vero in gutta serena fit.

P. 429. Obseruauit tandem Cl. Auctor, qui ex habitu externo bulbi myops videretur, quem tamen vitro conuexo (*mi-cataracte*) vti oporteret: qui ideo ei, cui cataracta extracta est, haud dissimilis fuit. Causam huius phaenomeni in lente denfiori et plana quaerit.

P. 435. In appendice formularum, in morbis oculorum adhibendarum, compositionem, vsum et methodum adhibendi exponit. Emendatum e. g. extractum saturni apponimus. Rp. Lithargyr. libr. vnam; acet. vini opt. libr. duas. M. coqu. ad pultis consistent. Instill. sensim aquae feruid. libr. sedecim; perpetuo agitentur. Stent per viginti quatuor horas in loco frigido; decantentur. Quatuor huius medicamenti guttas in spiritus vini camphorati guttas tres, et aquae fontan. vnciam vnam instillat, oculumque lauat. GOVLARDI extractum hoc multo minus esse contendit.

Noui commentarii societatis Regiae scientiarum
Gottingensis. Tom. I. ad a. MDCCLXIX
et MDCCLXX. Gottingae et Gothae, apud
Ioan. Christ. Dieterich. 1771. 4. tabb.
aen. 12. pagg. 402. Tomus II. ad a.
MDCCLXXI. ibid. 1772, pagg. 385. tabb.
aen. 10.

Cum variis impedimentis institutum commenta-
riorum societatis illustris edendorum inter-
ruptum esset: societas constituit nouorum com-
mentariorum inscriptione tractatus Cll. Sodalium
publici iuris facere, quorum primos tomos hic
Lectoribus indicamus. In praefatione Cl. HEYNE,
qui societati est a secretis, fata societatis enarrat,
mutationesque sodalium eorumque numerum inte-
grum; in qua etiam legimus commentationes,
nondum a sodalibus societatis sigillatim editas, pro-
prio volumine editum iri, eodemque modo com-
mentaria, patrio sermone conscripta, vulgari.
Quilibet tomus in partes duas diuisus, in prima
continet, commentationes physicas ac mathemati-
cas, in altera historicas et philologicas. Nos, mis-
sis iis, quae a nostra instituti ratione alienae viden-
tur, indicabimus earum summam, quae ad physsi-
cam classem propius spectant.

Harum in numero est in primo tomo

I. ALBERTI DE HALLER *commentatio de* Tom. I.
plantis pabularibus nuperorum *). Duas classes p. I.
plantarum ad pabulares refert Ill. Auctor, papilion-
ceam

*) praelecta d. 9. decembr. 1769.

ceam et gramineam, earumque historiam hic reddit cum botanicam, tum oeconomicam, ut oeconomis certo constet, quas plantas colant, vel colere iubeantur. Quare etiam in plerisque addit nomina patrii sermonis. Ex gramineis primo recenset *Phleum pratense* LINN. monetque, diligenter illud in re oeconomica esse discernendum a *nodoso* et *alpino* LINN. multoque accuratius pro agricolis plantas discerni oportere, quam pro botanicis, cum etiam varietates agricolis vel plures, vel minores reddant redditus. Alterum gramen est de *Poae* genere, (*Birdgras*) nouiter ex America allatum, proximum *Poae angustifoliae* LINN. Princeps ei laus est, radiculis fere ex singulo nodo luxuriare, quae in proprios culmos conualescant: hinc magnum foeni pondus, quo omnia alia gramina superet, reddere. Tertium gramen est *Lolium perenne* LINN. (*Raygras*, *Graslauch*), cuius plures sunt varietates, diligenter attendendae; neque tamen huic graminei multus est usus. *Auenam elatiorem* LINN. ideo laudant, quod decem integris annis superuiuat: in Heluetia tamen non colitur, videturque Ill. Auctori durum, gracile et praecox gramen. Alia gramina ad pabulares plantas non refert.

p. II. Primam et antiquissimam alterius classis dicit Ill. Auctor, *Medicaginem satiuam* huicque addit, *lupulinam* et *falcata* LINN. quarum priorem, cum ter quaterue defecari possit, pabulum sat copiosum, inflans tamen et pene nimis luxuriosum dare putat: praeterea etiam terram radicibus complicatis impedire, quo minus aratro subigi queat, neque ficcari posse; posteriores vix sumtus culturae reddere. Ex trifoliis huc refert *Trifolium pratense*, *hybridum*, *fragiferum*, *agrarium*, et *stellatum* LINN. Pratense optimum pabulum frequentissimumque

numque esse constat; vaccis tamen praestare et equis, idque vitii habere, quod vtraque inflet, si sibi indulserint: adipem etiam potius augere, quam lac. Hybridi vitium est, quod annuum fit. Fragiferum et agrarium in Anglia potissimum colitur, diciturque prius in Hibernia ad septem pedes se extendere. De stellato id monet Ill. Auctor, quod fertilitatem terrae non minuat, praecipue ab equis ametur, qui vires inde acquirant; videtur tamen Ei vix sumtus redditurum.

Afferit Ill. Auctor ex plantis papilionaceis, quae p. 19. foliis sunt pinnatis, *Hedysarum Onobrychidem* LINN., quod *Esparsette* dicunt; illudque ceteris, pabulo destinatis, plantis omnibus praestare existimat. Omne enim solum tolerat, diu durat, vt ad quadragesimum annum supersit. Siccatio curam exigit: cauendum enim, ne folia delabantur, ac ne absque sale aut intermisso stramine in horrea condantur. Cultus eius facilis est. Huc addit *Hedysarum alpinum* et aliud, quod *coronarium* LINN. esse videtur. De viciis nihil profert. *Coronillam* vero *variā* LINN. diffundentibus magnisque ramis, si colatur, praeditam, oeconomiae vtilem fore coniiicit: tentanti tamen non successit, cum semina male maturentur. *Robiniam pseudo-acaciam* LINN. aliasque arbores in foliis nutrimentum praebere addit. Suadetque, si ex papilionaceis aliqua planta coli debeat, vt *Orobis luteus* LINN. coletur, cuius, cum nulla icon proftet, addit descriptionem. Praeter has p. 29. duas herbarum pabularium classes, in eundem finem coluntur *Spergula aruensis*, et *Poterium Sanguisorba* LINN. Potissimum virides plantae pabulo feruiunt; ex posteriore tamen et foenum fit, equis non ingratum. Huc etiam referri posse existimat Ill. Auctor *Isatidem satiuam*, *Rubiam tinctoriam*, atque *Alchemillam*.

p. 30.

2. EIVSDEM *commentatio de vento Rupensi* *)
Cum Ill. Auctor *Rupe* sex integris annis vixerit, ventum, qui illic solennis erat, sollicite, exstructo in libero loco proprio theatro, observavit, atque hic, praemissa loci descriptione, tabulas, quae venti tempestatumque varietatem indicant, proponit. In aula Rupensi ventus hic frequenter regnat, incipitque a hora nona matutina, ut sensim eius vires intendantur: deinde a quarta pomeridiana sensim iterum exspirat, ut noctes absque vento calidissimae sequantur. Ex tabulis, per octo menses continuo annotatis, apparet, ventum plerumque ex boreali plaga flare, et serenum coelum cum eo conspirare; dari etiam, ubi turbidum sit, aut pluat.

p. 41.

Causam phaenomeni derivat Ill. Auctor inde, quod angusta vallis pateat inter boream et occidentem, montesque ad orientem et austrum positi reliquos auertant ventos. Ratio, cur certis diei horis spiret, in sole posita est, qui aerem rarefacit, et ita frigidior borealis in rariorem se diffundit. Idem status ventus dominatur in valle Vriensi; in Valesia vero Eurus vel Fauonius spirant, vel plena est ventorum quies. Hinc coguntur incolae per aestatem in montanis degere locis. Frequens ibi, Octoduri etiam, frequentior est fatuitas. Plurimique homines ibi misere viuunt, strumisque et inertia totius corporis infestantur, ut etiam a collectarum foecum in intestino recto mole moriantur. Dubitat, an solis aestus sit vna causa, quem conferre quidem concedit; neque aquis eam tribuit, cum sint purissimae.

Ex

*) prael. d. 8 dec. 1770.

Ex Tomo secundo ad nos pertinet.

T. II.

I. ALBERTI DE HALLER *ad figuram nervorum cordis lateris sinistri Cl. Iuuenis ANDERSCHII, discipuli sui diuinatio **). Prouulgat hic Ill. Auſtor iconem nervorum cordis, quos Cl. ANDERSCH perſequendos olim commiſit. Qui multo labore eos diſquiſit, et tabulam a *Kaltenhofero* pingi curauit. Poſtea vero, ſcripta iam diſputatione, infelici morbo Cl. ANDERSCH mentis liberum uſum amiſit. Ill. HALLERVS igitur hanc egregiam tabulam noluit perdi, ſed, cum diſputatio ipſa interiſſet, quae delineata ad corpus humanum ſunt, et litterarum ſenſum deſcriptionibus expreſſit, et multa emendauit, litteras reſque ipſas cum tabula comparans. Ipſae vero horum nervorum ramificationes a nobis hic non nominari poſſunt, ſed Lectores ad ipſam ſunt amandandi iconem. p. I.

2. *De hodierno more examinandi aquas minerales, nondum ab omnibus erroribus ac commentis repurgato, commentatio*, Auſtore RVD. AVG. VOGEL **). Primo neceſſarium eſſe affirmat, ut fontium medicatorum diſquiſitio in ipſo ſcaturiginis loco inſtituatur, ut aquam accipias omnibus ſuis particulis conſtitutiuis praeditam, poſſisque de grauitate ſpecifica recte iudicare; ad quam determinandam etiam requiratur, ut cum eadem ſemper aqua fontana, cruda, fons medicatus comparetur. Tum oſtendit, non ineſſe eas particulas aquis medicatis, quas haecenus aſſumſerunt doctiſſimi viri. Negat enim ineſſe iis vitriolum martis, cum poſt euaporationem eiſdem nihil reperiatur; ſed colorem nigrum deriuandum dicit, ex martialibus

R 2

et

*) miſſa ad ſociet. d. 14 aug. 1771.

**) praelecta d. 5 ian. 1771.

et vitriolico spiritu, separatim in aquis his contentis, faleque vel amaro, Glauberiano simili, vel communi, vel utroque. Id quod experimentis, quae instituit Cl. Auctor, comprobatum habet.

p. 21. Postea non concedit Cl. Auctor, inesse aquis mineralibus sal alcali minerale, cum solutiones vitrioli martis, et veneris, itemque aluminis et sacchari saturni, omnes aliis salibus, culinari et mirabili Glauberiano aequae, atque a salibus alcalinis praecipitetur. Nec syrupi violarum coeruleus color, mutatus in viridem, neque efferuescentia fontis mineralis cum acidis, alcali adesse probant: prius enim a particulis vitrioli martis constitutivis coniunctis; alterum a terra alcalina, aquis inhaerente, dependet. Vt salis alcalini praesentia demonstretur, requiritur, mercurium vivum, aqua forti solutum, a fonte minerali praecipitari colore aurantio: sal commune, addito aquae medicatae spiritu salis, oriri, et sal mirabile, coniuncto acido vitrioli. Neque salis communis praesentiam inde certam esse concedit Cl. Auctor, quod aqua fortis in regiam conuertatur: nam sal mirabile idem praestat: hinc ad alia, ut illud probetur, est respiciendum. Sulphur denique, quod pluribus aquis medicatis inest, ita optime ostendi putat Noster, si fons mineralis per aliquot menses putredini exponatur, atque in eundem, super prunis calefactum, nummus argenteus recens purusque coniiciatur: qui, ubi sulphur inest, breui denigrabitur.

p. 27. 3) *Commentatio, naturam foliorum, de arboribus cadentium expendens*, Auctore IO. ANDREA MURRAY *). Mutationes, quae in frondibus, vetustate deciduis, sese manifestent, suis observationi-

*) praelecta d. 4 maii. 1771.

tionibus hic illustrat Cl. Auctor, quas cum in horto botanico instructissimo, tum in silvis nemoribusque instituit. Annuarum plantarum folia plerumque post florentiam iunctim cum ipsa planta marcescere et perire refert; quaedam tamen ex illis et biennibus decidunt prius, quam caulis pereat: quorum nonnulla affert exempla. Stirpes vero arborescentes, quoad casum foliorum, in tres diuidit classes; aliae enim folia per hiemem integra seruant; aliae quotannis autumno eadem deiiciunt; aliarum frondes autumno emoriuntur; colore tamen alieno varieque contortae atque aridae per hiemem in ramis restant. Priores pleraeque calidis in terris crescunt; sunt tamen in nostra etiam regione quaedam classes ad coniferas potissimum referendae, quae semperuirentes videntur. Quod in coniferis negat Cl. Auctor pendere a copia resinae, quum *Pinus Larix* et *Cupressus disticha* LINN. folia perdant. Hanc notam speciebus distinguendis etiam idoneam iudicat, monetque non semper harum arborum vigere folia, sed tantum per tres pluresue annos durare, postea clanculum decidere. Folia emortua iam per hiemem retinent, e nostris, *Fagus siliatica*, *Quercus Robur*, *Carpinus Betulus*, potissimum si tenellae sunt arbores: inter peregrinas *Rhus Corinus*, et *Quercus variae Americanae*. *Atriplici Halimo* id peculiare est, vt folia vsque ad ianuarii initium vegeta maneant, quo cum ramis exarescunt et arida remanent.

In foliorum, quouis autumno cadentium, con P. 37. sideratione Cl. Auctor primo ad colorem, varie mutatum, diligenter attendit, eumque esse constantem, et ad species constituendas aliquid ponderis habere confirmat. Quaedam folia, etiam viridia, cadunt. Disci superioris, inferiorisque color foliorum cadentium variat; superiorque prius labem inferiore

contrahit; quod quidem a diuersa vasorum natura fabricaque pendere cognitum habemus. Varios hos colores Cl. MURRAY ad classes quasdam reduxit, obseruauitque flauum esse maxime frequentem. Post superficiem superiorem ex plana vel concaua plerumque in conuexam mutari vidit. Directionem foliorum ante lapsum ita mutari, vt apice suo dependeant: quod quidem in variis varie obseruatur. *Gleditsia* autem *triacanthos* folia offert sursum oblique spectantia, foliolaque imbricatum petiolo appressa. Hanc directionem foliorum Cl. Auctor icone ex exemplis *Robiniae pseudo-acaciae*, *Mori nigrae*, *Gleditsiae triacanthae* et *Pteleae trifoliatae* illustrauit.

P. 42. His praegressis, ipse delapsus foliorum sequitur, qui laxiore facto et tandem exsoluto nexu folii per petiolum cum caule deriuandus est, atque diuersus est in foliis simplicibus, a casu foliorum compositorum. Cum enim illa vna cum petiolo suo delabantur; in his foliola prius, remanente petiolo communi, cadunt. Tempus, quo folia dimittuntur, eandem legem seruat, quae in reliquis plantarum mutationibus obtinet. Nimirum ad variam aeris temperiem se adstringit; eadem tamen serie, quoad species sese concomitantes, vel excipientes. Attendendum etiam ad plagam coeli, stationem vel aere clausam, vel liberiores atque ad variam arborum aetatem, quae in vna specie varietatem temporis efficiunt. Est igitur quaedam temporis conformitas, quoad eruptionem et casum foliorum: quae quo pateat, Cl. Auctor quorundam foliorum casum ad temporis ordinem hic describit.

p. 50. Causam huius delapsus foliorum Noster non in frigore solo; sed in gemmarum progerminatione praecipue ponit, quae, cum emergant, foliorum nexum infirmiores reddunt. Id tum adiuuant variae accedentes causae, gelu, pluuias et pro-

procellae, quibus perspiratio et inspiratio, omnino-
que ascensus humorum impediuntur.

4) D. AVG. GOTTLIEB RICHTER *obser-* p. 54.
uationes de bronchotomia *). Varia, quae Cl. Au-
ctor et in canibus, et in cadaueribus, et in homi-
nibus viuis, circa bronchotomiam notatu digna
obseruauit, hic communicat. Primo, cum glan-
dula thyroidea plerumque descendat, locumque,
in quo operatio instituenda sit, tegat, eam vel caute
remoueri, vel inferius tracheam incidendam iubet.
Postea non cutem solum, verum etiam telam cel-
lulofam, pinguedinem, musculos ibi positos, et
quidquid tegat locum arteriae asperae perforan-
dum, prius separanda existimat, quam instrumen-
tum in tracheam infigatur. Ad instrumentum quod
attinet, planus sit fere tubulus oportet, compressus,
ad latera tenuis, in medio paullo eleuatus, vt vulnus,
clauo triquetro factum, plane claudat, ne sanguis
arteriam asperam intret, vel aër irrumpat in telam
cellulofam: hinc vulgaris acus triquetra reiicienda
Cl. Auctori videtur. Praeterea tubulus incuruus
recto praestat. Vt itaque incommoda vulgaris in-
strumenti euitarentur, Cl. Auctor instrumentum
composuit, quo operatio bene succederet. Est illud
lanceola, vaginula, praeter cuspidem, vnus lineae
longitudine prominentem, latens, anceps, et cum
vagina incurua. Quae vna cum vaginula tracheae im-
mittitur; postea vero extrahitur, vulnere, a vagina
clauso.

His de cirfocele et hernia intestinali incarce- p. 60.
rata quaedam annectit. Priorem, quam alii rarum
dicunt morbum, frequenter observavit, putatque,
saepius cirfocele fuisse a chirurgis habitam pro
epiplocele: cum qua, praesertim in malo aucto,
plurima communia habet. Differre tamen ita dicit,
R. 4. vt

*) lecta d. 3 august. 1771.

vt cirfoceles tumor lente increfcatur decrefcatue, tumorisque augmentum ex inferiori regione ad annulum quafi adfcendere videatur, atque compreffio annuli abdominalis eam augeat. Multis iisque periculofiffimis fymptomatis, quae Cl. Auctor enarrat, ftipata eft cirfocele: hyeme eam minui obferuatio docuit, faepe fequitur hydrocele. Vix curatur, fi diutius durauerit, (initio enim fufpenforium faepe iuuat,) nifi castratione, quam Noster certum neque periculofum iudicat auxilium. Si enterocele coniuncta eft, haec prius aperienda reponendaque, deinde funiculus fpermaticus refecandus.

In hernia intestinali clyfteres ex fumo tabaci non folum plerumque inutiles, fed noxios etiam iudicat, fi intestina inflammata fuerint. Symptomata eius varia, fubinde mitiora; quae tamen femper funt metuenda. Cauffa mortis non femper eft fphacelus, fed aliud quidpiam, Cl. Auctori non plane cognitum. In duobus enim aegris, praeter infignem intestini incarcerati friabilitatem, nihil, quod laefum effet, inuenit. Reperit etiam in operatione cuiusdam herniae fibrillam, quae vno extremo annuli posteriori parieti, altero intestino adhaeferat, atque repositionem impedierat; ea vero difsecta, intestinum, iam valde inflammatum, feliciter reponebatur. Bracherium ferreum elasticum, quod annulum blanda et aequali vi compri- mat, coriaceis vel linteis praefert.

P. 68. 5) IOANNIS BECKMANNI *commentatio de reductione rerum fossilium ad genera naturalia protyporum* *). Petrificata melius *Fossilia* dici, doctrinamque de iis et oryctologiae nomen mereri, et vt quartam disciplinam reliquis historiae naturalis partibus adiungendam putat Cl. Auctor: deinde
plura

*) praelecta d. 6 iul. 1771.

plura de fossilium antiquitate, et huius disciplinae utilitate in omnem historiam naturalem docte et eleganter disputat: atque, cum fossilia in ordinem redigere necesse sit, praestare affirmat, eadem ad easdem classes, eosdem ordines, genera eadem, easdemque species reducere, quo ante petrefactionem fuissent referenda. Diuidit igitur ea, in *nota*, *ignota*, quorum protypa latent, eaque vel ex coniectura ad protypum quoddam referenda, vel fini oryctologiae subiungenda, veteribusque nominibus nominanda putat; et *ignorabilia*, quae ita sunt deformatæ, ut, etiamsi eorum protypa cognita sint, non tamen ad ea reduci queant: quae igitur ex oryctologia eiicienda, lusoribusque relinquenda arbitratur. Tum fossilia sunt vel *totalia*, quae integrum referunt protypum; vel *partialia*, quae partem eiusdem aliquam tantum exhibent: Totalia in ordine partialibus antecedant oportet. Denique, quoad modum, quo fossilia sint mutata, nominat ea 1) *immutata*, quae vix ullam subierint mutationem; 2) *incrustata*; 3) *calcinata*; 4) *petrificata*; 5) *metallisata*; 6) *impressa* et 7) *redintegrata*. Conuenit igitur systema Cl. Auctoris in plerisque cum Linneano, cuius hic specimen zoolithorum addit.

Tetrapodolithum hominis omnino dari negat. p. 81. Praeterimus alios tetrapodolithos a Cl. Auctore, hic diligenter collectos et ad species protyporum reductos; illius tantum mentionem iniiciamus, quem in Russia accepit, atque *tetrapodolithum cerui ignoti*, quem alcen fuisse coniicit, nominat, atque icone illustrauit. Ostendit illa portionem cranii, cum cornubus difformibus, forsan exostosi laborantibus. Ornitholithos veros non agnoscit Cl. Auctor: rostra enim auium, quae ab Auctoribus iudicantur, sepiarum rostra fuisse suspicatur.

catur. Ex amphibiolithis, amphibiolithos testu-
dinis dubios habet; affert autem, praeter alios a
LINNAEO dictos, amphibiolithos Raiarum. De
ichthyolithis monet, eos fere omnes ad duo genera
piscium esse referendos, nimirum ad *Pleunorecten*
et *Anarrhicham*: reliquos esse ignorabiles.

P. 104. 6) HENRICI AVGVSTI WRISBERGII
dissertatio de membrana fetus pupillari *). Primo
ostenditur membranae huius inuentionem nostris
temporibus ab Ill. HALLERO et CL. WACHEN-
DORFIO esse factam, eamque esse diuersam ab AL-
DROVANDI velamine, quod sit tenuis pellicula,
inter iridem et extremum corneae marginem hae-
rens; eamque etiam a communi quadrupedum
carniuororum differre. In omnibus reperiri qua-
drupedibus, probabileque esse, quod omnes vtero
viuentes pulli, praeter auium pisciumque, ea
sint instructi. Tempus, quo haec pupillaris
membrana appareat, Cl. Auctor diligenter disqui-
siuit, illudque in variis animalibus esse varium ob-
seruauit. Ab initio muci cuiusdam instar videtur;
quinto vero mense in humanis, vaccinis et equinis,
conspicitur, in reliquis animantibus eo maturius, quo
breuius grauiditatis tempus iis est concessum. Quo-
nam tempore, aut qua ratione haec membrana dispa-
reat, nondum constat. Versus finem octauae et
per nonum mensem, fluctuantia quaedam vascula
vidit, in maturis fetibus vero plane abfuit. In
iis tamen, quae clausis palpebris nascuntur, fetu-
bus, membrana pupillaris per quoddam tempus
remanet. Id quod confirmat exemplum pueri
coeci, per aliquot annos ad mortem pupillari mem-
brana instructi: qui, cum eum mortuum anatomi-
ce disquireret, oculumque massa ceracea injectum
lustra-

*) d. 6 april. 1771.

lustraret, obtulit, cornea detracta, iridem coniunctam cum membrana pupillari, cuius vasa nitide erant repleta. Pars eiusdem membranacea, naturali erat paullo robustior; ceterum ei plane similis. Ex hac igitur membrana remanente coecitatem ortam fuisse apparet.

Quaenaturam huius membranulae concernunt ex p. 112.

Cl. Auctoris observationibus eo redeunt, ut sit membrana tenuissima, pallida, continuata ab iride, instruatque numerosis vasculis, quae a ciliaribus et decoloribus circuli iridis secundi, et lentis crystallinae vasculis oriantur; ipsa vero membrana a crystallinae lentis capsula sit diuersa. In icone addita egregie pupillaris membrana, vasis eiusdem iniectis, cum ab anteriore, tum a laterali parte, repraesentantur.

VIII.

RVDOLPHI AVGVSTINI VOGEL Phil. et Medic. Doct. Archiatri Regii et in vniuersitate Gottingensi Prof. Medic. Ordinar. etc. academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. Gottingae apud Viduam Abr. Vandenhoeck 1772. 8. pagg. 668. praeter dedicationem, praefationem, tabulam totius operis, indicem et addenda.

Nouem classes morborum constituit Cl. VOGEL, eruditus, felix et prudens medicus, iisque ordines subiicit, quarum prima spectat *febres*. Altera classis *profluuia* continet, quae in duo ordines dispescuit, nimirum in *haemorrhagias* et *apocenos*. Tertia classis pertractat *epischeses*. Quarta *dolores* Noster persequitur. In quinta *spasmi* describuntur. Classis sexta *adynamias* complectitur. Classis septima *hyperaesthises* declarat. Octaua

Octava *cachexias* enarrat. Et nona denique classis *morbos mentis* expendit.

P. 4. Febris, quae et morbus, et medicina est, idea communi considerata, primum pertractat Noster intermittentes, inter quas et decimanarum et ultra mentionem fecit. Nec minus dispescit Cl. Auctor intermittentes in benignas et malignas, harum magnam collectionem recensuit Cl. MEDICVS *), quem Noster hic commendat. Valde perniciosum symptoma, quod febribus intermittentibus se adfo-
ciat, est sopor, qui primo aut altero frigoris in stadio incipit paroxysmo, ac plerumque in letalem apoplexiam abit. Raro periodicam obliuionem relinquunt. Eiusmodi febres apoplecticae et soporosae interdum epidemico more grassantur, testibus SYDENHAMO, BAGLIVIO, WERLHOFIO, aliisque. Ex vehementiore animi affectu vidit Noster, tertianam in tenera muliere in soporosam mutatam; nec tamen letiferam, cum semel tantum incideret.

P. 10. Causam materiale[m] harum febrium Noster ponit in pituita, lymphâ, bile seorsim vel coniunctim vitata. Tertianae exquisitae in corpore iuuenili, et visceribus haud laesis plerumque per duodecim horas durant et quinque, septem aut nouem circuitibus iudicantur. Accedentibus efflorescentiis labiorum tertio vel quarto paroxysmo, iudicatur febris septimo. Tempestas et anni tempora curationi febrium harum nec seruiunt, nec officiunt. Quartana interdum furunculo in buccis soluitur.

Curatio

*) EIVSD. *Geschichte periodischer Kranckheiten* II Th. p. 201. v. comm. nostr. secund. decad. suppl. I. p. 91 seqq.

Curatio intermittentium cernitur in depurandis p. 14.
 primis viis: dein in eo, quod reliquum est, corri-
 gendo, fibrarum tono labefactato restaurando et
 tota humorum massa nouo quasi balsamo iterum
 condiendo. Vomitoria vel breui ante paroxysmum,
 vel die vacuo exhibeantur. Neque grauidis ista
 nocent. Quartanae nec sine sale ammoniaco, aut
 regulo antimonii medicinali possunt superari. Re-
 gulo potest quoque in pertinacioribus quartanis
 addi mercurius dulcis et sulphur antimonii auri-
 tum. Inde interdum excitata saluatio fugat quar-
 tanam.

In diaeta febricitantium saliti et muria conditi p. 20.
 cibi neutiquam nocent; sed potius valde salubres
 sunt. Neque animalium carnes Cl. Auctor temere
 iuxta vulgi opiniones damnare potest.

Inter febres continuas sunt malignae et benignae. p. 28.
 In his suadet Noster inter alia acida diaphoreticis
 remixta; monet autem, ea quoque non omnem pa-
 ginam absoluere, propter maiorem humorum cor-
 ruptelam. In horum ergo connubio antiseptica
 non sunt negligenda, inter quae cortex Peruuianus
 in decocto, cum succo citri, et pulvis contrayeruae
 compositus, cum nitro datus, palmam ceteris omni-
 bus praeripiunt. Camphorae autem igneam natu-
 ram adscribit et idcirco eius vsus Nostro dis-
 plicet.

Ephemeram Noster appellat diariam, eamque p. 34.
 pro caussarum discrimine in primariam et sympto-
 maticam dispescendam esse monet. Haec vulne-
 rariam, lacteam, erysipelaceam, leuiorem catar-
 rhalem ac podagricam febrem sub se comprehen-
 dit. Amatoriam refert Noster ad primariam speciem.

In synocho simplici facies rubra, cutis humida p. 37.
 et pulsus magnus atque frequens inprimis atten-
 duntur a Nostro.

Febris

- p. 39. Febris neruosa lenta recentiorum, quam Cl. Auctor malignam lentam dicere mauult, etiam synochus ex classe putridarum est, cuius symptomata hic accurate enarrat, insimulque cum aliis suam dissertationem*), de neruosa febre eiusque genuina indole indicat.
- p. 44. In phrenitide obseruatur constans insania, maximeque a congestione feri tenuioris vel inspissati siue humorum omnino efficitur. Non esse semper phrenitidem inflammationem, in cerebro et meningibus ex sectionibus cadauerum patet; nec non ex maniacis, quibus cerebrum, vt et encephalos omnino, ab inflammatione est immune. Paraphrenitis est inflammatio diaphragmatis.
- p. 55. Quamquam ardentes febres ad malignas pertinent; diuersa tamen a malignarum cura omnino opus est ardentibus medendi methodus, quae cer-nitur in humectantibus ac refrigerantibus, cum ingestis, tum applicatis.
- p. 72. Hydrophobia in duo genera est dispescenda; vnum pendet a morfu animalis rabidi seu omnino irati; alterum sine contagione a causis inquilinis in acuta et inflammatoria febre sponte oritur. Experientia docuit, hic optimum praesidium esse in mercurialibus medicamentis interne et externe adhibitis, quibus Cl. Auctor adscribit vim specificam, qua virus sensim eneruatur ac demum exstinguitur. Ceterum limatura cupri, scarabaeus melolontha, meloeque, anagallis, radix belladonnae virulenta quoque a Nostro in hydrophobia laudantur. Praeterea et commendat vnguentum Neapolitanum,

*) Quae prodiit Gotting. 1767. 4. Resp. Sigism. Ern. Alex. Volprecht.

et pilulas WERLHOFII, ex camphora, cantharidibus mercurioque dulci compositas. Arteriotomiae in dorso pedis, ab ARRIGONIO nuper in promptuario Hannouerano propositae*), non fudit Noster. Occisi rabidi canis faucibus, gingivis et dentibus affricatur frustum elixae carnis, quod si sanus canis deuoret, nil de rabie illius timendum esse; sin autem repudiet cum anxio et tristi eiulatu, rabie canem fuisse correptum constat.

Sed haec haecenus de hydrophobia contagiosa. p. 81.
Sine contagio acutis morbis sponte superueniens hydrophobia haec remedia non desiderat. Multo potius in ea repetitae venaesectiones conducunt.

Praeseruare homines a variolis grassantibus p. 91.
magis in votis est, quam in artis potestate. Nec insitio variolarum quemuis tutum a malignis et letalibus variolis praestat. Extra epidemiam initio non est adornanda ob metum contagii variolosi. Extirpationis variolarum, quam Cll. KRAVSIVS **) et MEDICVS ***) proposuerunt, postremo facit mentionem.

Morbilli semel salutatos vix iterum occupant, p. 95.
sequuntur variolas, seu iis antecedunt, interdum vterque morbus mixtus obseruatur. Morbillorum insitionem primum a FRANCISCO HOME ****) tentatam

*) a. 1767. 64 St. a. 1768. 33. 38. 103 St. a. 1769. 14 St.

**) comm. nostr. vol. XIII. p. 48.

***) comm. nostr. secund. decad. supplem. II. p. 214 et 224.

****) v. princ. medic. p. 186. comm. nostr. Vol. XIV. p. 657.

tatam fuisse Noster affirmat cum sanguine, gossypio excepto. Cl. MONROVS *) saluam, lacrymasque aegrorum morbilloforum tempore criticos bombace exceptas aut squamulas cutis defluentes inferuire posse infitioni asserit.

p. 107. Petechiae, nunquam criticae, a Nostro ut morbus et ut symptoma, aliis morbis accedens, considerantur. Verosimilius porro Nostro videtur, haec exanthemata provenire a spissa putridaque, lymphâ, quam a putrida sanguinis dissolutione: quum in his sanguinis crusta densissima, uti pleuritico- rum post venae sectionem nonnunquam apparuerit. Quapropter et cum Cl. STRACKIO **) purgantia et enemata hic suadet.

p. 111. Scarlatina, purpurae quoque nomine, rubeolorum, morbillorum igneorum, zonae, ignis sacri, et rossaliorum veniens, ad remittentes amphimerinas spectat. Cuius duplex Noster constituit genus, simplex nimirum seu maculatum, dein pustulare. Saepe populariter grassatur scarlatina et per tres menses plerumque saevit. Praeterea laudatur et Cl. PLENCITZ ***).

p. 114. Efflam, quam SENNERTVS cum urticata confudit, Noster hic describit. Febrem postea bullosam pemphygoden recentiorum, quam b. SAVVAGES bis in mendicantibus vidit, Noster considerat. Bis Noster vidit linguae inflammationem, quam glossiten appellat. Tumet lingua interdum

*) de ven. lymphaticis p. 58. comm. nostr. Vol. VII, p. 39. it. *Neues Bremisches Magazin*. Vol. II. St. 2.

**) EIVSD. obs. medic. de morbo cum petechiis. comm. nostr. Vol. XVI. p. 415 seqq.

***) EIVSD. oper. med. phys. Tom. III. comm. nostr. Vol. XV. p. 137.

terdum variis ex caussis, vt ex copia alimenti *), a materia venerea et cancroſa; quibusdam autem et a natiuitate. Talis tumor congenitus Noſtro ſemel occurrit. Lingua erat magis extenſa in latum, omnino vero tumida cum mollitie, ex ore perpetuo emanabat ſaliua, nec et in tertio anno infans ſari poterat.

Angina a Noſtro in veram, gangraenofam, P. 133. ſtrangulatoriam, pituitofam et arthriticam diſpeſcitur. Gulae reſolutio a quibusdam temere ad anginam eſt translata. Secundum hanc anginae diuerſitatem Noſter dirigit curam. Anginam ſpuriam Noſter aquoſam et catarrhalem vocat cum HIPPOCRATE, quae vuam et tonſillas occupat. Sciendum praeterea eſt, ſyphilliticos et ſcrophuloſos ad quandam anginam ſpuriam eſſe pronos, quae, tametſi catarrhali ſeſe appropinquet; multum tamen ab ea diſtat. Alia rurfus angina notha morbis, vt variolis, acutis febribus etc. ſuperuenit, alia ab hydrargyroſi efficitur.

Pleuritidis diuiſio in humidam et ſiccam Noſtro p. 146. non arridet, quoniam vera et ſola pleuritis ſemper ſicca eſt. In peripneumoniam autem, ſeu pleuropneumoniam cadit haec diuiſio. Ad expectorationem nimis tenacis pituitae commendat Noſter eſſentiam galbani, cum ſpiritu frumenti paratam, ita, vt vnciae dimidiae galbani impurioris ſuperaffundantur ſpiritus dicti vnciae octo, cuius cochlear plenum quouis bihorio exhibendum ſit. Id quod remedium Noſter ex reſoluentibus potentiffimum atque tutum iudicat. Suadet et eandem eſſentiam externe lateri afflicto applicare.

Quando-

*) vid. CHPH. GOTTLIEB BÜTNER von einem aus dem Munde herausgegangenen Fleiſchgewächſe. Königsb. 1770. 4. comm. noſtr. XVIII. p. 350.
Tom. XIX. P. II. S

p. 173. Quandocunque hepatitis in suppurationem abit, tum nulla resolutionis signa, certe non perfecta apparent. Vrinam enim quidem semel Noster vidit criticam; at nullos sudores in hoc casu. Interim aeger post suppurationem rursus lectum reliquit, appetens bene cibos et dormiens, paullo post de novo febricitans, multum sputi purulenti exscreabat et anxie exspirabat. In suprema hepatis parte ingens apostema detectum est. Ad hepatitidem externe lapsus, atque grauior ictus hepatis, et vulnera capitis notabiliora *) conferunt.

p. 178. Nephritis potius sinistrum, quam dextrum occupat renem, raro vtrumque. Pariter in suppurationem abit, vbi, tumore in dorso apparente, nephrotomiae ope pus est euocandum. Fistulosum quidem vlcus in dorso plerumque relinquitur; ex quo autem nulla noxa aegro euenit. Ad vlceris purgationem internus et diuturnus vuae vrsi vsus videtur proficere.

p. 189. Vesicae vrinariae et vteri inflammatione tractata ad vteri scirrhum Noster venit. Feminae, eo laborantes, concubitus, ob dolorem ferre vix possunt, neque amplius fere ad concipiendum aptae sunt; grauidae autem factae perdifficilem partum aut nullum experiantur et rupturae vteri letali patent. Alias vteri scirrhus abortum citat.

p. 191. Agmen febrium inflammatoriarum, de quibus haecenus Cl. Auctor egit, claudit erysipelacea, quae vel partes corporis infestat et in facie saeuioribus stipata est symptomatibus, vel interdum omnes propemodum corporis partes simul occupat. Qui saepe erysipelate spontaneo seu primario, re-

lictor

*) v. Cl. CHESTON patholog. inquir. and obseru. in surgery p. 32 et 122. comm. nost. Vol. XV. p. 38 seqq.

liſto tumore pedis, quem occupauit, corripuntur, eodem tandem pereunt. Interdum aliis morbis ſuperuenit eryſipelas, quod appellatur ſecundarium, mortemque celeriter inducit. Denique quaedam addit de zoſtere, zona vel herpete, vbi zoſteris ſpurii quoque mentionem iniicit Cl. VOGEL.

Non videtur Noſtro in haemorrhagia narium p. 201. ſanguis ex venis, ſed arteriolis promanare, rariusque ſluit idem ex vtraque nare ſimul. Porro de epiſtaxi et de artificiali narium haemorrhagia per dilacerationem vaſorum in naribus agit, a veteribus et recentioribus commendatam.

Ex quorundam auctorum obſervatione haemoptiſis, eademque larga, ſine omni tuſſi cum quadam veluti duntaxat exſpiratione patet. Id quod Noſter quoque non negat quidem penitus in praemagno ſanguinis effluxu; exiſtimat tamen, eam ſaepe πτύσιν eſſe GALENI et ARETAEI haemorrhagiam oris vel faucium, quacum pulchre poteſt confundi haemoptiſis, de qua Noſter non multum ante diſputauit, vbi et de bulla ſanguinea, in palato occurrente, egit. Inter remedia contra haemoptiſin inuenimus quoque ſerum lactis aluminatum et ſal volatile oleoſum SYLVII.

In infantibus recens natis vomitus cruentus cum ancipiti euentu etiam aliquando incidit, et id quidem procul dubio ex vehementi ventris aut capitis in partu compreſſione. Suadet hic olei amygdalarum dulcium vnciam vnam, in qua diſſoluta ſit drachma dimidia ſpermatis ceti. p. 215.

Fluxus hepaticus ex hepatis vlcere inſanabilis eſſe Cl. Auctori videtur. Alter ex inteſtinorum vaſorumque meſaraicorum laxitate rebellis et pertinax eſt, tabemque letalem ſaepe infert. p. 220.

p. 229. Stymatosis est haemorrhagia penis immodica, seu actiua, idem periculum offert, atque aliae haemorrhagiae. Periodica seu passiva aequè salubris est viris, ac menstrua mulieribus. In morbos enim incidunt, quibus supprimitur aut retinetur stymatosis. Si ictero accedit ea, hunc solui observatum est. Id quod tamen vix vnquam fieri solet.

p. 236. Vteri in haemorrhagia laudatur a Nostro oleum martis, ad guttas octo vel duodecim cum largo aquae vehiculo aliquoties sumtum. Haemorrhagias a partu pilulae balsamicae BECCHERI vel STAHLII celerrime sistunt.

p. 237. Inter apocenosos refert et Noster catarrhum narium, faucium et pulmonum. Catarrho narium proxime accedit phlegmatorrhagia, in qua vltro et copiose humor tenuis lymphaticus, velut sanguis e naribus, quibusdam, sine satellitio catarrhi alioque incommodo, destillat.

p. 255. Fluxus coeliaci fons vniuersa humorum massa est, reliquosque illius fontes Noster reiicit. Re pentinum alteroque die iam finitum profluuium eiusmodi aluini Nostro in iuvene occurrit, quod cholerae aemulabatur, atque copiosa deiectiones aequè, ac vomitione materiae albae, pulticulam, ex brassica cauliflora cocta et contrita factam, quasi consistentia et colore referentis, absoluebatur.

p. 267. Cholera in siccam et humidam a Nostro diuiditur, iisque additur recentiorum flatuosa. Sicca Nostro videtur symptoma hypochondriacum, saepeque recurrens esse. Per aluum porro prodeunt calculi, hydatides, molae et alienigena. Subinde nimirum ex aluo concrementa sanguinea, fibrosa, cartilaginea deturbantur, quas molas intestinorum vocant. Item non temere quaeri posse Nostro videtur: annon interdum in intestinis
queant

queant generari pili, cartilaginee aliaque monstrosa concrementa, cuiusmodi interdum in abscessibus et tumoribus viscerum tunicatis reperiuntur? Ipsi Nostro constat, glomerem pilorum, lino pexo simillimorum, ab aluo matronae, diu afflictæ, reiectum esse.

Ad epischeses eos morbos Noster refert, qui ex retentione excernendorum oriuntur e. gr. menstruorum suppressione, quam nonnunquam hymen prorsus clausum, aut membrana, ibi sita, et ostium vaginae claudens efficit. Hic scalpello via aperienda et turunda aperta feruanda est. Dein est fistula plumbea digiti crassiti, e cerussæ vnguento obducta, si opus est, immittenda. p. 289.

Ad causas ischuriae et dysuriae rariores pertinent hernia vesicae, vermes ibidem hospitantes et capilli. Si capilli minguntur trichiasis appellatur morbus. Hernia vesicae est, ubi eius pars in perinaeo apparet, aut per anulum musculi obliqui prorumpit, vel in inguine prominet, vel testis adeo tunicas diducens in scrotum descendit. Qui morbus cognosci potest, si homo urinam non reddere potest, nisi presso exterius tumore. p. 310.

Inter dolores primum nominat Noster cephalalgiam, odontalgiam et otalgiam, iisque subiungit deglutitionem impeditam. Denegatur nimirum transitus ciborum vel ex impedimento in superioris gulae parte, vel in media*) aut inferiore**). Procedente morbo, et tenuia molliaque absque dolore non deglutiiri possunt. Ventriculus vacuus, cum repletur, dolet, magis tamen hic, quam ille. Non paucis, maxime ieiunis insipida lymp̃ha in os ascendit. Sub deglutitione magna eructatio, quae si abest, insignis anxietas. Malum interdum remittit, sed

S 3

mox

*) vid. Verhandel. van. de Hollandsche maatsch XIII. Deel. p. 262.

**) vid. ibid. XII. Deel p. 644. Comment. nostr. Vol. XVIII. p. 597.

mox recurrit. Corpus subinde emarcescit et loco tenuioris lymphae spissior demum pituita sub deglutitione reiiicitur. Morbus diu saepe durat, et per plures menses annosque continuat. Causae huius mali non raro in cadauere primum cognoscuntur. Spastica plerumque tollitur, nisi proficiscatur a vitio mechanico, quod in glandulosarum et membrana-
cearum partium humoribus, scirrhis, indurationibus, modo glandulam thyreoideam, modo tracheam, gulam, glandulas dorsales, ventriculum ac imprimis cardiam, pancreas, nec non alias atque alias partes, quin pulmones ipsos occupantibus, cernitur.

P. 334. Signis iam communibus, iam propriis huius morbi vel superius, vel inferius oesophagum spastice contrahentis, accurate enarratis, ad istum morbum tollendum, externa aequae, atque interna antispasmodica et anodyna cum discutientibus requiri, Noster arbitratur, atque purgantium noxium usum hic declarat. In extremo casu balaenae flexilis, cuius apex spongia est munitus, aut fistulae, quae longae in oesophagum demissae cum annexa vesica, succos nutrientes in se continente*), vsus hic suadetur. Quidam aegri necessitate commanfos cibos digitis suis vi intrudere didicerunt.

P. 337. Praeterea impedit etiam, licet rarissime, deglutitionem laxatio appendicum ossis hyoidis, eaque a violenta musculorum hyopharyngeorum distensione sub maioris atque crassioris boli deglutitione produ-
citur. Tum apta ossis hyoidei ope digitorum contractio, eaque reiterata, illico morbum tollit.

P. 341. Maxime affinem cardialgiae Noster arbitratur esse ventriculi inflationem, quae continuata suffocationis metum facit, quin immo cartilagineм ensiformem ex sua sede mouet, ipsumque ventriculum ad rupturam deducit.

Videtur

*) vid. Journ. de Médéc. cet. Tom. XXXI. p. 431.

Videtur Nostro arthritis ex peculiari succo P. 371.
morbido nasci, quem natura ad praeternaturallem legem coquit et per ista plerumque vasa, quae articulorum ligamentis ac membranis non minus, quam tendinibus smegma suum naturale largiuntur, rarissime in ipso articulorum cauo per glandularum, ibi positarum, arteriolas cum rubore inflammatorio, vel inflammatione deponit.

Raphania, seu morbus rigidus est morbus spas- P. 397.
modico convulsivus, interdum epidemicus, ab Ill. LINNAEO *) ita dictus. Causam huius morbi, ab Ill. LINNAEO nominatam non assumit. Nemo fere non, praeter infantes lactentes, eidem subiectus est. Forte lac videtur antidotum esse contra hunc morbum, quoniam lactentes ab eo manent immunes. Perdifficile iudicat quidem, causam huius morbi reperiri; existimat tamen, omnes causas materiales, quae spasmos excitare valent, etiam vim habere, raphaniam nunc in multis, nunc in paucioribus, nunc et in vno homine suscitandi. Tametsi vero legitima morbi causa nondum potuit reperiri; minime is pro incurabili censendus est. Constat, esse miasma acre causam, illiusque vel correctio, vel expulsio a medico est tentanda. Quod si vero suspicio cadit in semina venenata, fecalinis ac hordeaceis, vnde panis conficitur, intermixta, tutum omnino est, licet superuacuum, ista semina sollicite a prioribus repurgare, eaque in animalibus domesticis tentare.

Specifici cuiusdam medicamenti aduersus epilepsiam chronicam, quod venereae indolis est et ex vitriolo de cypro paratur, hic a Nostro mentio est iniecta.

S 4

Oleum

*) v. amoen. Acad. Vol. VI. p. 430. v. comm. nostr. secund. decad. supplem. I. p. 24.

p. 415. Oleum scorpionum, lumbis illitum, iuuat in tussi conuulsiua, nec non vnguentum pectorale commode pectori applicatum. Hoc minus proficit, quam illud. Inter cibos acetaria quam maxime prodesse in hac tussi, fideliter monet Cl. VOGEL.

p. 431. Ruminationem humanam neminem audacter negare posse Noster arbitratur. Alia ruminatione a natiuitate suam originem trahit, sic, vt a parentibus ad embryonem transferatur, aut connata saltem existat; alia a morbo ventriculi, nominatim vomitu frequenti aut diuturna eructatione. Haec nec selectis cibis, nec medicamentis obtemperat; sed pertinaci repressiōi, qua motus ventriculi supprimuntur; illam nemo quidem curauit, quam Noster tamen non pro plane insanabili habet.

p. 435. Pessimum atque exitialem Noster eum iudicat vomitum, quo liquida, atramentum, chocolata, aut tabacum colore referentia, copiose euomuntur. Vomitus a ventione optime auertit spiritus roris-marini, in charta empyretica extus ventriculo applicatus.

p. 455. Progreditur Noster ad apoplexiam, cuius causae in sex classes hic sunt distributae. Nulla aetas, ne infantilis quidem, ab ea immunis est. Discrimen apoplexiae in sanguineam et serosam in curatione non magnopere est attendendum, quod certis notis non vbiuis corporum deprehenditur. Curam imprimis dirigere oportet depletio et repletio vasorum encephali. Apoplexia ex obesitate omnem curationem respuit; prophylaxin vero permittit, quam oxymel scilliticum cum sale neutro, sapo Venetus, singula quidem sub largo ac diuturno vsu simulque diaeta tenuis, modicaeque exercitationes spondent.

Tinctu-

Tincturam vespae auratae suadet Noster in pa- p. 468.
 ralyfi cum GODOFR. CPHP. BEIREIS*), et
 tentamina vltiora cum ea optat. Paralyfis a fri-
 gore curationem ab antimonio crudo recipit. In-
 terdum paralyfin vehementior animi commotio
 tollit.

Caussa catalepseos non tam in encephalo, quam p. 470.
 in imo ventre haerere videtur. Id quod metho-
 dum medendi dirigit. Aduersus amaurosin ex vul-
 nere supercilii ipsius fricatio ea parte, vbi ex orbita
 neruus, qui ramus nerui ophthalmici est, educitur,
 prodesse obseruata est.

Ad loquelaе vitia pertinent blaefitas, balbuties P. 492.
 ischnophonia, battarismus, sibilismus, rottacif-
 mus, mutitas seu aponia.

Vertigo simplex est cum sensu circumgyratio- P. 515.
 nis; scotomia, si visus simul obscuratur; caduca de-
 nique, si praeterea homo in terram cadit, pereunte
 omni sensu. Quo grauior et diuturnior est verti-
 go, eo pertinaciorē caussam prodit. In verti-
 gine a narium haemorrhagia suppressa scarificatio-
 nes ceruicis ac dorsi vel ipsarum narium sua-
 dentur.

Si capitis dolorem ac vertiginem sequitur so- p. 520.
 nitus aurium, infaustum saepe exhibet apoplexiae
 praesagium. Ac in vertiginosis, syncopticis atque
 epilepticis insultum nouum prodit. In febribus acutis
 solum sonitum aurium, haemorrhagia narium, qua non
 succedente, delirium portendit, vtique si suppres-
 sum lotium, aut si crudum mingitur.

S 5

Venit

*) vid. EIVSD. diff. de paralyfi grauissima femorum
 crurumque sanata. Helmstad. 1762. 4.

P. 527. Venit iam Noster ad icterum ab antiquis tunc arquatum, tunc regium, dictum, omni omnis aetatis generi communem, cuius causae sunt multiplices. Talem Noster vocat eum morbum, qui durat, et interea corpus, febre quadam plerumque superueniente, consumitur: quae, si leuior est febricula lenta, si grauior, hectica nominatur. Tabis autem cernuntur hic plures species: atrophia, infantibus potissimum communis; phthisis neruosa, olim hectica, seu cachexia. Cum ea conuenit tabes dorsalis seu coeca HIPPOCRATIS. Tertia species tabis hectica appellatur, et quarta eaque grauissima a graecis *Φθίσις* nominatur ac sicca et humida deprehenditur. Accidit interdum, vt vna fouea, aut forte binae in pulmone efformentur, parietibus callosis circum circa obductae, ita, vt collecta ibi materies minime parenchyma penetrare aut inficere possit, sed quotidie tota exscreetur, idque ingenti copia. Eiusmodi ergo homines fonticulum quasi in pulmone habent: alias bene comedunt, respirant, dormiunt, neque quidem contabescunt. Tussis autem constans, humida et longa facit, vt phthisi laborare eos nemo fere dubitet.

P. 546. In curatione tabis siue hecticae, siue phthificaе, ad febrem est respiciendum, et ad ipsius fomitem in massa sanguinea. Frustra plerumque hic cortex Peruvianus datur; antihecticum POTERII et tinctura antiphthifica GRAMMANI autem cum successu citra omnem experientiam exhibuit in hoc morbo.

P. 548. Atrophiae rachitis admodum affinis est, quin ipsa atrophia est, cum ea epiphyfes articulorum in tumorem eleuentur, ipsaque membra simul marcescant. Internae carotides arteriae et iugulares venae

venae iusto maiores; externae contra exiliores spectantur in rachiticis.

Proxima hydropis qualiscunque caussa pleris- p. 552.
que hodie esse creditur atonia, siue laxitas totius corporis omniumque viscerum; idque recte colligitur quidem ex remediorum tonicorum energia, quae omnia omnino proficiunt in hydropis variis speciebus; attamen nescit Noster, annon, in languore speciali vasorum nunc arteriosorum, nunc venosorum, nec non lymphaticorum, causa melius cernatur? Multos enim cachecticos ab hydropis immunes, et hydropis faccato laborantes satis alacres et sine cachexia saltem valde diu vidit. Quapropter languor in dimittendis humoribus ferrosus ex suis vasis facilis Nostro videtur hydropis caussa. Ac speciales tales imbecillitates, sine communi corporum labe, ex aliorum viscerum morborum affectione, sine totius corporis debilitate exemplis probat, quorum vnum addimus: observavit nimirum olim in matrona, cui brachium ex apoplexia paralyticum factum, particularem eiusmodi arteriae brachialis languorem, ut per plures dies nullus in carpo perciperetur pulsus, paralyti licet iam finita. Ex his omnibus itaque Cl. Auctor colligit, hydropes particulares multos in optima etiam viscerum et humorum constitutione oriri posse.

Optimum signum hydropis pectoris est fluctuatio, quam aeger sentit, reliqua Noster ambiguitatis accusat. Hydrops peritonaei, ut omnis faccatus hydrops, in mulieres potius cadit, quam in viros.

Omnis hydrops faccatus fere insanabilis est. p. 567.
Semel nihilominus tamen Nostro contigit, hydropem peritonaei stupendum, qui iam duodecim annos durauerat, oxymelite de colchico Cl.

STOERCKII *) feliciter sanatum fuisse: quod fere incredibilem diuresin per aliquot dies excitauerat. Hydrops peritonaei et abdominis faccatus, nec non hydrops vteri grauiore lapsu nonnunquam solvuntur.

P. 573. Clysteres in tympanite ex carminatiuis, licet vbique commendati, nullam ferunt opem. Calidi enim vapores flatus augent indeque et incommoda. Frigidi vero potius interdum conducunt. Paracentesis in tympanite abdominali non aliena videtur; tantum vero abest, vt vere profit, vt mortem potius acceleret.

P. 576. Scorbutus subinde oritur, paullatim symptomata augentur, ac tandem noua superueniunt. Quapropter tria scorbuti stadia Noster constituit. Ad discrimen in calidum, frigidum et muriaticum scorbutum in curatione non est attendendum: vt-pote quae nunquam experientia fida, sed imaginatio docta tantum stabiliuerunt; nec ad contagiosos, vti nonnulli volunt, est scorbutus referendus.

P. 582. Morbi venerei nascuntur quoque tum ex solo immoderatae veneris usu, tum ex contagione. An vero ex communi lecto, ex infecta veste, ex poculis, ex eiusdem latrinae usu, et per manus obstetricis venereae illi propagentur, valde dubitat Noster: item an illi interdum diu et ad multos annos lateant in corpore sine vlla nota manifesta. Usu cereorum, a Goulardianis diuersorum, commendato, ad bubones Noster venit, quos phlegmonodeos, oedematodeos, atque scirrhodeos esse asserit.

Tum

*) Erat hoc oxymel colchici ex duplo maiore dosi radicis paratum, quam Cl. STOERCKIUS in libro de colchico. v. comm. nostr. Vol. XIII. p. 127 et 130 seqq. recipi praeceperat, et quantitate cochlearis maioris mane et vesperi offerebatur.

Tum in viris, tum in feminis apparent in partibus genitalibus vlcuscula superficialia perinde, ac circa anum. Solent vero haec citra contagium venereum in viris interdum accidere, nec non in feminis quoque, sine et cum coitu. In coitu ex fluore albo acriori, sine coitu, ex acrimonia humorum, has partes inungentium, itemque ex haemorrhoidum vitio. Facile autem eiusmodi vitia ab vlceribus venereis possunt distingui; quod solis abstergentibus atque cathaereticis, sedulo applicatis, sanationem haud aegre admittunt.

Inter excrescentias venereas, quibus topicos P. 600. venereos morbos finit, reperimus verrucas, porros, condylomata, cristas, thymos, mariscos, rhagades seu fissuras, quae in partibus genitalibus vtriusque sexus, circa anum et in perinaeo apparent et solummodo, quoad magnitudinem, amplitudinem, rotunditatem, longitudinem, planitiem inter se differunt; curam autem omnes eandem postulant.

Ad sanandam luem veneream vnum ex his tri- p. 603. bus sufficit, lignum guaiacum, mercurius viuus et quaedam *) eius praeparata, dulcis et corrosiuus. Reliquis remediis antiueneris aegros, et medentes supersedere posse Noster arbitratur. Inter potentiora vero antisyphilitica merito huc camphora et lobelia **) sunt referenda: Guaiacum inprimis laudat Noster hic tum, si scrophulosa aut scorbutica cachexia, cum lue coniuncta est, nec minus contra dolores, ab impura venere olim ortos, et ab hydrargyrosi relictos. Lubenter Noster cum guaiaco radicem dulcamarae, saponariae, eiusdemque folia coniungit.

Si

*) v. VAN SWIETEN supra p. 87.

**) ib. p. 90.

p. 609. Si manus vel pedes tantum scabies infestat, eam optime citoque tollit herba boni Henrici recens bis de die imposita; quae, quasi magnetis instar, omnem humorem morbosum copiose et cum maximo foetore ex sanguine extrahit, vnde breui quoque tumor harum partium euanescit. Repulsae aut regressae scabiei ad cutem propulsionem adiuuat inter alia et fuligo, ad scrupulum saccharo admixta, et quotidie bis sumta. Porro et haec scabies velut miasma variolosum potest inferi. Hanc sequuntur hic lepra Graecorum, impetigo, elephantiasis seu lepra Arabum.

Elephantiasin bis in mare et femina Noster obseruauit, multaque symptomata, nunc ab antiquis, nunc a recentioribus nonnullis narrata, in suis aegris non vidit. In mare animaduertit Cl. VOGEL praemagnum pedum oedema et copiosum feri foetidi ex eo effluxum, vna cum singularibus vermibus, quos Cl. MURRAY *) accurate, vti solet, exposuit, addiditque icones: in femina hoc oedema prorsus defuit. Ad constituendam rite atque cognoscendam elephantiasin, eamque a Graecorum lepra, qua multo peior ac funestior, discernendam nihil aliud requiritur, quam vt cutis aspera, atque pruriens, non solum crebris maculis, sed et tumoribus crebris iisdemque, ex rubro liuidis, vel atris, insimulque, duris et valde dolorificis, inque longam et tardigradam exulcerationem pronis, obfessa sit. Laudatur et hic in elephantasi externus sus boni Henrici et dropaces reprehenduntur.

Iam

*) EIVSD. de vermibus in lepra obuiis iuncta leprosi historia etc. Gotting. 1769. 8. c. f. v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 238.

Iam Noster progreditur ad achores, fauos et p. 622.
tineam, quorsum et crustam lacteam refert, quae
faciem inprimis occupat. Sunt vlcera manantia
ingenti cum prurigne et scalpendi cupidine con-
iuncta, acceduntque phthiriasis et scrophuli. Sustinent
haec {exanthemata interdum in acutis vicem
criticarum excretionum.

Inter quadragesimum quintum et quinquagesi- p. 634.
mum aetatis annum mulieres maxime cancro la-
borant; frequentissimeque moniales eo corripun-
tur. Non solum ex scirrho, licet plerumque, oritur;
sed ex nudatis, erosio, vel alio atque alio modo lae-
sis papillis nerueis in qualibet cutis parte, inprimis
in palpebris, oculis, lingua et cole. Est tum tumor
fungosus et idcirco quoque a Nostro cum b. VAN
SWIETEN *) cancer fungosus appellatur. Pro-
fluuium sanguinis ex cancro aperto causam mortis
non raro affert. Excipienda autem hic est illa
haemorrhagia, quae in mulieribus, quibus menstrua
suppressa sunt, ex papilla canerosae mammae singu-
lis mensibus forte contingit; quaeque nec immo-
derata, nec pernitiola est, sed quam maxime po-
tius salutaris, dum ad bonam curationem canceri
permultum confert. Belladonnae, quam et Cl.
TIMMERMANNVS **) laudat, usum cicutae
Noster in cancro praefert. Commendat porro
Noster aquae calcis viuae ***), sex vel octo yncias
mane et vesperi cum totidem ynciis decocti radice
sarsaparillae vel ligni guaiaci aliorumque radicum
et

*) EIVSD. comm. in BOERHAVII aphorism.
Tom. V. §. 496. v. comm. nostr. Vol. hoc. p. 72 seq.

**) EIVSD. progr. de belladonn. Rintel. 1765. 4. v.
comm. nostr. Vol. XV. p. 544.

***) v. Nostri diff. de curat. cancer. occ. et apert. per
aq. calcis viu. potam praestitam. Resp. G. M. H.
Baumbach. Gotting. 1769. 4.

et lignorum sanguinem depurantium, addito decocto secundo pro potu ordinario et fumtis singulo quatrinduo vel octiduo pilulis balsamicis BECHERI.

p. 640. De vermibus dum a Nostro exponitur, crinum et comedonum iniectione mentione, ascaridibus, lumbricis teretibus atque taeniae addit duas alias species, fasciolam nimirum et trichuridem. Taeniae rursus tres constituit species, taeniam acephalam, capitata, cucurbitinamque. Praeter has vermium, qui saepe figura et colore variant, species, varia animalcula, ut bufones, anguillulae, hirudines, gordii, lacertae, ranae e. s. p. reperiuntur.

p. 652. Inter anthelmintica palmam centenis aliis praeripere videntur Nostro, purgantia mercurialia, iterum iterumque data, semen cynae et decoctum hydrargyri. Atque ista remedia ascarides, lumbricos et trichurides fortiter enecant ac expellunt. Taeniis autem obuiam it radicis filicis, in puluerem contritae scrupulo, vel drachma dimidia, cum gummi guttae granis tribus mane et vespere per aliquot dies. Lumbricorum numero euacuato, aut taenia expulsa, homines ita, ut post paracenthesin, se vacuos sentiunt. Non raro et tum morbi nervosi remanent.

Hac occasione Noster genuinam compositionem remedii arcani Cl. HERRENSCHWANDTII, qui Cl. VOGEL hanc reuelavit, eamque patefacere permisit, communicat cum Lectoribus. Constat nimirum ille pulvis ex gummi gutta, sale absinthii et carbone fraxini.

p. 655. Morbis mentis finitur hic elegans ac lectu dignissimus liber. Ac primum mania et melancholia: dein fatuitas, stupiditas, amentia, et denique obliuio a Nostro exponuntur. Arcanam quandam dispo-

dispositionem in cerebro et systemate neruoso, cum idiosyncrasia quadam, quae et hereditaria est, statuit Noster. Falsa est opinio, febre carere maniam. Febre acuta iudicata esse insaniam et febrim per vrinam criticam vidit. Inter remedia hic hellebori albi radicem maniacis, melancholicis nigri ad pauca grana conducere legimus. Cadit porro in hos morbos mentis distinctio in connatos et acquisitos, quae profecto et curam magnopere dirigit. Laudantur et hic alii libri, ad quos legendos lectores amandantur, vti praeclare et pulchre solitus est Cl. VOGEL, per totum hunc librum.

IX.

Das in Wien im Jahre 1771 und 1772. sehr viele Menschen anfallende Fäulungsfieber. Samt Anhang einer böartigen Krankheit, welche im Jahre 1770. unter den Kindbetterinnen im Spital zu St. Marx gewüthet hat. Beschrieben von I. P. XAVERIO FAVKEN D. A. D. etc. Wien 1772. gedruckt bey Jo. Thom. Edlen v. Trattnern. Seiten 70. nebst Vorrede.

i. e.

Febris putrida, Viennae 1771 et 1772. admodum grassata, cum maligno quodam morbo puerperarum, qui 1770. in nosocomio St. Marx occurrit. Auctore I. P. XAVERIO FAVKEN. M.D.

Venaesectio in febribus putridis dirigenda est inflammatione, cum iis interdum coniuncta. Vbi venaesectio et eius repetitio aequè magna commoda, quam in febribus putridis,
Tom. XIX. P. II. T inflam-

inflammatione non coniuncta, eadem affert incommoda. Quapropter et Cl. FAVKEN symptomata et signa febrium simplicium putridarum, ubi materia morbosa in primis solummodo haeret viis, et compositarum seu cum inflammatione, ubi praeterea et alia pars corporis inflammata est, sedulo distinguit.

p. 31. Inter remedia, a Nostro hic adhibita, reperimus et camphoram, cuius vim antiputridam magnopere laudat. Saepe et crisis metastatica ad parotides aliasque partes in his morbis occurrit, et hic suadet, emollientibus, externe applicatis, et lente agentibus, laxantia crebriora, ne impuritates, his emollientibus motae, ad viscera nobiliora deferantur. In laesis actionibus animalibus non solum epispastica Noster adhibuit; sed et praeterea caput, capillis detonsis, fermento panis non frustra inuoluit. Infantili aetati morbus nec adeo infestabat, nec adeo diudurabat: ac, cum saepe in hac aetate accedebat haemorrhagia narium, non tam crebro exhibuit laxantia, quae illam cum maxima noxa turbare, quin imo sistere potuissent. Circum finem huius morbi in multis observauit pelliculam salinam granulofam, interdum sedimentum rubellum. Porro et exanthematis vidit leuatos fuisse aegros.

p. 44. Inter causas huius morbi refert Noster aeris vicissitudinem et impuritatem, nec non victus deprauationem, quin interdum boni defectum.

p. 61. Puerperarum morbus cernitur in depositione lactea in abdomine, qui cum eo, a b. VAN SWIETEN *) descripto, conuenit. Vterus nimirum post partum remanebat durus et tumebat, cum

*) v. EIVSD. comm. in aphor. BOERHAAVII Tom. IV. p. 505. comm. nostr. Vol. XIII. p. 407.

cum doloris sentu, lochiorum suppresso fluxu, diarrhoea, aestu, siti et cute humida, capitisque dolore. Abdomen tertio et quarto die nimis tumidum, et tensum versus diaphragma, omnino dolebat et mammae inueniebantur flaccidae. Die sexto et septimo ita increſcebant haec symptomata, vt hic interimerentur.

Abdomine aperto, reperiēbatur pseudomembrana ex caseosa lactea materia (*Laab*), quae omnia omnino viscera abdominalia eodem modo, quo omentum, obtegebat. Serum lactis autem in abdomine diffusum erat. In quibusdam et illud spectabatur in thorace. Alia atque alia viscera erant inflammata, et vterus in nonnullis sphacelo tactus. p. 64.

Ab initio hic morbus pro inflammatorio habebatur, atque ita venaeſectione cet. tractabatur; Sed, morbo hic accuratius examinato, in cadaueribus, suasu Cl. STOECKER venaeſectio omittebatur et camphora in magna doſi cum cortice Peruviano exhibebatur, nec non in clysmatibus; quae componebantur ex drachma vna camphorae, cum gummi arabici duabus trita, et octo vnciis iuscūli tenuis immixta, et ano immiſſa; quod tam diu quam diu fieri poteſt, ibi retinere aegrum oportet. Atque ita plus, quam quadraginta conſeruauit. p. 66.

Recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires. Fait et rédigé par Mr. RICHARD DE HAVTESIERCK Ecuyer, Chevalier de l'Ordre de St. Michel; ancien Premier-Médecin des camps et armées du Roi; Inspecteur général des Hôpitaux militaires de France, ayant la correspondance des mêmes Hôpitaux et des autres du Royaume, où l'on reçoit des soldats malades; Médecin-consultant du Roi, et ordinaire des grande et petite Ecuries; de l'Université de Montpellier, et des Académies de Gottingue et de Besiers. Tome second. A Paris, de l'imprimerie royale. 1772. 4. Alph. 4. plagg. 7. Praefatio et elenchus capitum plagg. 4.

i. e.

Collectio observationum medicarum, ex nosocomiis militaribus facta, et in ordinem redacta a Cl. RICHARD DE HAVTESIERCK. Tomus secundus.

p. 1. **I**dea secundi huius tomi eadem est, quae prioris, cuius recensionem alio tempore exhibuimus *): in eo tamen ordinem nonnihil mutavit Cl. RICHARD, quod singulos tractatus pro subiectorum, convenientia et affinitate combinaverit et inde tredecim capita constituerit, quae nunc, iisdem, ut in priore tomo, legibus servatis, indicabimus.

Caput primum commentarios topographico medicos sistit, nimirum

De

*) comm. horum Vol. XVI. p. 88 seqq.

De solo, incolis et morbis Alsatiae, Auctore Cl. p. 6.

RENAUDIN.

De situ, aere et aquis urbis Perpiniaci (Perpignan, p. 49.
et comitatus Ruscinonensis (Roussillon), Auctore Cl.

BONAPOS.

De solo, aere et aquis urbis Caleti (Calais) et p. 64.
regionis eiusdem (Calaisis), Auctore Cl. DAIGNAN.

Historiam medico topographicam urbis Monteli- p. 121.
marti in Delphinatu, Auctore Cl. MENVRET.

Caput secundum observationibus meteorologi. p. 191.
cis dicatum est; sed nullas, nisi eas continet,
quas Cl. DE LASSE' Atrebatii per integrum p. 193.
annum, nempe ab octobri 1770. usque ad septem-
brem 1771. instituit.

Caput tertium morbos epidemicos continet. p. 217.
Primo loco Cl. BONCERF febrem putridam p. 223.
malignam cum purpura coniunctam describit,
quae 1764. in vico *Angerville*, prope Stampas
grassata est: ortum debebataeri, a putrefactis cada-
veribus infecto, itemque esui animalium, morbo
iam affectorum, et cerealium, humido tempore col-
lectorum, neque ficcatorum: remotis his causis
vniuersalibus multum mitescebat; de reliquo autem
in principio vomitoria et postmodum laxantia ex
acidulorum classe, (venae sectionem non, nisi in
subiectis plethoricis, et quum intolerabilis capitis
dolor vrgeret, ac ne tunc quidem absque cautio-
ne), postmodum acida vegetabilia et mineralia,
cum regimine diaphoretico, adiuncto, ubi opus
erat, kermes minerali, requirebat.

Pertinacior et grauior eadem febris fuit, quae p. 228.
ex descriptione Cl. BONNEVAULT, per octo
integros menses anni 1766. Arboisii (*Arbois*)

in comitatu Burgundiae (*Franche - Comté*) potissimum inter inferioris sortis homines saeuiit; cui tamen purpura non superuenit: vermes eidem iungebantur: praeter consueta remedia acetum camphoratum viribus cardiacis et antisepticis maxime se commendauit.

P. 231. Amplior est descriptio morbi epidemici, cuius curam in nosocomio Montelimartensi Cl. MENVRET anno 1767 habuit. Erat pleuritis cum febre putrida verminosa complicata, cuius causae in praecedente autumno humido atque hyeme intensius frigido, et improuido vsu animalium, morbo epidemico aegrotantium, quaerendae erant; subsequente autem vere euauit: remediis, aduersus vtrumque morbum directis, in vsum vocatis, licet periculosior videretur, tamen feliciter plerumque cessit.

P. 259. Cl. DE LOISY morbos epidemicos describit, qui eodem anno Cabilloni (*Challan - sur - Saône*) grassati sunt, et quos ab eodem intensiore frigoris praegressi gradu deriuat. Vernali tempore morbi inflammatorii faucium, febre acuta stipati, cui frequenter eruptiones cutaneae, non tamen criticae, imo ipsa purpura, superueniebant, maxime communes erant, et potissimum infantibus infesti; lenioribus tamen medicamentis refrigerantibus, diluentibus, humectantibus, optime superabantur, raro, nec nisi in adultis, venae sectione necessaria: calidiore contra medicina exasperabantur. Autumno vero iidem morbi sensim sensimque in febres putridae indolis transibant, easque grauiiores, horrendis interdum symptomatibus comitatas, et vltra quinquagesimum saepe diem durantes; neque tamen et hae, modo conuenienter tractarentur, adeo insignem stragem ediderunt, licet summum omnino periculum portendere viderentur.

tur. Sanguinis missio vel inutilis erat, vel adeo noxia: summa ex aduersa parte vomitoriorum necessitas: laxantia, ne lenissimis quidem exceptis, morbum exacerbabant. In leuiore morbi gradu sola diluentia, refrigerantia, leniter resoluentia sufficiebant; grauior autem vesicatoria et cardiaca, praecipue camphoram, postulabat. Crisis manifesta numquam morbum soluebat, vnde tam diuturna eius duratio; versus finem tamen transpiratio paullum aucta obseruabatur.

CL. DUFOT de morbis epidemicis differit, p. 272
quos per annos 1766-1770. in pago Laodunensi (*le Laonnois*) obseruauit. Omnes ad febres putridas vel solas, vel simul inflammatorias pertinebant, licet diuersas formas assumerent; omnes etiam eodem fere modo tractauit, a venae sectione prorsus abstinens, vomitum ope tartari emetici primo cum sale Epsameni, postea cum decocto ipecacuanhae in largo vehiculo sumti, ciens, et postmodum, seruato regimine antiphlogistico, si quid amplius requirebatur auxilii, in cortice Peruviano, nunc solo, nunc cum camphora, nunc cum sale ammoniaco, nunc cum rheo, plerumque in infuso vinoso subsistens.

Progredimur ad caput quartum, quod de crisi- p. 286.
bus et metastasibus agit. Praemissis nonnullis generalioribus, quae hanc doctrinam spectant, observationes variorum medicorum enarrantur, quas breuiter repetemus. Infans sexennis post febrem acutam cum dolore in femore dextro correptus est abscessu sub axilla eiusdem lateris, cuius aperturae cum parentes repugnarent, pus resorptum aegrum in summum periculum coniecit: donec idem per vrinam ultra tres menses excerneretur, isque nullis in omni morbo adhibitis remediis, sanitati restitueretur. Miles pleuro-peripneumonia laborans, cum

recrudescente paroxysmo ex pede sanguis detractus esset, vrina sanguinolenta, per tres dies missa, sanatus est. Alius, cui in febre tertiana vena secta et emeticum exhibitum fuerat, disparente protinus febre, paralyfi linguae et asperae arteriae corripiebatur; emetica, draastica et clysteres stimulantibus, licet efficaciter agerent, tamen usu carebant; sed sternutatorium ex maiorana et helleboro albo, et masticatorium ex pipere albo, ingens materiae ferrosae effluuium praestabant, et vna cum vesicatorio, nuchae applicato, curationem absoluebant. Decubitus fistulosus ad anum in viro viginti septem annorum febrem acutam cum excreatione materiae purulentae sustulit. Leucophlegmatiae, ipsiusque adeo anasarcae curationes, per febrem intermittentem, sponte accedentem, praestitae, morbo iam per diuresin, iam per sudorem sublato. Vir viginti duorum annorum, post suppressos tumores subaxillares scrophulosos, inflammatione pectoris capiebatur, quam icterus vniuersalis, amaurosis, dolores intestinorum et vomitus continuus insequiebantur: tandem decubitus fiebat in epigastrio dextro, cum paralyfi extremitatum inferiorum; maturantibus autem applicatis, tumor eo deductus est, ut aperiri posset: quo facto, ingenti copiae puris cum materia nigricante seu sanguinolenta exitus factus, et aeger sanitati pristinae successiue restitutus est. In sexagenario, post apertum abscessum in digito minimo manus sinistrae, retentio urinae accessit, ubi catheteris ope vrina nigra et corrupta educata est; superflite tamen paralyfi vesicae satis pertinaci, nec nisi successu temporis cedente: Cl. M O V-
B L E T, obseruationis huius auctor, explicationem se plane ignorare fatetur; Cl. R I C H A R D autem hanc mutationem consensui neruorum tribuendam putat. Febris tertiana pertinacissima, omnibus adhi-

adhibitis remediis obfuscescens, non, nisi reuocata per usum decoctorum aliorumque resoluentium scabie, quae antea intempestiue repulsa fuerat, cedebat. Eques desultorius a vulnere gladio inflicto, febre inflammatoria corripiebatur, quae ob neglectum regimen in putridam degenerabat: post varias mutationes vesperti quadragesimi diei dolor in femore percipiebatur; succedentibus paullo post fluctuationis indicibus, abscessus incidebatur, detegebaturque fascia lata prorsus sphacelo corrupta: aptis autem adhibitis remediis internis aequae ac externis curatio perfecte succedebat. Tristior erat metastasis in alio milite, qui angina inflammatoria laborabat, quae nocte inter quartum et quintum morbi diem in pectoris oppressionem et colicam transiens septimo die aegrum iugulabat.

Caput quintum de morbis cutaneis, scabie cet. P. 308.
retropulsis differit. Cur haec vitia nostris tempo-
ris adeo communia sint, inde forte pendere existi-
mat Cl. RICHARD, quod virus venereum nunc
male corrigatur, et praesentis seculi viuendi ratio
humores, acriores redditos, facilius ad cutim debili-
tatam amandet. Adductae observationes vario-
rum auctorum morbos periculosissimos, a repressa
scabie ortos, enumerant, v. c. febres acutas, in-
flammatorias, hydropis varias species, asthma,
haemoptoen, phthisin, cariem costarum et sterni
cet. qui, quod optimum erat, scabie quocumque
modo reuocata; interdum etiam sine eius
recurfu, sanationem admiserunt; nonnunquam
tamen, omnibus incassum tentatis, aegros misere
confecerunt.

Caput sextum observationes de morbis hepatis, p. 329.
 simili modo collectas, sistit. Occurrunt hic varia
 T 5 exempla

exempla abscessuum ad hepar, felici euentu curatorum; calculus vesiculae felleae post choleram enatus, saluo tamen aegro per intestinum rectum excretus; nonnulla exempla noxae ex abusu potus spirituosi, variis mutationibus viscerum abdominalium conspicuae, inprimis hepatis, quod in vno subiecto 26, in alio 6 librarum pondus habuit: in alio multis tuberculis scirrhis obsitum conspectum est (in vno tamen horum aegrorum culpae quaedam pars in improuidum corticis Peruuiani usum, quo quartana repulsa fuit, coniici debet); icterus, et in alio subiecto abscessus ad hepar, laesionibus capitis superuenientes, abscessus in parte superiori, posteriori et conuexa hepatis, eroso diaphragmate pus in pectoris cauitatem effundens; tandemque peculiaris quidam morbus, hydropis biliosi et purulenti nomine, a Cl. DUBOUCHER insignitus, in femina viginti annorum observatus, quae hepatitide affecta, quinta hebdomade fluctuationis in abdomine indicia prodidit, vnde, ter intra paucos dies paracentesis instituta, et ingens copia materiae flavae et crassae educta est: post decem menses, iterum tumescente abdomine, eadem operatio repetebatur; febre vero hectica superueniente, res in deterius ruere videbantur: quum autem decimo quarto morbi mense septima vice paracentesin sustinuisset, eaque pus foetidissimum vna cum materia biliosa, sed vtrumque non inter se commixtum, reddidisset, abscessu ad vmbilicum formato et sponte rupto vsque ad decimum septimum mensem eiusdem indolis materiae exierunt, quam crisin excepit profluuium alui, eiusdem indolis, quo mediante simul partes membranaceae, ambitus aliquot pollicum, coloris ex rubro flauescens, excretae fuerunt; duobus elapsis mensibus, scabiosa eruptio, totum corpus obtegens, morbum felicissime terminauit.

Caput

Caput septimum de hydropo agit. Prolixe p. 360.

fatis Cl. RICHARD demonstrat, morbum hunc ideo saepe omnem curationem respuere, quod medentes tantum euacuantibus resolventibusque insistant, primae morbi originis, ab obstructis aut spastice contractis vasis minimis pendentis, nulla plane ratione habita; ideoque humectantibus prae reliquis opus esse, quibus si valentiori medicinae viae patulae redditae sint, omnia melius profectura esse. Quod et copiosae observationes adiunctae probant; ex quibus praeterea memorabilis visa est ea, quae Cl. BONAFOS debetur, de duobus militibus hydropicis, solo succo taraxaci restitutis: porro hydrops ascites, a plethora ortus, quem Cl. DUTIL potissimum repetita sanguinis missione sustulit; oedema, in corpore gibberoso itidem ab intercepto humorum circulo ortum, eodem modo curatum, quo, cum post annum rediisset, et alius medicus auxilio priori vti noluiisset, aeger mortuus est. et cor mirae magnitudinis et capacitatis obtulit; ascites pleuritidem secutus, paracentesi et diaeta lactea curatus; exemplum feminae, quae, intra duos annos cum dimidio, sexagesies paracentesin sustinuit, et hoc auxilio sensim medicinae locum parante tandem restituta est; hydrops ascites in senē 79 annorum vomitu curatus; idemque morbus in milite sublatus, in quo vectio in curru, cum una cum aliis aegrotis in alium locum deferretur, primum curationis initium fecit. Multae hic enarratae curationes peractae sunt pilulis quibusdam tonicis, a Cl. BACHER iam anno 1731 in usum vocatis, quarum utilitatem filius eius peculiari iam libello *) depraedicavit, (in quo etiam
vsum

*) Exposition des différens moyens usités dans le traitement des hydropisies. à Paris, 1771.

usum humectantium, in hoc morbo summis laudibus extollit), et multorum medicorum testimonia, qui iussu regis in nosocomiis militaribus experimenta cum hoc remedio instituerant, adduxit. Huius iam remedii compositionem, qualem Cl. BACHER exhibuit, nunc Cl. RICHARD publici iuriss facit: constant ex radicis hellebori nigri extracto, quod paratur, radicibus prius cum spiritu vini alkalifato maceratis, postea cum vino rhenano optimaе notae digestis, dein extracto in aqua soluto, rursus inspissato et addito tantillo spiritus vini optimi in extracti consistentiam redacto; huius extracti vnciae vni adduntur similis portio myrrhae, in aqua lento igne solutae, et ad extracti consistentiam inspissatae, et scrupuli decem pulueris foliorum cardui benedicti, ut massa existat libero aere siccanda et in pilulas, singulam grani dimidii, formanda. Harum pilularum effectus, praemissis humectantibus, eorumque usu adiuncto, cernitur potissimum in purgatione aluina et diuresi mouenda: usum etiam aliquem earum esse posse in pituitosis pectoris morbis, observatio quaedam, Cl. DAIGNAN sperare iubet; exulare autem debent, ubi nimia siccitas, aut putredo, aut gangraena adesse conspiciuntur: multum praeterea in dosi et tempore exhibendi prudentiae requiri, quisque facile perspicit.

P. 443. Caput octauum varias observationes de morbis conuulsivis et verminosis continet. Puella octo annorum, epileptica, usu infusi concentrati galii lutei et superueniente febre tertiana curata est; alia vndecim annorum, chorea S. Viti laborans, solis emollientibus et demulcentibus clysmatibus et balneis paucissimis antispasmodicis, proprie sic dictis, in usum vocatis: alia septendecim annorum, eodem morbo

morbo laborans, vomitoriis, purgantibusque repetitis, tandem tonicis et antispasmodicis, cumque conualesceret, frequenti sanguinis missione, qua tandem menstruus fluxus prouocatus, sanitati prorsus restituta est: qua occasione simul Cl. MADIER monet, castoreo tripla dosi opio addito, hoc vere corrigi; neutiquam tamen imminuta eius virtute, et tria opii nouemque castorei grana, spiritu vini dissoluta, et aquae tepidae admixta in intestinum rectum iniecta, praesentissimum anodynum sistere, quum opiata ventriculum offendant. Pleuritis, opii abusu in paraphrenitidem transiens, copiosis et subito repetitis venae sectionibus, kermes minerali in succo borraginis, quod sudor vehemens et diarrhoea biliosa insequiebantur, et demum lacte vaccino cum infuso hyperici remisto tollebatur. Pistorum morbo quodam singulari, asthmatis specie, laborant, in quo venae sectio aperte nocet; tussi autem per potionem stimulantem ex spiritu salis ammoniaci, floribus benzoes, syrupo de erysimo et aquis destillatis excitata, reiciuntur glomeres, ex mucositate et farina compacti, bronchia obstruendo morbi causam sistentes. Podagricus, a peripneumonia conualescens, grauiter iratus conuulsionibus letalibus corripiebatur. Miles vomitu continuo, singultu et conuulsionibus iam ad incitiam redactus, potione anthelmintica et purgante septem vermes viuos, longitudinis ab octo ad duodecim pollices, vomitu reddidit et sanatus est. In alio nauta epilepsia vehementissima producta est, a verme pedis longitudine, qui etiam vomitu viuos reiectus est. Iuuenis tredecim circa annorum per undecim dies conuulsionibus affectus est, quae omnibus remediis obsurdescebant; tamen usque ad articulum mortis sonis instrumentorum musicorum mitigabantur. Secto cadauere in confiniis ilei et crassorum intestino-

stinorum septem vermes, longitudinis tertiae partis brachii, conspiciebantur: qui irritando inflammationem intestinorum produxerant; similis etiam sub agone egressus erat. In alio viro, colica, 24 horas durante, extincto 367 vermes, quinque ad sex pollices longi et crassitie calami scriptorii, inuenti sunt, in glomerem conuoluti, qui inferiorem coli partem et coecum prorsus replebant; his ipsis intestinis simul inflammatis et gangraenosis. Miles quidam paralyfi linguae affectus et vocis exercitio destitutus, administrato emetico valentiore, multos vermes eiecit, et continuato purgantium cum anthelminticis coniunctorum vsu, perfecte conualuit. Virgo melancholica et conuulsionibus tentata sensim plus quam tria millia vermium cucurbitinorum per anum eiecit, et hoc morbo liberata sanitatem recuperavit. Cephalaea enormis, vermiculo, per sternutationem reiecto, sanata. Post febrem putridam verminosam in abdomine inuentum est serum flauescens, in quo vermes duo natabant, tertiusque iam perforato ileo in eo erat, vt prioribus se associaret; in eodem intestino erat voluulus, et in omnibus tenuibus excoriationes manifestae, iisdem animalibus adscribendae.

p. 487. Caput nonum de morbis oesophagi, ventriculi et intestinorum agit. Primo de angina inflammatoria, per sanguinis missiones copiosas, clysteres emollientes et interpositos purgantes, vesicatorium nuchae impositum, emplastra emollientia, et, quam primum licebat, gargarismata stimulantia oppugnata, quam postea abscessus in anteriore colli parte felicem ad finem perduxit. Porro de deglutito frustulo carnis male coctae, cuius detrusionem ope linteoli virgae balaenariae affixi frustra tentauerant, imo ipsum linteolum in oesophago reli-

reliquerant; febre iam exacerbata, sanguis aliquoties detractus et topica emollientia applicata sunt: postea, exhibita potione oleosa emetica, excitatus vomitus corpora peregrina expressit et sanitas rediit. Intempestive sumtum emeticum choleram produxit, quam diluentia, refrigerantia, acidula potulenta, adhibitis simul clysmatibus et fomentis emollientibus, aegre sustulerunt. Noxii effectus acidorum mineralium concentratorum: in puella oesophagus, et ventriculus, usque ad pylorum, gangraenosi; in alia virgine, quae tardius occubuerat, hinc inde in iisdem partibus ulcera, et in trium digitorum a pyloro distantia foramen, per quod ouum transire posset, inuenta sunt: miles autem, qui post duo minuta spiritum nitri vomitu reddiderat, denique sine apparente laesione oesophagi vel ventriculi restitutus est, postquam omnium dentium iacturam fecisset. Vomitus continuus materiae, caustica acrimonia praeditae, folius lactis usu curatus est, contra quem omnis generis remedia nihil praestiterant. Scirrhusae pylori indurationes, vomitus habitualis causae. Nuclei cerasorum et prunorum, coecum obturantes, in vno aegro, qui, globulis aliquot plumbeis deglutitis, sine dubio obstaculum, in intestinis haerens, se vincere posse existimauerat, hoc intestinum cum proxima ilei et coli parte inflammauerunt, et harum partium, coalitum effecerunt, conspicuis simul multis tuberculis scirrhusis, et insigni puris copia in cauitate contenta; in alio insignem tumorem cum ascite coniunctum, qui post decem menses mortem induxit. De colica pictorum seu saturnina, et de colica vegetabili Pictorum, cuius egregiam descriptionem Cl. BONTE' exhibuit *): magna vtriusque inter se conuenientia est,

*) vid. Comm. horum Vol. XII. p. 651 seqq.

est, cum ratione mutationum, quas causae licet omnino inter se diuersae in corpore producant: tum ratione curationis, quae potissimum euacuantia primarum viarum, at valentiora, requirit (leniora enim solida non satis viuide stimulant, quod tamen opus est, quo materiam adeo dense sibi inhaerentem expellant) interpositis anodynis: recidivae potissimum inde pendere solent, si morbus solis euacuantibus lenioribus impugnetur: venaesectio rarissime locum habet, et saepe paralyin inducit; summum et certissimum remedium in mutatione soli et aeris positum est, quae saepe sola paralyin relictam tollit.

P. 517. Caput decimum de iusto et iniusto usu corticis Peruviani agit. Improvide usurpatus aduersus febres intermittentes, antequam primae vel secundae etiam viae sufficienter euacuatae essent (vomitorio vix vnquam supersederi potest in eiusmodi febribus,) cachexiam, icterum, hydropem, pleuritidem, et mirando sane exemplo loquelae priuationem cum oppressione pectoris induxit: epidemica etiam tertiana eiusdem usum prorsus non tulit; quae tamen sola ptisana ex cichoreo et sale mirabili GLAUBERI profligebatur: ceterum eius virtus antiseptica duobus exemplis gangraenae cruris et carbunculorum in digito exortorum demonstratur.

P. 533. Caput vndecimum morbos quosdam chirurgicos recenset. Primo observationes Cl. SIMON, de carie tibiae, trepanatione in parte superiori et inferiori faciei internae, longa quidem, sed felici curatione sanatae; de fractura complicata tibiae, in qua cum superior fracti ossis pars semper sursum tenderet, nec tamen apte ferra rescindi posset, eam peculiari arcula et torculari Petitiano depressit et coali-

coalitionem praestitit: de extirpato tumore cystico, cranio insidente, cuius futuram exfoliationem, ne caries subsequeretur, perforando adiuuit: de restituto motu digitorum, a cicatrice post acceptum vulnus sublato, ita quidem, vt liber vsus manus redderetur. Cl. PETIT, nosocomii Hefdinensis chirurgus, de equite, in quo a casu ab alto pericranium solutum fuerat, quique, trepanationi iam subiiciendus, multum sanguinis et puris per aurem reddidit, crebrisque adhibitis venaesectionibus et fevero regimine, 43 dierum spatio conualuit: et de alio, qui ab equo deiectus et calcitratus, adhibito trepano et ingenti sanguinis, duram matrem comprimantis, et fragmentorum ossis copia remota, sanatus est. Cl. FONPERINNE de alio milite, qui ab ictu acinacis enorme vulnus super oculo dextro contraxerat, in quo, cum portio ossis coronalis sponte decederet, trepanationi supersederi posse putabatur; symptomatibus tamen incrementibus, eadem instituta et per discissam duram matrem semper subdeligando parte quadam cerebri, quam ad vnciam integram aestimabant, egressa, aeger post 95 dies restitutus est. Cl. MOISSIER in femina, cuius abdomen a boue cornibus vulneratum erat, intestino colo simul gangraena affecto, scarificationibus aliisque auxiliis aduersus gangraenam, et gastroraphia curationem praestitit, licet per ipsum morbi decursum aegra clam radicibus solani tuberosi vesceretur. Cl. PEYSSON in sene septuaginta fere annorum herniam inguinalem, a violento motu exortam, incarceratam, aegro operationem abhorrente, post sex dies suppuratione, per rupturam abscessus leuata, curatam vidit. Cl. LONGIS de hernia vesicae, qua ipsius filius laborauit: dolor erat in reddenda vrina, quae non, nisi guttatim effluebat, ad apicem glandis potissimum insignis, cum

Tom. XIX. P. II. V tumo-

tumore in inguine sinistro, enterocelen mentito, qui facile reponi se patiebatur, sed subito redibat, et repositus vrinae excretionem liberam reddebat: eo tempore, quo historia morbi huius conscribebatur, morbus nondum penitus sublatus erat; cuius tamen spem alebat Cl. LONGIS, interea infante in latus dextrum collocato, vrina ope cannulae extracta et compressionibus modicis adhibitis, strictaque diaeta seruata. Idem exemplum recenset iuuenis, qui testiculum, frigore tactum, sibi ipsi nouacula rescidit, et licet inprimis haemorrhagia ex discissa arteria spermatica grauia symptomata produceret; tamen intra mensem ita curatus est, vt inito postea matrimonio, liberos procrearet. Cl. LE RICHE militem, ab imprudenti vsu emetici hernia inguinali affectum, in qua intestina incarcerata gangraena corrumpebantur, operatione chirurgica et exhibitis laxantibus ex manna, in fero lactis soluta, et adiuncto oleo amygdalarum dulcium, intra duos menses restituit. Exempla nonnulla curationum vlcerum cancroforum, per cataplasma ex radicibus dauci trituras, ad mentem Cl. SVLZER *) praestitarum per Cl. DENIS. Idem in infante recens nato digitos coalitos, et membrana satis densa obductos, vidit: cum post aliquod tempus infans sufficiens robur acquisiisset, vt operationi subiici posset, eadem satis bene cedere videbatur; sed interea infans ex indigestione mortuus est. Cl. BOUILLARD de mucrone gladii duo et dimidium pollices longo, qui per longum tempus intra ossa cubiti delituerat; ac demum extractus erat: subsequens curatio tamen debilitatem quandam et difficultatem motus reliquit; de hypopyo, per incisionem infimae partis corneae, eiusdem indolis, vt in cataracta fieri solet, cura

*) vid. Comm. horum Vol. XVI. p. 71.

curato; de hemeralopia in nonnullis militibus, qui sub dio, facie versus solem directa, obdormiuerant, methodo Cl. FOURNIER *) curata. Eundem morbum Cl. BRIDAULT anno 1762 frequenter in militibus legionis pedestris Carnutensis (*Chartres*) obseruauit, quae sola eiusmodi aegros obtulit, quinque aliis, quae vna in insula Oliaro (*Oleron*) praesidio essent, immunibus: quod inde pendere videtur, quod haec legio stationem in oppido S. Martini insulae Radis (*Rée*) tenebat, multis ibi laboribus fatigata: vesicatoriis sine fructu vsurpatis, Cl. BRIDAULT extractum cicutae bis de die, a grani dosi incipiens, et vsque ad integram drachmam de die ascendens, summo cum vsu adhibuit: eodem etiam remedio polypum narium sanauit, et cataplasmate ex dauco, supra memorato, cancerum faciei sustulit in femina, quae ob inopiam ne diaeteticum quidem regimen seruare, multo minus internis remediis curationem iuuare posset. Cl. ROCHARD de hemeralopia, communi in Caloneso (*Belle-isle*) morbo, a suppressa transpiratione orto, et Cl. FOURNIER methodo tractando; de tumore tunicato sub axilla dextra, qui incisus, pure euacuato; folliculoque ipso subsequente curatus est. Postremo Cl. BOURIENNE de effectibus puncturae araneae cuiusdam, in Corsica habitantis, quae ab incolis *Marmignato* dicitur, magnitudine et figura tarantulae similis, maculis octo flauescens in dorso notata: quindecim milites ab ea puncti subito dolorem immensum per totum corpus sentiebant, qui adeo incessum perhibebat, quem stupor insignis potissimum in articulationibus subsequebatur, cum idea, se a canibus rabidis deuorari; locus puncturae in aliis prorsus non patebat, in aliis

*) vid. Comm. horum Vol. VII. p. 216.

leui rubore se prodebat, facies inflammata, oculi ardentes, calor ingens per totum corpus, cutis ardens, sed ad sudores propensa; pulsus tamen fere naturalis. Scarificationes profundae ad locum laesum, oleum tepidum hyperici illitum, et sudor, curiosius obiecto in lecto corpore prouocatus, morbum intra tres vel quatuor dies tollebant; si vero locus non patebat, neque ergo scarificatio administrari poterat, idem diutius trahebatur. Versus finem extremitates inferiores petebat, et tunc pediluua curationem accelerabant. Effectus puncturae pro diuersitate tempestatum et partium laesarum variant. Indigenae venenum ab animali proiectum accusant; sed vna causa in irritatione neruorum et aponeuroseon, ab aculeo facta, ponenda videtur. Saepe adeo remediis nimium calidis nocent: de reliquo calido fornaci aegros imponunt, et sudorem hoc modo, saepe salutarem, eliciunt.

p. 580. Progredimur ad caput duodecimum, in quo obseruationes anatomicae continentur. Varia exempla tristium effectuum, quos abusus potus spirituosus edit, nimirum lien ingentis magnitudinis, herniam vmbilicalem producens, cum ventriculo, duodeno, hepate, ligamento eius suspensorio, reliquisque proxime intestinis et peritoneo coalitus; scirrhus, superius gangraenosus, inferius in pus conuersus, vt alias mutationes morbosas taceamus: in alio subiecto idem viscus, sine praegressis signis inflammationis, gangraena in foetidissimam putrilaginem resolutum, subitae mortis causa: in alio omentum adeo extensum, vt facile vsque ad mediam femoris vtriusque partem pertingeret, latitudinis ad minimum 22 pollicum, pinguedine crassa refertum et vasis sanguiferis, multum dilatatis, intestina tenuia gangraenosa, crassa contracta, membrana

brana externa in sacculos peculiares, pingues et crassos diuisa; mesenterium crassum, partim scirrhosum, partim abscessu consumtum; pancreas et lobus minor hepatis scirrhosa; lien octo libras ponderans, coloris rubri, substantia hepatis similis, membranis consistentiae cartilagineae, cellulis nulla ratione detegendis; ventriculus maxime contractus, liquorem bile tinctum continens: in alio vesica urinaria totam fere regionem hygogastricam occupans, vasis varicosis conspicua, callosa, membrana interiore gangraenosa, intus haerente liquore sanguinolento plus, quam trium librarum: in alio pulmones sphacelati, concretionibus lapideis repleti, hepar inflammatum, lien et mesenterium scirrhosa, intestina gangraenosa: in alio concretiones polyposae in vasis menyngum cerebri, ventriculo dextro cordis cet. in alio gangraena cardiae, ventriculi, intestinorum tenuium: in alio pulmo, pleura, mediastinum, pericardium, diaphragmatis pars carnosa suppuratione tacta: in alio primae viae adeo contractae, vt per vltimos vitae dies nulla alimenta assumere posset aeger: in alio, qui ex ebrietate lethargicus obierat, sinus longitudinalis sanguine fartus, aqua in basi cranii effusa, cor ingentis voluminis, in auricula sinistra polyposa concretio, pulmones gangraenosi, ventriculus et intestina tenuia inflata, gangraena et sphacelo tacta, vesicula fellea solito maior, bile repleta, lien pustulis albis obsitus. Miles 25 circiter annorum, a iuuentute asthma vehementissimo laborans, peripneumonia corripiebatur, et reciduum eiusdem passus obibat, quam asthmae grauitatem non, nisi capite in pectus inclinato genibusque ad mentum fere eleuatis, mitigare quodammodo potuisset: causam asthmae sectio patefecit, nempe hepar insolitae magnitudinis, per totam regionem

epigastricam extensum et cum liene, itidem maiore naturali, coniunctum, utroque viscere arctissime cum diaphragmate coalito. In alio hepar scirrhum et suppuratione penitus, consumtum diaphragma, usque ad tertiam et quartam costam veram sursum egerat, sic, ut pulmones, prorsus siccati, vix distingui possent. Pericardium ictu gladii penitus, corde tamen illaeso, perfossum, fero sanguinolento extrauaso mirum in modum dilatatum, ut pulmones versus posteriorem partem thoracis reprimeret, post 45 dies mortem induxit, basi cordis fere prorsus suppuratione destructa, quae etiam aortam et pulmonalem arteriam laeserat. Hydrops pericardii in milite, phthisi extincto, a Cl. D E H O R N E obseruatus, qui obscurissimi huius morbi signum pathognomonicum in eo ponit, si cum frequenti palpitatione cordis, suffocatione habituali, debilitate et virium decremento pulsus parvus et durus coniungitur, et praecipue si aeger in alterutro latere decumbere nequit: paracentesis vnum forte remedium; semper tamen anceps censeferi debet. Idem vir Cl. anno 1755 Verduni peripneumoniam, inter milites grassantem, obseruauit, qualem anno superiori Cl. B A G A R D Nanceii itidem inter milites tractauerat, frequenter cum inflammatione cordis coniunctam, quod, sectione facta, pericardium, purulenta materia repletum ostendebat; cum fructu autem utebatur in principio morbi crebris venae sectionibus, postea largo potu decoctionis borraginis, adiuncto pauco nitro, et per interualla refracta dosi kermes mineralis; postmodum vesicatorio in furis, et prioribus medicamentis, addito oxymelite scillitico: raro morbus expectoratione, sed plerumque lyfi solutus est. In alio milite, qui post morbum inflammatorium plerorumque viscerum abdominalium 26 dierum

dierum mortuus erat, praecipuum momentum attentione dignum in quadam dispositione ad risum sardonium consistit, ex qua Cl. DE HORNE inflammationem diaphragmatis suspicabatur, quod etiam sectio cadaueris demonstraui. Alius doloribus vagis in pectore, cum asthma suffocante et vehementissima respirandi difficultate coniunctis, corripiebatur: post aliquot dies tumor intra septimam et octauam costam dextri lateris apparebat, ex quo inciso pus bonum effluebat; nihilominus tamen cum signis empyematis viribus exhaustus, nullo umquam febris indicio persentiscendo, periit. Mediastinum inueniebatur scirrhum, pleura in latere dextro cartilaginea, duplicaturam et saccum, liquore purulento plenum, formans, qui pulmones sursum presserat, suppuratione destructos, et sub costa septima cariota, sinus ex abscessu olim aperto formatus, qui usque ad vertebrae et diaphragma progrediebatur; pericardium itidem cartilagineum, cordi intime accretum; auriculae cordis fere scirrhosae; pulmo sinister flaccidus, innatans liquori extrauaso. In alio, phthisi extincto, conspiciebatur hepar, in quatuor lobos diuisum, ingentis voluminis; lien parvus, in duas partes separatus; vesicula fellea vacua, per ligamentum, quod colon et hepar coniungebat, in duas partes diuisa; prolongatio seu appendix intestini ilei, trium pollicum longitudine: ex quo Cl. DE HORNE occasionem nanciscitur de improvido usu globulorum plumbeorum, vel mercurii in affectibus colicis dehortandi. In hominis febre continua laborantis, cui postremo diarrhoea biliosa colliquatiua superuenierat, cadauere, bilis coloris pulueris nicotianae Hispanicae, hepar mole auctum eiusdem coloris, abscessus in substantia lienis, epiploon et pancreas prorsus fere destructa, pericardium sero flauescente

repletum, cor pallidum et liuidum, inuenta sunt. In femina intestinum rectum incarceratum tympanitem letalem induxit. Stupendus effectus ingratorum animi affectuum in aegro, palpitationibus cordis subiecto: pericardium mirum in modum extensum, aqua sanguinolenta plenum; cor figurae prorsus rotundae; ventriculus vterque ad minimum libra dimidia sanguinis crassi, nigri, praetereaque multis grumis sanguinis plenus. Excrementa lapideae duritiei, calculorum biliariorum ad instar flammam alentia, quae intestinum ileum penitus obdurauerant, in iuvene morbum eiusdem nominis letalem producebant. Post febrem intermittentem, quae ultra 18 menses neglecta fuerat, lien scirrhusus tandem marasum lethalem induxit: visceris huius pondus septem, vel octo librarum inuentum est, ipsumque figurae informis, duabus eminentiis itidem scirrhisosis terminatae, quae figuram pedis bouini referebant. Tandem effectus letiferi plagarum, quae militi in caput et pectus inflictæ fuerant: praeter fracturas et contusiones, exterius in capite conspicuas, apophyses basilares diffractæ et os sphenoidæum et occipitale, a se invicem separata erant, sinus longitudinalis vacuus, laterales contra et omnia vasa encephali sanguine nigro spisso repleta; pulmones inflammati, suppurati; cor inflammatum, ventriculo anteriore grumis sanguinis refertum; hepar magnum, bilis nigricantis ingens copia, intestina tenuia inflammata; vasa ventriculi infarcta; lien putredine resolutus; renes inflammati, pure repleti. Mirandum tamen, aegrum his læsionibus, licet lethargo oppressum, tamen ad septimum vsque diem superuiuere potuisse.

Longiores fuimus in recensendis iis, quae caput hoc complectitur, quum quisque vtilitatem facile perspiciat, quae ex anatome practica in ipsorum morborum cognitionem illustrandam redundet. Breuiiores nunc erimus in enarrando capite decimo p. 633. tertio, quod historiam et analyfin aquarum medicatarum Luxoniensium sistit, curiosissime conscriptam et experimentis solertissimis superstructam, cum ea omnia, quae hic traduntur, in compendio exhibere a breuitate nostra quam maxime alienum sit: quare in potioribus solummodo momentis adducendis acquiescendum nobis est. Cl. SENACIAM in commissis dederat viris Cll. VENEL et BAYEN, supremo in exercitu regio pharmacopoeo, vt omnes aquas medicatas, quae non exigua in copia per totum Galliae regnum reperiuntur, examinarent; neque hunc laborem fructu cariturum esse, examen aquarum Selteranarum, a Cl. VENEL olim susceptum *), sperare iubebat: dolendumque omnino est, hoc opus, in medio cursu interruptum, ad finem nondum deduci potuisse. Interea, quum anno 1766 Cl. RICHARD iubere-
tur nosocomia militaria in tota meridionali Galliae parte lustrare, iniuncta simul ei fuit disquisitio et examinatio nostrarum aquarum, ad quod opus laboris socium sibi expetiit Cl. BAYEN, et sic coniuncto studio id effecerunt, cuius iam publice rationem reddunt.

Aquae hae, veteribus iam sub nomine *Tarbel-
lianarum* notae (siquidem plura etiam tum monu-
menta Romanorum prostant, quorum nonnulla
hic describuntur), scaturiunt in valle, quae versus
meridiem, ad quartam horae partem a Bagne- p. 567.
neriis, in pago conuenarum (*le pays de Cominges*)

V 5

in

*) vid. Comment. horum. Vol. VI. p. 503.

in regione montosa, haud procul a Pyrenaeis montibus sita est; vnde etiam vernaculum nomen (*Eaux de Bagnères-de-Luchon*) traxerunt. Varii adsunt fontes, qui eas suppeditant: nempe principalis, ex fundo caernae profiliens, quae exstructa est in domo, ad recipiendos pauperes aedificata, isque *source de la Grotte* vocatus; thermometer Reaumurianum in eo ad 52 gradus ascendit; in eadem domo balnea instructa sunt, vbi, ob nimium calorem, aqua, admistis aquis ceterorum fontium, temperatur, (quod tamen Nostri reprobant, fatius ducentes, aquam refrigerio expositam, ad iustum caloris gradum reducere): porro fons reginae, (*source de la Reine*,) haud procul a priore, sub dio, inter strata silicis simplicis micacei erumpens, caloris 39 graduum, itidem canalibus ligneis in balnea, prius nominata, ductus: ad huius latera ex strato lapidis scissilis fons tertius, sub egressu suo in duas partes se diuidens, quorum altera, caloris a 24 vsque ad 27 gradus, ob colorem fons albus, (*source blanche*,) altera caloris, 17 ad 21 graduum, fons frigidus, (*source froide*,) dicitur: et praeterea exiguus quidam, quem accolae ob frequentem in morbis oculorum usum (*source aux yeux*,) nominant. In altero domus latere fons quidam conspicuus est, qui a primo eius possessore (*source de la salle*) dicitur, sed ad ipsum ex terra exortum obseruari nequit: in peluim collectus calorem 35 graduum, nonnunquam etiam minorem, seruat. Haud procul ab hac scaturigine Nostri aliam, olim iam detectam, intra lapides siliceos, et quarzofos rursus effodiendam curauerunt, quae immediate cum ea communicabat, et calorem 41 graduum, monstrabat: in hoc labore, antequam ad aquam ipsam peruenirent, lapides omnes humidos, exterius efflorescentiis vitriolico aluminosis conspersos, et profun-

profundius ligna, aqua hac impraegnata, deprehenderunt. Hae diuersae scaturigines omnes, sed diverso gradu, odorem et saporem, hepatis sulphuris similem, spargebant. Lapides isti ex fragmentis, a montibus prope fitis auulsis, exorti sunt, et plerumque ex schisto griseo, intermixtis frustis marmoris eiusdem coloris, et silicibus simplicibus micaceis constant; hi lapides comminuti etiam partem terrae constituunt: adfunt praeterea grana quaedam quarzi, et lapis arenosus et ferruginosus, mica confusus.

Succedit analysi chemica aquarum, quae docet, iis inesse hepar sulphuris ex natro seu alkali minerali et sulphure compositum, salem mirabilem GLAUBERI, salem marinum, parcam portionem materiae pinguis, bituminis fossilis nomine insigniendae, et terrae vitrescibilis; varia tamen horum ingredientium, pro varietate scaturiginum inter se proportione.

Eodem porro modo efflorescentiae salinae, p. 603 prope scaturigines reperiundae, terrae et lapides, vicinae examinantur. Schistus supra memoratus duplicis indolis est, alter mica, alba et flaua repletus, alter eadem destitutus: terra, in interstitiis horum lapidum haerens, itidem schistosa est, multam micam continens; quae ex interiori et ex locis a fontibus humectatis educitur, caerulefcit, et siccata griseum colorem acquirit, odoremque, ac saporem hepatis sulphuris, quem humida obtinet, perdit. Postquam autem aeri libero exposita fuit, gustum vitriolicum acquirit, et chemicis auxiliis tractata vitrioli et aluminis praesentiam prodit, adeoque ipsae efflorescentiae eadem principia cum selenite, sed in dispari proportione monstrant; manifesto indicio, has partes, non in aquis ipsis praesentes, sed extra eas productas esse.

esse. Easdem mutationes in lapidibus obseruarunt Nostri, sicut etiam in incrustationibus quibusdam, quae muros balneorum obtegebant; in quibus tamen, praeter vitriolum, alumen et selenitem, etiam salem, Sedlizeni simillimum detexerunt. Haec omnia obiter tantum indicasse sufficiat; tamen nonnulla excerpamus momenta, non adeo presse ad harum tantum aquarum examen pertinentia; sed vniuersam hanc scientiae naturalis partem illustrantia.

P. 699. Quum post disquisitionem quandam aquarum massa salina, bitumine tamen adhuc admisto, relinqueretur; haec in aere libero humiditatem attrahebat: quod postmodum, calcinatione instituta, non amplius euenit, et elapso satis magno temporis spatio sal mirabilis, sal marinus et alkali minerale inde producta sunt: ex quo concludunt Nostri, deliquescentiam nulli alii causae, quam coniunctioni partis bituminosae cum alkali minerali, adscribendam esse.

P. 728. Mercurius in acido nitri solutus et per alkali fixum praecipitatus, si probe abluatur, et ad pondus vnciae vnus (mensurae gallicae), cum gr. XII florum sulphuris triturando commiscetur; in vase clauso super igne, cum maxima vi mouetur; vasque cum vehementi fragore disrumpit; in cochleari ferreo igni expositus, post praegressum paucum fumum fulminat, et puluerem coloris, ex purpureo nigricantis relinquit, qui aqua destillata probe elutus, (et haec salinum principium suscipit, ab alkali fixo in forma pulueris, nigri praecipitandum), et siccatus, in parua retorta, in pulcherrimam cinnabarin sublimatur: similia phaenomena praecipitatum, ex dissolutione mercurii corrosiui, ope alkali fixi paratum, praebet.

Duae drachmae turpethi mineralis, non abluti, p. 729.
cum granis XXIII carbonum, per triturationem
coniunctae, retortae vitreae inditae et igni nudo ex-
positae, dabant guttas aliquot phlegmatis, odorem
penetrantem acidi sulphurei, drachmam vnam et gr.
vj. mercurii resuscitati, in recipientem transeuntis,
flores sulphuris in collo retortae, materiam nigram
puluerulentam, quae cinnabarim nimio sulphure
alienatum, vel aethiopem mineralem referebat, et
partem verae et elegantis cinnabaris; capite mor-
tuo 20 granorum, in fundo retortae relicto.

Notamus adhuc, Nostros in Occitania infe- p. 769.
riore, natrum seu alkali minerale ad ripam fluvii
cuiusdam satis copiose inuenisse.

Sub finem ex proprietatibus harum aquarum
ipsarum virtutes resoluentes, roborantes, abster-
gentes et vulnerariae colliguntur, et morbi, in qui-
bus internus aequae, ac externus earum usus salu-
taris esse possit, recensentur.

Appendicis loco (sub peculiari paginarum nu-
mero) remedium quoddam, quod diu omnium
attentionem in se traxit, publici iuris redditur:
drageae KEYSERII. Hic nempe statutam pecu-
niae summam a rege accipiens formulam huius ar-
cani in duobus exemplaribus sigillo munitis exscri-
ptam exhibuit, quae Cll. viris SENAC et RI-
CHARD tradebantur, non, nisi post mortem aucto-
ris, aperienda: quae cum euenisset, Cl. SENAC iam
mortuo, Cl. RICHARD schedam sibi commissam
iussu illustris Marchionis DE MONTEYNARD,
cui suprema rerum militarium, cura credita est, ape-
ruit et modum, in ea descriptum, orbi erudito com-
municat. Per longinquam operationem, (quam
quidem mutari multum et contrahi posse Cl. RI-
CHARD persuasum habet; nullum certe, harum
rerum gnarum, sibi contradicendum inuenturus),
mercu-

mercurius viuus iterata lotionē in aethiopem vertendus, postea addita calce viua destillandus, et in mercurium reducendus, dein calcinatione in calcem rubram vertendus, et sic mutatus in aceto destillato soluendus est: haec solutio postmodum, cum manna vel gummi arabico commiscenda, et multiplici praeparatione pasta illa in drageas, seu pilulas formanda, Idem ille KEYSERVS varia momenta subiungit, quae ad illustrationem praeparationis remedii spectant, docetque, qua ratione varia alia inde elici remedia possint; pollicitus simul, se omnia, quae in horum remediorum usu obseruanda sint, prolixè indicaturum; quod tamen, quantum nos quidem scimus, morte superueniente oppressus, praestare non potuit.

XI.

Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen te Haarlem XIII. Deel Pars I. Te Haarlem by I. Bosch 1771. Pars II. 1772. 8. Alph. 2. pll. 15. tab. aen. 1.

h. e.

Commentarii Societatis scientiarum Harlemensis. Vol. XIII. Pars I. II.

Societatem hanc, quo maior inde ex lectione horum commentariorum in lectores redundaret utilitas, constituisse, indicem supra volumina prima duodecim generalem conficere, in quo quilibet commentarius, sub quolibet doctrinae capite positus, in oculos quaerentium confestim incurreret, pateretque, in quonam volumine iste contineretur, legi-

legimus. Iam in eo conficiendo elaboratur, et simulac confectus fuerit, cura et studio huius Societatis tanquam supplementum prodibit.

I. Responsio Cl. BENI. CARRARD V.D.M. p. 1.
ad quaestionem, ab hac Societate propositam:
Quid ad artem obseruandi requiratur, et quatenus ea perfectioni mentis prospiciat? Ex ampla hac et bipartita tractatione, cum ad finem nostrum non ita stare videatur, contenta tantummodo, quae cuilibet capiti praefixa sunt, afferemus.

Prima pars sex capitibus absoluitur, quorum p. 6.
primum agit, de describendis variis obiectis naturae, eorumque virtutibus obseruandis. Ostenditur in altero, quid requiratur ad obseruandam p. 135.
viam, qua natura in ipsis mutationibus, in rerum vniuersitate oboriundis, incedit. Demonstra- p. 252.
tur in tertio capite, qua ratione sensuum fallaciae obueniendum sit, ita, vt omnia, quae ad magnitudines, distantias, figuras formasque corporum faciant, certo possimus definire, motus eorum essentiales ab apparentibus distinguere, curuasque inde, quas describunt, detegere lineas. Agit in p. 321.
capite quarto de delectu instrumentorum, ad artem obseruandi necessariorum, et de iis, ad quae in eorum usu attendi debeat. Definitur animus in p. 367.
quinto, in obseruanda natura necessarius. In sexto denique capite super nomenclatura, methodisque excogitatis producta naturae in ordinem redigendi p. 392.
disputatur.

In altera parte, quantum ars obseruandi ad perfectionem animi conferat, examinatur, eaque quatuor capitibus constat. Commonstrat in primo, p. 416.
quantum ars obseruandi, ad augendas ideas nostras iuuat. Definit in altero, quatenus haec ars com- p. 434.
parationem idearum facili-
tet, quantumque nos
iuuet,

iuuet, vt iustam inde et veram acquiramus cognitionem; vel vt, nisi ad rectam certitudinem pervenire possimus, rerum probabilitates iuste metiamur. Videmus in tertio, quatenus ars observandi rationem humanam, ad res bene componendas, vel separandas adiuuet; vel sensationi pulcrisatisfaciendo, vel, si opus fuerit, nobis auxilium largiendo, producta naturae in usum nostrum convertendi. In quarto tandem ostenditur, quomodo artis observandi rationi nostrae contemplationes offerantur, quae nos emendent, nobisque ideas creatoris magnificas subministrant, quae animum nostrum exacuent, et ad bene beateque vivendum conducant.

p. 557. 2. *Commentarius de parallaxi solis* Auct. I. F. HENNERT.

p. 601. 3. *Observatio albae zonae coeli (witten hemelgordel)* Auct. Cl. IO. SCHIM et a I. F. MARTINET communicata. Aequalem, sed paulo imperfectiorem, huius phaenomeni observationem Cl. MARTINET supra *) communicavit. Hic vero eam, quam Cl. SCHIM de hoc phaenomeno habuit, inserit: ex quarum comparatione id elucet, hanc illa multo distinctiorem esse: id quod Noster partim aedificiis Leidenfibus adscribit, quibus impeditus, non horizontem totum dispicere, nec ita lumen illud profundum boreale, cuius Cl. SCHIM meminit, observare potuit; partim vero vario tempore, quo uterque observationem instituit, attribuit.

p. 605. 4. *Consilium Cl. IACOBI VAN DER HAAR de clavis verrucisque commode exstirpandis.* Clavos a sola

*) vid. *Verhandeling. van deeze maatsch XII. Deel. p. 362 seq. Comm. nostr. Vol. XVIII. p. 592.*

a sola pressione deriuandos esse, nemo facile negabit: id quod Noster ex feminis Batauis probat, quae olim magnis prementibusque aurium ornamentis vsae, eiusmodi concretionibus callofis, in marginibus aurium adficiebantur; vel quibus ob labem pectoris, phthiseos v. c. vel carcinomatis, vni tantum lateri incumbendum est, iisdem excrecentiis ob continuam auris frictionem, laborant *). Hinc omnis clauorum cura in remouenda pressione ponenda est, quam ita suadet, vt rotunda corii crassi et mollis particula, denarii magnitudinem aequans, vel etiam superans, cuius media pars foramine, clauo paulo maiore, instructa est; vel emplastrum diapalmae, linteo ad eandem crassitiem illitum, eiusdem magnitudinis et formae, supra clauum imponantur, ita, vt clauus non, nisi in margine radice prematur; hoc vero operculum emplastro glutinante aliquoties obducto, per nonnullas septimanas firmetur; vel, si opus fuerit, reiteretur. Simplici hac methode caussa sublata, effectum Noster disparuisse vidit. Subsellium, vbi clauus infra, vel lateraliter sedem habuerit, crassum et ex coactili exstructum, pedi in calceo subiicit, vt in foramine, ibi, vbi clauus positus sit, facto, ipse sine pressione requiescat. Exemplis Noster pressionem frictionemque, causam clauorum, illustrat.

p. 609.

Verrucarum praesentissimum et tutissimum remedium in tinctura cantharidum, vel emplastro vesicatorio constare Noster expertus est. Pennula enim, hac tinctura imbuta, verruca, quotidie octies, vel duodecies tangitur; vel emplastro vesicatorio

p. 610.

*) HIPPOCRATES de morbis mulierum L. II. c. 20. edit. CHARTERII Tom. VII. p. 808. BOERHAAVE Aphor. p. 499.

torio per nonnullos dies tegitur. His remediis verrucas, cuiuscunque demum sint generis, iuste extirpari posse, Cl. Auctor defendit: quid? quod ipsae verrucae venereae, nullis, nec ipsi mercurio cessantes, ita plerumque euanuerunt. In atheromate eadem et callositatibus fistularum admodum se commendare Nostro constitit; monet tamen, inveteratas cutis excrescentias his non irritandas et maligniores reddendas esse.

Insunt in altera parte:

P. I. I. *Responsio S. R. IAN. SENEBIER ad priorem quaestionem.*

P. 171. 2. *Eiusdem quaestionis tertia responsio Auct. Cl. W. DE VOS.*

P. 261. 3. *Relatio Cl. G. BRUGMANS de deglutione difficili et vomitu pituitoso.* Continuat Noster eius modi morbos*) attente obseruare. Vidua quadraginta trium annorum, temperamenti melancholici passionibus crebrioribus hystericis vexata, impedimentum quoddam deglutionis liberioris in medico circiter oesophagi, aliquot ante mortem annos sensit, quem sensum abhinc continuo, ad praecordia eo magis, siquidem ea premerentur, percepit. Symptoma consuetum vomitus continui materiae aquosae, non aderat, nec viscidum solutum, nisi in maiori morbi incremento, per os eiiciebatur. Pituita haec nunc crassior tenaciorque magna cum vi sine praegressis alimentis ingestis et cum insigni siti, nunc vero statim cum ingestis cibis euacuebatur, ita, ut etiam exinde summae asthmatica redderetur, nec fere quidquam ingerere posset. Vsu interim feri lactis acidi valde iuuabatur.

*) Verhandel. van deeze maatsch. XII. Deel p. 13. in obseruatt. vid. Comm. nostr. Vol. XVIII. p. 597.

tur, eiectioneque muci imminuta, deglutitio liberior paulo facta est; nec tamen, symptomatis paulo leuioribus, morbus sublatus erat, quin potius non diu post mucus, per tempus in ventriculo collectus, simul cum ingestis cibis euomebatur, aegramque, non remittens, tabidam reddebat: quae denique, nullis iam auxiliis adiuta, paullo post expirauit. Cadauere aperto, ventriculum iusto multo minorem in latere eius sinistro superiori interne et externe, multos paruos tumores carnosos in se continuisse, quos dissectos paullo exulceratos, nonnullasque horas in aquam immisos, in colorem aurantium mutatos esse repertum est. Inuenerunt porro oesophagum, tres digitos supra cardiam valde induratum, copiosisque tumoribus similibus duris oblitum, qui nec vllam exulcerationem, neque coloris immutationem ostenderunt. Praeterea et in superficie externa oesophagi tumor paullo maior, cui columbini ad instar, ex fibris multis carnosis filamentisque exstructus, detectus est. Reliqua naturalia erant.

p. 263.

4. *Experimenta super noua agricultura* a Cl. I. F. p. 265.

MARTINET, communicata. Primum experimentum *Schalchly* quidam, secundum regulas nouae agriculturae, S. V. KEVCHEENII anno 1767, cum tritico in horto suo sic instituit, vt agrum in decem partes, octodecim pedes longas et duos latas, vnumque a se inuicem distantes distribueret, iisque iuste adaptatis, grana boni tritici albi Seelandici, sex pollices a se distantia, in qualibet parte terrae mandaret: his bene vegetatis maturisque redditis, quodlibet granum 36-38 spicas foecundas protulit, calculoque inde ex vno grano, 37 spicas ferente, ducto, 2153 vegeta grana et foecunda, 3 vncias ponderantia, habuit: ex quibus omnibus ergo simul collectis, constitit, ex semicyathis granorum supra

X 2

duos

duos modiolos (*vaten*) tritici boni productos fuisse. Casu granum vnũ fecalis tritico immixtum 63 spicas, quae 3224 grana bona, et fertilia conferrent, protulit. Anno subsequente alterum institui-

p. 271. experimentum, cum eodem tritico Seelandico in agro, 192 pedes rheinland. longo et 62 lato, iuste ad hunc finem adaptato et in 25 partes distributo, ita, vt mense septembri in qualibet parte tres series, vbi grana, semidigitum a se distantia, infereret, constitueret. Parte vigesima, cum cura iusta paullo negligeretur, loliumque, copiosius ibi excrecens, non ita statim eradicaretur, emortua, reliquarum 19 partium haec fuit productio: septem supra 35, septem 25-35, et quinque infra 25 spicas protulerunt: tres aristarum fasciculos porro, singulos ex vno grano progerminatos, computauit, quorum primus 38 spicas, quae 1337 grana comprehendere rent, alterus 39, cum 1560 granis, et tertius 52 et 1898 granis ostendit: computoque generali factoco ex vno 339 grana habuit.

p. 277. Tertium experimentum 1769, eadem methodo et maiori quidem cura in eo ipso agro institutum, non ita felicem habuit successum: hyeme enim satis pluuiosa ager inundatus glacieque obductus est, ita, vt etiam parte vigesima deperdita, 19 saluace quidem manerent, haud ita vero gratae. Secaliss granum casu huc immissum, 73 spicas cum 4337 granis produxit.

Sequuntur obseruationes meteorologicae Zwanenburgenſes anni 1770.

The natural history of the human teeth:
explaining their structure, use, formation,
growth and diseases. Illustrated with cop-
per plates by JOHN HUNTER F.R.S. and
Surgeon to St. George's Hospital. London,
printed for I. Johnson 1771. 4. mai. pl. 21.
tab. aen. 16.

h. e.

Historia naturalis dentium humanorum, in qua
structura, usus, formatio, incrementum
et morbi eorum explicantur, ac tabulis
aeneis illustrantur. Auctore IOHANNE
HUNTERO.

Egregium hoc, quod nunc indicamus, opus stu-
dio IOHANNIS HUNTERI, fratris GVI-
LIELMI HUNTERI celeberrimi illius Londi-
nensium dissectoris et medici conscriptum est, quem
hic Noster in examinanda corporis humani structura
non modo adiuuat, sed et doctrinam fratris artem-
que mirifice aemulatur. Quod quidem, nisi iam
ex aliis speciminibus pateret, hac dentium huma-
norum historia satis comprobaretur, quippe quae
inter praestantissima scripta anatomica, quibus
nostrum aeuum gloriari potest, omnino referri
meretur. Omnes autem, quae in ea continentur
observationes, uti Cl. Auctor in praefatione ipse
monet, ante annum huius seculi quinquagesimum
quintum factae et in Cel. G VILIELMI HUNTE-
RI lectionibus publice demonstratae sunt. Ta-
bulas vero aeneas praestantissimas, quibus hoc opus

ornatum est, Cl. RYMSDYCK delineauit; aeri autem eas inciderunt Cl. GRIGNON, STRANGE, RYLAND, alique celeberrimi, quos iam Anglia alit, in hac arte viri.

In tractando vero argumento suo, hoc est, in exponenda dentium humanorum historia Cl. Auctor ita versatur, vt primo describat maxillam superiorem et inferiorem, vna cum processu alueolari, seu margine alueolari vtriusque maxillae et articulatione maxillae inferioris motuque huius articuli. Exponit deinde de musculis maxillae inferioris, massetere scilicet, temporali, pterygoideo interno ac externo et digastrico, nec non de actione horum muscutorum: atque porro structuram dentium in vniuersum, tum in specie corticem partemque osseam eorum, cavitatem in omnibus dentibus obuiam, ac periossteum, quo ex parte obducuntur, verbis, figurisque describit. Tunc de situ et numero dentium in genere et speciatim de singulis dentium classibus, incisioribus scilicet, cuspidatis, quo nomine caninos insignit, duobus prioribus molaribus, quos *bicuspidēs* vocat, et tandem de reliquis molaribus agit. Deinceps ad articulationem dentium, gingiuarum descriptionem, actionem dentium, quae a motu maxillae inferioris pendet, progreditur, et comparisonem motus maxillae in iunioribus et in adultis instituit. Porro disputat de formatione processus alueolaris et dentium in fetu, de causa doloris in dentitione, de formatione et incremento dentium aduultorum, seu eorum, qui in altera dentitione prodeunt, atque de ratione, qua in vniuersum dens formatur, de ossificatione dentium circa pulpam, qua interius replentur, de modo quo cortex nascitur, de dentitione secunda, de incremento maxillae vtriusque et causa

caussa, quae dentitionem alteram necessariam reddit, de ratione, qua cavitas alveolaris sensim repletur, de continuo dentium incremento eorundemque sensibilitate. Tandem differit de dentibus supernumerariis, ac de usu dentium in loquela. Disquirat etiam, ad quam classem dentes humani pertineant, vtrum scilicet cum dentibus carnivororum, an animalium herbis viuentium conueniant, ac de morbis dentium; sicuti etiam varias obseruationes circa rationem eos mundificandi, et ex vno alueolo in alium transplantandi addit.

Cum vero obseruationum, quae in hoc libro continentur, nouarum praecipuaque attentione dignarum, insignis sit numerus, nec spatii angustia permittat, vt de singulis fusius exponamus, speciminis loco quaedam tantum hic adduxisse sufficiat.

Processus alueolares magis ad dentes, quam ad P. 7. maxillas pertinent et dentium quasi partes esse videntur. Vna enim cum dentibus formantur, crescunt et pereunt; nam destructionem dentium processuum destructio semper sequitur. Caluam P. 8. pueri Cl. Auctor vidit, in qua, cum dentes duo incisores superioris maxillae nondum gingiuas penetrauerant et radicibus destituti gingiuis adhaerebant, processus quoque alveolaris et alueoli deficiebant, dentibus non in maxilla, sed in gingiuarum carne formatis. Articulationi maxillae in- p. 10. ferioris eiusque motui, tum cavitas ossis temporum, tum eminentia, ante hanc cauitatem obuia, inseruiunt. In homine viuo eminentia haec talis est, vt condylus ex hac cauitate, supra hanc eminentiam, non descendat, sed recta antrosum moueatur. Cartilago meniscoidea magis
X 4 ad

ad condylum, quam ad cauitatem articulare per-
tinet. Comitatur enim condylum in motu suo,
ita tamen, vt non vbique eum, sed eo vsque tan-
tum sequatur, vt inaequalitatibus variis ossis tem-
porum in vario et libero maxillae motu se accom-
modet. Partes illas quoque a frictione defendit:
quare in carniuoris etiam animalibus reperitur, in
quibus nec eminentia, nec cauitas; sed simplex

p. 20. tantum ginglymus adest. Masseter ad iugum,
cum temporali musculo confunditur et quasi eius
continuatio est, ita vt hi muscoli tanquam
vnus musculus considerari possint. Digastrici
maxillam deprimunt. Quod si vero vnus

p. 27. ex iis fortius agat, maxillae rotationem efficiunt,
et antagonistae quasi pterygoideorum externorum
fiunt. Laryngem istos digastricos leuare negat No-
ster, illosque potius pro praecipuis instrumentis de-
pressionis maxillae inferioris habet: quod etiam
tactu facile cognosci possit, si digitus ante margi-
nem mastoidei retro maxillam inferiorem ponatur,
sub cuius depressione manifeste venter digastrici
posterior intumescit. Sterno-hyoideos et sterno-
thyroideos, vna cum mylo; et genio-hyoideis
maxillae depressioni inferuire Cl. Auctor non
concedit, cum os hyoideum in depressione ma-
xillae non descendat, nec illud ipsum os antror-
sum moueatur. Tactus quoque docet, omnes hos

p. 31. musculos, si maxilla aperiatur, flaccidos esse. Si
maxilla fixa est, caput retrahitur, et os aperiatur,
non actione musculorum, vt multi putant, qui
caput extendunt etc. sed actione digastrici, quod
pluribus Cl. Auctor demonstrat. Fibrosam cortex
fabricam ostendit, fibris a peripheria ad centrum
ductis, quo artificio et dentis ossea substantia et
cortex, eam inuestiens, in manducatione firman-
t. Cortex terra constat, quae per animalem quandam
substan-

substantiam cohaeret. Admota vi ignis, non in calcem abit, nisi acido antea solutus fuerit. In igne album colorem diutius, quam ossea dentis pars retinet, vasculis vero plane destituitur. Ossea p. 36. autem dentium pars, quae proprie eos constituit, ex terra calcarea et animali substantia componitur. Quamquam dentium radices nonnunquam intumescunt, ut alia ossa in spina ventosa intumescere solent, ac cum alveolis anchylosi cohaerent; vix tamen his argumentis organica, seu vasculosa dentium fabrica demonstrari potest. Radicum enim tumor a prima forte formatione originem ducit, ac anchylosis dentis cum alveolo pulpae morbus est, qua radix cum alveolo vnitur. Nunquam, vel omnibus artificiis adhibitis, injecta vasis materia ceracea, ad ipsam dentium substantiam penetrat. In animalibus iunioribus, in quibus ossa ex pastu rubiae tinctorum, rubrum colorem acquirunt, partes iam formatae in dentibus non rubent; sed eae tantum, quae postea formantur. Neque hae dentium particulae, si usus rubiae omittatur, ut alia ossa iterum albescunt, quod indicio est, differre dentes, a reliquis ossibus, quae quotidie, uti reliqua c.h. solida, decrementum et incrementum capiunt. Cum etiam sola abrasione decre-
 scant, nec in laesa ossium nutritione seu osteo-
 sarcosi emolliantur, eos ratione circulationis hu-
 morum tanquam extraneas partes, nec ad corpus humanum proprie pertinentes, considerare possu-
 mus. Confirmat hoc observatio, quae docet, mor-
 bos, corpus humanum in vniuersum infestantes,
 raro dentes laedere. Vix tamen Cl. Auctori con-
 cedere possumus, in rhachitide dentes nunquam
 morbose affici, cum dentes in pueris rhachiticis et
 tardius prodeant, et celerius iterum pereant. Ca- p. 47.
 vitas, quae in omnibus dentibus reperitur, figura

- sua dentis figuram exacte refert. Medulla non repletur, sed pulpā, quae ex vasculis sanguiferis et nervis, tela cellulosa inter se iunctis, constat. Nervorum tamen ad ipsos dentes progressum Cl. Auctor nunquam oculis conspiciere se potuisse confirmat. Bicuspidēs posteriores Nostri, seu molares secundi, saepius, quam alii, dentibus sic dictis sapientiae exceptis, deficiunt. In pluribus quoque animalibus, inter dentes incisores et molares, vacuum aliquod spatium reperitur. Molares posteriores, quos Ill. HALLERVS *grandiores* vocat, in inferiore maxilla duas, in superiore tres radices habent. Afferunt quidem nonnulli dissectores, se plures radices vidisse; sed causa erroris huius in eo posita est, quod ex aucto numero cavitatum in radicibus diffractis collegerint, plures radices in
- p. 63. initio adfuisse, ac inter se coaluisse. Situs radicum in superiore maxilla ita ordinatus est, ut eae divergentes antrum HIGHMORI quasi comprehendant, eique cedant. In alveolis suis motum aliquem experiuntur dentes; hinc in calvis in quibus periosteum maceratione destructum est, molaribus exceptis, sponte alveolis excidunt. Motus vero ille efficit, ut duriorum corporum vi atque impulsui cedant, nec facile frangantur. In masticatione vulgari maxilla superior non movetur, sed immobilis manet. Omittimus, quae Cl. Auctor de actione dentium, a motu maxillae pendente, et de motu maxillae in pueris sepiusque diversitate egregie disputat. Molares priores, seu bicuspidēs Auctoris Cl. in pueris, qui nondum alteram dentitionem experti sunt, veri molares sunt, atque cum iis figura prorsus conveniunt. Dolor in dentitione, non ab actione mechanica et pressione dentis in gingivas oriri solet; sed ab irritatione gingivarum maior affluxus humanorum et inflammatio producantur, quam decrementum et attenuatio gingi-

gingiuarum sequuntur, quibus destructis, dens demum prodit. Simile quid nonnunquam in aliis locis observatur, si corpora peregrina, ut globuli plumbei, partes ossis exfoliatione separatae cet. sub cute delitescant, quae etiam haud raro, destructis integumentis, nullo abscessu nato, sponte quasi prodeant. Hinc patet in dentitione difficili gingiuarum dissectionem omnino magni usus esse posse.

Dentitio altera non a primo solum incisore, ut p. 82. prima, incipit, sed etiam a primo molari. Dentes vero, inter primum incisorem et molarem positi, celerius prodeunt, quam ii, qui post molarem primum siti sunt. Tertia vice duos incisores in fene

septuagenario prodire vidit Noster. Cum vero eiusmodi dentes rarius in integra serie prodeant, saepius extrahendi sunt, ne in masticatione gingivas laedant. Primo corpus dentis, deinde radices et cortex nascuntur. Omnes dentes supra pulpam aut ex pulpa ipsa formantur. Haec vasculosa est et maxillae adhaeret in inferiore parte illius cavitatis, quae alveoli initium est, et eo in loco, ubi vasa intrant. Comprehenduntur membrana, quae cum maxilla et gingivis coniuncta est. Ipsi vero dentes liberi sunt, et cum membrana tantum in radice cohaerent. In fetu sex vel septem mensium haec membrana, satis iam crassa est et quasi gelatinosa. Duabus constat laminis, quarum exterior mollis est, spongiosaque et vasculis destituitur; interna vero densior ac vasculosa deprehenditur. Inter hanc membranam et dentem ipsum, nondum perfectum, semper aliquis liquor, liquido articulari similis, reperitur. In dentitione haec membrana semper perforatur et dente progressu sensim perit. Ossificatio dentis supra pulpam, ex vno, vel pluribus punctis pro varia dentium specie incipit. Vnum punctum in *cuspidatis*, duo vero in iis, quos *bicuspidates* Noster vocat, in incisioribus,

p. 86.

tria

tria et in molaribus, quatuor vel quinque puncta deprehenduntur, quibus sensim auctis, tota tandem pulpa osse obtegitur. Pulpae vero huic nouus dens leuiter tantum adhaeret, ita vt sine vlla vasorum dilaceratione, ab ea separari possit. Postquam vero omnis pulpa osse tecta est, os contrahitur paullulum et magis rotundam acquirit figuram, eamque dentis partem efficit, quam collum vocamus, seu eam cui gingivae postea adhaerent, tandemque radicem protrudere incipit. Dum autem radices formantur, ipsa corpora dentium sursum per alueolos et gingiuas propellunt, quae tum, vt supra diximus, sensim pereunt. Proprie pulpa nullum processum habet, qui ad radicem pertineat; sed, dum cauitas in corpore dentis osse repletur, pulpa quoque in radicem elongatur. Haec magis magisque increfcit et in alueolo adscendit, vsque dum omne corpus dentis prodierit. Quo facto, alueolus in fundo contrahitur, et radicis initium seu collum arctius comprehendit, eique adhaerens vna cum eo eleuatur, ita, vt radix in formatione non, vt vulgo putant, descendat, sed vna cum margine alueolari sursum adscendat. Extremus margo ossificationis tenuissimus est, transparens et flexilis, atque accedit ad fabricam, quam testae cochlearum in incremento suo ostendunt; in vniuersum etiam portio dentis, quae iam ossea facta est, cum pulpa fere eadem ratione cohaeret, vt testae animalium testaceorum, cum carne horum animalium coniunguntur. Omittimus descriptionem rationis, qua molares formantur, vel alii dentes pluribus radicibus instructi, quae magis composita est. Ossea vero dentis pars, si accuratius examinatur, ex lamellis constare deprehenditur, quae sibi concentricae quasi incumbunt. Exteriores tamen breuiores sunt interioribus, quae magis magisque
versus

versus radicem elongantur. Ossea parte perfecta, p. 94.
 cortex formari incipit. Materies, ex qua ille constat e pulpa seu capsula, qua dens tegitur, vt ex glandula secerni videtur, et a superficie osseae partis attracta super eam crySTALLIFATUR. Formatur itaque eadem ratione, vt testae ouorum et calculi vrinarii ac biliarii, ex quo crescendi modo fabrica eius striata situsque striarum radiatus explicari potest. In initio non adeo durus est, sed, dum per gingiuas progreditur, duritiem acquirit. In den- p. 98.
 titione altera nouidentes, non ex alueolis suis priores protrudunt; sed in distinctis et nouis alueolis formantur. Hoc tempore, vti notum est, radices priorum dentium sensim destruuntur; haec vero destructio non a pressione mechanica noui dentis efficitur, cum ea aliquando in iis dentibus accidat, quos noui non sequuntur. Quae Auctor Clarissimus habet de mutatione figurae maxillarum in di-
 versa aetate et causa, quae dentitionem necessariam reddit, ob spatii angustiam omittimus. Al p. 108.
 ueolus dentis, dum ille sensim destruitur, non contrahitur, sed noua quadam materia cavitates eius in fundo sensim repletur, quae obscuriorem colorem habet. Non continuo dentes vltra definitos limi- p. 110.
 tes crescunt, sed causa cur opposito dente destructo alter elongetur, magis in incremento processus alueolaris posita est. Figura et situs den- p. 119.
 tium humanorum ostendunt, hominem naturam tum carniuori, tum herbiuori animalis habere. Cum instrumenta, quae hucusque ad extractio- p. 122.
 nem dentium inuenta sunt, illos non secundum directionem axis, sed lateraliter extrahant, optimum videtur esse, vt in euulsione dentis ille versus illud latus trahatur, in quo processus alueolaris debili-
 or est. Hoc vero in omnibus, si duos molares
 poste-

posteriores maxillae inferioris excipias, externum est.

Figurarum huic libro annexarum elegantia summa est, in quibus non solum maxillae et dentes humano corpore desumpti; sed etiam animalium dentes, v. c. equi repraesentantur. Ex tabula decima quarta apparet, in equis corticem osseam partem non includere, vt in homine, sed illum, in striis longitudinalibus dispositum, ac osseae parti intermixtum esse.

XII.

Synopsis of Quadrupeds (by THOMAS PENNANT). Chester, printed by I. Monk. 1771. 8 mai. 1 Alph. 2 pl. tab. aen. 31.

i. e.

Synopsis Quadrupedum Auctore THOMA PENNANT.

Auctorem huius libri esse Cl. PENNANT, qui *zoologia Britannica* *) et *itinerario Scotico*, proxime a nobis indicaturo, suam zoologiae cognitionem abunde iam declarauit, ex nomine praefationi subiecto cognouimus. Consilium vero Cl. Auctoris in hoc conscribendo libro primum erat, vt ad proprium vsum nomina quadrupedum omnium ab Ill. BVFFON descriptorum, quae vt notum est, Ill. LINNAEVS in suo *Systemate* plane omisit, colligeret, eaque nomina in systematicum ordinem redigeret, additis aliis animalibus, a LINNAEO et BVFFONIO non commemoratis. Cum vero, indice hoc ad finem perducto, Cl. Auctori ille dignus videretur, qui

*) vid. comm. nostr. Vol. XVI. p. 408.

qui in lucem ederetur, synonyma aliorum Auctorum, descriptionesque animalium breues, locum natalem variasque de moribus et usu eorum obseruationes addidit; eaque ratione Synopsin hanc perfecit, quam omnibus historiae naturalis cultoribus gratissimam aequae, ac vtilissimam fore, putamus.

Ordo, quem Cl. Auctor in hoc Systemate quadrupedum sequitur, ex RAY et LINNAEI methodo compositus est. Quamquam enim insignia Ill. LINNAEI in zoologiam merita summis encomiis extollit; fatetur tamen, se in variis ab eo recedere, nec eius methodicam quadrupedum dispositionem sibi in omnibus arridere. Hominem enim a simiis, lemuribus et vespertilionibus; elephantem, sagacissimum illud animal, a stupidissimo bradypo, dasypo et myrmecophaga; talpam, foricem et erinaceum a feris; noctilionem, vt vespertilionis speciem, a gliribus separare mauult. Nec cetacea ad vnam cum quadrupedibus classem pertinere, sed propriam et singularem eorum classem constituendam esse putat.

Cum vero nos in recensendo egregio illo opere Ill. BUFFONII*), synonyma Ill. LINNAEI non vbique adduxerimus; BUFFONII contra synonyma in Linnaeano systemate, quo omnes zoologiam vtuntur, plane deficient, tandemque a Cl. PENNANT multa animalia nouiter detecta, vel a prioribus scriptoribus omissa addita sint; operae pretium, nec lectoribus iniucundum fore putauimus, si epitomen Systematis Nostri, additis Ill. LINNAEI et BUFFONII synonymis, hic adducamus,

*) Primum volumen vid. comment. nostr. Vol. III. p. 316 seqq.

camus, quae, quod ad posterioris opus pertinet, indicis quasi systematici, Linnaeani vero systematis supplementi loco inferuire potest.

Quadrupeda, a quibus, ut diximus, *cetacea* se-
iungit, quae Ill. LINNAEVS vna cum iis com-
muni *mammalium* nomine comprehendit, Cl. Auctor
in quatuor ordines diuidit. Horum primus *qua-*
drupeda unguolata continet, secundus *digitata*, ter-
tius *pinnata*, quae pisciuora, vel herbiuora sunt
et in aqua potissimum viuunt, quartus denique
alata, quae insectis vescuntur. Ad hos ordines
quadraginta tria genera Auctor Cl. refert, quae ut
plurimum LINNAEI sunt. Omisit tamen *Homi-*
nis, et *Vierrae* genus ac *Noctilionis* ad alia retu-
lit. Auxit vero systema suum nouis, *Giraffae*,
Antilopes, *Tapiri*, *Hyaenae*, *Taxi*, *Lutrae*, *Cauiae*,
Marmotae et *Ierboae* generibus, quae, uti notum
est, LINNAEVS olim aliis generibus inseruerat.

Primus itaque Cl. Auctoris ordo, animalium
ungulatum est. Inter illa *equi* genus *solipedum* est,
(*whole hoofed*): reliqua omnia *pedem unguatum bi-*
fulcum vel *in plures partes fissum* (*cloven hoofed*)
habent, et iterum vel *cornuta* sunt, vel *cornubus*
destituuntur.

Genus I. *Equi* sequentes comprehendit species :

Sp. 1. *E. generosus* seu *caballus* L. BVFF. T. IV.
tab. 1. 2.

— 2. *E. zebra* L. BVFF. XIV. tab. 1. 2.

— 3. *E. asinus* L. BVFF. IV. tab. 11.

Mulus hybridum ex equo et asino animal.

Genus II. *Bos*.

Sp. 4. *B. taurus* L. BVFF. IV. tab. 14. Varieta-
tes eius sunt α) *B. grunniens* L. *la vache de*
Barbarie BVFF. XV. p. 136. β) *B. Indicus*
dorso

dorso gibboso, qui magnitudine et cornuum figura multum variat.

Sp. 5. B. *Bubalis* L. *le Buffle* BVFF. XI. 25.

Huius varietas est α) B. *nudus*, pilis rarioribus, tenuissimis, setaceis, ex India Orientali.

Sp. 6. B. *americanus* seu *bison* L. BVFF. XI. p. 305.

S. 7. B. *pygmaeus* seu *indicus* L. *).

Genus III. *Ovis*.

Sp. 8. O. *aries* L. BVFF. V. tab. 1. 2. Varietates

eius sunt: α) O. *rustica* L. β) O. *strepsiceros*

L. γ) O. *anglica* L. δ) O. *polycerata* L. **)

ε) *africana* seu *guineensis* L. *le belier des Indes*

BVFF. XI. t. 34. ζ) *laticauda* L. *le mouton*

de Barbarie BVFF. XI. t. 33

Genus IV. *Capra*.

Sp. 9. C. *fera*. f. *ibex* L. *le bouquetin* BVFF. XII.

t. 13. Ad hanc speciem tanquam varietates

Cl. Auctor refert: α) C. *hircum* L. BVFF.

V. t. 8. quae tamen omnino ab ibice differt

β) C. *angorensem* L. BVFF. V. t. 10. 11. γ)

syriacam seu *mambricam* L. δ) C. *africanam* seu

depressam L. *le bouc d'Afrique* BVFF. XIII.

t. 18. 19. ε) C. *whidaiensem* seu *reversam* L.

le Bouc de Iuda BVFF. XII. t. 20. 21. quae

non in America, sed Africa habitat. ζ) *Ca-*

pricornum. BVFF. XII. t. 15.

Sp. 10. C. *rupicapra* L. *le Chamois* BVFF. XII. t. 16.

Sp. 11. C. *sibirica*, *le moufflon* BVFF. XI. t. 29. ***)

Ge-

*) *Zebu* BVFF. T. XI. tab. 13. ad varietatem β speciei
4 huius generis pertinet.

**) Ab ea *le belier d'Islande* BVFF. XI. tab. 31. quodam-
modo differt.

***) Est *Capra Ammon* L. Hanc ouem in statu fero esse
Cl. BVFFON putat, quod vero Cl. Auctor negat,
qui varia eiusmodi animalia ex Sardinia et Corsi-
ca allata vidit.

Genus V. Giraffa.

Sp. 12. *G. camelopardalis* seu *Cervus camelopardalis* L. a quo genere tamen Cl. PENNANT singulare hoc animal, cuius specimen in museo Academiae Lugdunensis asseruatur, recte separat.

Genus VI. Antilope. Genus hoc, quod ad *Capram* L. retulerat, ex Cl. PALLAS *) egregiis observationibus Noster sequenti modo constituit.

I. Cornubus arcuatis est:

Sp. 13. *A. coerulea* seu *leucophaea* PALLAS. an *Kob* BVFF. XII. p. 210. t. 32.?

II. Cornubus rectis sunt:

Sp. 14. *A. Aegyptiaca* seu *Capra gazella* L. le *pasan* BVFF. XII. t. 33. f. 3. *A. bezoartica* PALL.

Sp. 15. *A. bezoartica* seu *C. bezoartica* L. *algazel* BVFF. XII. t. 33. f. 1. 2.

Sp. 16. *A. indica* seu *A. oryx* PALL. *coudon* BVFF. XII. tab. 47.

Sp. 17. *A. loricata* (*harnessed*) *A. scripta* PALL. *guib.* BVFF. XII. t. 40.

Sp. 18. *A. guineensis*. *Moschus Grimmia* L. *A. grimmia* PALL. *la grimme* BVFF. XII. t. 41.

Sp. 19. *A. regalis*. *le cheurotain de Guinea* BVFF. XII. t. 43. f. 2.

III. Cornubus antrorsum flexis:

Sp. 20. *A. indostanica* seu *A. tragocamelus* PALL. et in *Philos. Transact.* Vol. XLIII. p. 465.

Sp. 21. *A. albipes*. Noua species a Cl. Auctore ad specimen ex India orientali allatum descripta et depicta.

Sp. 22. *A. celeris*. *A. dama* PALL. *nanguer* BVFF. XII. tab. 34.

Sp.

*) in *Miscell. Zoologicis* p. 1. seq. vid. comm. nostr. Vol. XV. p. 238. et *Spicileg.* Fasc. I. p. 1. seq. vid. comm. nostr. ib. p. 491.

Sp. 23. *A. rubra*, seu *redunca* PALL. *nagor* BVFF. XII. t. 46.

IV. *Cornubus tortuosus*.

Sp. 24. *A. striata*, seu *strepsiceros* PALL. *condoma* BVFF. XII. t. 39.

Sp. 25. *A. vulgaris* seu *ceruicapra* PALL. *Capra ceruicapra* L. *Antelope* BVFF. XII. t. 35 et 36. ad quam varietates α) *brunea* et β) *cornubus laevis* BVFF. XII. t. 36. f. 3. pertinent.

V. *Cornubus* in medio flexis et antrorsum versus finem recurvatis.

Sp. 26. *A. barbarica*, *Capra dorcas* L. *A. dorcas* PALL. *la gazelle* BVFF. XII. t. 23.

Sp. 27. *A. cornubus planis* *A. keuella* PALL. *kevel* BVFF. XII. t. 26.

Sp. 28. *A. alba*, *A. pygargus* PALL. Hanc *tzeiran* BVFFONII esse Cl. PALLAS autumat, quod Noster negat.

Sp. 29. *A. sinensis*. *Capra campestris gutturosa* Nou. Com. Petrop. V. tab. 9. *tzeiran* BVFF. XII. p. 207.

Sp. 30. *A. scythica* PALL. *C. tatarica* L. *saiga* BVFF. XII. t. 22. f. 2.

Sp. 31. *A. maculata*. *Corine* BVFF. XII. t. 27.

Sp. 32. *A. ceruina* (an *C. dorcas* L?) *A. bubalis* PALL. *le bubale* BVFF. XII. t. 37. 38.

Sp. 33. *A. senegalensis*. *Koba* BVFF. XII. t. 32. f. 2.

Sp. 34. *A. gambiensis*. *Kob ou petite vache brune* BVFF. XII. t. 32. f. 1.

Genus VII. *Cervus*. I. *Cornubus palmatis*:

Sp. 35. *C. alces*. L. *l'elan* BVFF. XII. t. 7. 8.

Sp. 36. *C. tarandus* L. *le renne* BVFF. XII. t. 10-12.

Sp. 37. *C. platyceros* seu *Dama* L. *le dain* BVFF. VI. t. 27.

II. *Cornubus rotundatis*:

Sp. 38. *C. elaphus* L. BVFF. Vl. t. 9. 10. cuius
varietas est *le cerf de Corse* Vl. tab. 11.

Sp. 39. *C. virginicus* seu *dama virginiana* RAII.

Sp. 40. *C. Axis* BVFF. XI. t. 38. 39.

Sp. 41. *C. Axis maior*. (an prioris varietas?)

Sp. 42. *C. porcinus*, a corpore crasso ita vocatus. Nova species ex India orientali.

Sp. 43. *C. capreolus* L. *le chevreuil* BVFF. Vl. t. 32. 33.

Sp. 44. *C. mexicanus*. *Chevreuil d'Amerique*
BVFF. Vl. t. 37. an *Cariacou* EIVSD. XII. t. 44.

Sp. 45. *C. griseus* seu *guineensis* L. obscura species.

Haec genera omnia cornua habent, sequentia
vero iis destituuntur.

Genus VIII. *Moschus*.

Sp. 46. *M. tibetanus* f. *moschiferus* L. BVFF. XII.
p. 361.

Sp. 47. *M. brasiliensis*. *Cuguacure* MARGRAV.
Ceruula Surinamensis SEB. T. I. tab. 44.

Sp. 48. *M. Indicus*, BVFF. XII. p. 315.

Sp. 49. *M. guineensis* seu *pygmaeus* L. *le cheuro-*
tain des Indes BVFF. XII. t. 42. 43.

Genus IX. *Camelus*.

Sp. 50. *C. arabis* seu *dromedarius* L. BVFF.
XII. t. 9.

Sp. 51. *C. bactrianus* L. *chameau* BVFF. XI.
tab. 22.

Sp. 52. *C. Llama* seu *Glama* L. BVFF. XIII. p. 16.

Sp. 53. *C. Pacos* L. BVFF. XIII. p. 16.

Genus X. *Sus*.

S. 54. *S. vulgaris* seu *scrofa* L. BVFF. V. t. 16.

Varietates sunt α) *guineensis* BVFF. XV.

p. 146. seu *Porcus* L. β. *S. chinensis* L.

Cochon de Siam BVFF. V. t. 15. γ. *S.*

ungula indiuisa (quales plures in Polonia in-

ueniuntur). Alia varietas fetis longissimis et

auribus fetosis tabula XI. depingitur.

Sp.

Sp. 55. *Sus aethiopicus* PALL. *Misc. zool.* p. 16. t. 2. et Fasc. 11. t. 1. vid. comment. Vol. XV. p. 240. et p. 493. *Sanglier du Cap verd* BVFF. XIV. p. 409. XV. p. 148.

Sp. 56. *Sus mexicanus* seu *taiacu* L. BVFF. X. t. 3. 4.

Sp. 57. *Sus indicus* seu *babyrussa* L. BVFF. XII. t. 48.

Genus XI. *Rhinoceros*.

Sp. 58. *R. unicornis* L. BVFF. XI. t. 7. cum Varietate α) *R. bicornis*. L.

Genus XII. *Hippopotamus*.

Sp. 59. *H. amphibius* L. BVFF. XII. t. 3.

Genus XIII. *Tapir*. Pedibus anticis quater vngulatis, posticis triungulatis vel bifulcis.

Sp. 60. *T. longirostris* (longnosed). *Hippopotamus terrestris* L. Edit. X. *Tapir* seu *Anta* BVFF. XI. t. 43. Quod animal LINNAEVS in Edit. XII. systematis omisit.

Sp. 61. *T. crassirostris* (thicknosed) *Sus hydrochaeris* L. *cabiai* BVFF. XII. t. 49.

Genus XIV. *Elephas*.

S. 62. *magnus* seu *maximus* L. BVFF. XI. t. 1.

S. 63. *americanus*. Ex dentibus fossilibus in America repertis nouam hanc speciem constituit, vti iam alii ante eum fecerunt. *) Maxima differentia in figura dentium molarium posita est, qui carniuororum animalium molaribus similes sunt. Hanc tamen differentiam a sola aetate pendere posse, alio loco iam monuimus **).

*) vid. Phil. Transact. Vol. LVIII. p. 34. comm. Vol. XVII. p. 388.

**) vid. ib.

Secundus quadrupedum ordo *digitata* continet,
quae Cl. Auctor in quinque diuisiones iterum
abire iussit.

Prima diuifio continet *anthropomorpha*. Ad
quam fequentia genera pertinent.

Genus XV. Simia.

I. Cauda nulla. *Simiae veterum.*

Sp. 64. *S. magna*. f. *Satyrus* L. et *Homo troglodytes* EIVSD. *Iocko* BVFF. XIV. t. 1. et *Pongo* EIVSD.

Sp. 65. *S. pygmaeus* f. *Sylvanus* L. *Pytheque* BVFF. XIV. p. 84.

Sp. 66. *S. longimana* (Est homo lar L. *Mantiff.* II. p. 521. vid. *Phil. Transact.* 1769. p. 71. t. 3. *Comm. Vol. XVIII.* p. 641.) *le Grand gibbon* BVFF. XIV. t. 2. cuius varietas est *le petit gibbon* EIVSD. l. c. t. 3.

Sp. 67. *S. barbarica* f. *Inuus* L. *Magot* BVFF. XIV. t. 7. 8.

Sp. 68. *S. fastigiata* (tufted). *Mantegor* *Phil. Trans.* n. 290.

II. Cauda abbreviata. *Papiones.*

Sp. 69. *S. naso sulcato* (ribbed nose) *Mandril* BVFF. XIV. t. 16. 17. *Maimon* L. *).

Sp. 70. *S. minor* *S. apedia* L.

Sp. 71. *S. breuicaudata* (pig-tail) *Nemestrina* L. *Maimon* BVFF. XIV. t. 19.

III. Cauda elongata. *Cercopithec.*

a. *S. antiqui orbis*, quae bucca faccata, natibus caluis et cauda elongata non prehensili donantur.

Sp. 72. *S. cynocephalus* (dog faced) *hamadryas* L. *Babouin* BVFF. T. XIV. t. 13. 14.

Sp.

*) Descriptionem huius animalis vid. in *Act. Suecicis* Vol. XXVII. p. 138. *Com.* Vol. XVI. p. 585.

- Sp. 73. *S. cauda leonina*. Huc pertinent *S. faunus*, *silenus* et *S. veter* L. nec non l' *Ouwanderou* BVFF. XIV. t. 18. Quinque huius speciei vacietates hic recensentur.
- Sp. 74. *S. labio leporino* (hare lipped) *S. Cynomolgus* L. et *S. cynocephalus* EIVSD. *Macaque* BVFF. XIV. t. 14. Varietas eius est *Malbrouck* BVFF. XIV. t. 29.
- Sp. 75. *S. maculata* *S. Diana* L. *Exquima* BVFF. XV. p. 16.
- Sp. 76. *S. viridis* f. *sabaea* L. *Callitriche* BVFF. XIV. t. 37.
- Sp. 77. *S. palpebra alba* seu *aethiops* L. quam ille varietatem *S. cephi* esse putat. Est *Mangabey* BVFF. XIV. t. 32. Huius varietas est: *Mangabey à collier blanc* BVFF. l. e. t. 33.
- Sp. 78. *S. moustac* BVFF. XIV. t. 39. seu *cephus* L.
- Sp. 79. *S. talapoin* BVFF. XIV. t. 40.
- Sp. 80. *S. aethiops*. EDW. 311. quam figuram LINNAEVS ad sequentem speciem refert.
- Sp. 81. *S. egretta* seu *l'aigrette* BVFF. XIV. t. 21.
- Sp. 82. *S. rubra*. *Patras à bandeau noir* BVFF. XIV. t. 25. et varietas *à bandeau blanc* t. 26.
- Sp. 83. *S. sinensis*. *Sinica* L. Mant. 2. p. 521. *Bonnet chinois* BVFF. XIV. t. 30.
- Sp. 84. *S. variegata*. *Mone* BVFF. XIV. 36.
- Sp. 85. *S. cochin-sinensis*. *Nemaeus* LINN. Mantiff. 2. p. 521. *Douc* BVFF. XIV. t. 41.
- Sp. 86. *S. fusca* (tawny). Noua species.
- Sp. 87. *S. nivitans* L.
- Sp. 88. *S. barba caprina*. Noua species.
- Sp. 89. *S. annulata*. Noua species.
- Sp. 90. *S. philippensis* seu *syri hta* L.

b. *S. noui orbis*, quae receptaculo illo in buccis carent, nec nates caluas habent.

1) cauda prehensili *Sapajous* (BVFF.)

- Sp. 91. *S. concionator*. *S. beelzebul* L. (an *sapajou ouarine* BVFF. XV. p. 5?) Varietas huius est *S. saniculus* L. feu *l'alouate* BVFF. XV. p. 5. seq.
- S. 92. *S. palmis tetractylis* feu *paniscus* L. *coaita* BVFF. XV. p. 16. t. 1.
- Sp. 93. *S. capucina*. Comprehendit *S. trepidam* L. et *capucinam* atque *apellam* EIVSD. Est *sajou brun et gris* BVFF. XV. t. 4. et 5.
- Sp. 94. *S. eiulans*. *Sai* et *sai à gorge blanc*. BVFF. XV. t. 8. 9.
- Sp. 95. *S. aurantii coloris* f. *sciurea* L. *saimiri* BVFF. XV. t. 10.
- Sp. 96. *S. cornuta* f. *fatuellus* L.
- Sp. 97. *S. Antiguenfis*. Noua species.
2) cauda non prehensili (naribus patulis, *Sagouins* BVFF.)
- Sp. 98. *S. cauda vulpina*. *Pithecia* L. *saki* BVFF. XV. t. 18.
- Sp. 99. *S. aurita* f. *midas* L. *tamarin* BVFF. XV. t. 13.
- Sp. 100. *S. striata* f. *iacchus* L. *l'ouistiti* BVFF. XV. t. 14.
- Sp. 101. *S. sericea* f. *rosalia* L. *marikina* BVFF. XV. t. 16.
- Sp. 102. *S. cauda rubra* *S. oedipus* L. *pinche* BVFF. XV. t. 17.
- Sp. 103. *S. pulcra. argentata*. L. Mant. 2. p. 521. *mico* BVFF. XV. t. 18.
- Genus XVI. *Maucauco* feu *Lemur* L.
- Sp. 104. *M. ecaudatus* f. *Lemur tardigradus* L. *Loris* BVFF. Xlll. t. 30.
- Sp. 105. *M. laniger*. f. *Lemur mongooz* L. BVFF. Xlll. t. 26.
- Sp. 106. *M. cauda annulata*. *Lemur catta* LIN. *Mococo* BVFF. Xlll. t. 22.
- Sp.

Sp. 107. *M. collari barbato*. *Lemur macaco* L.
Vari. BVFF. XIII. t. 17.

Sp. 108. *M. flavus*. Noua species.

Sp. 109. *M. volans* seu *Lemur volans* L. (Conf.
BVFF. X. p. 98.)

Secunda diuifio continet quadrupeda digita-
ta, dentibus laniariis maioribus ab incifori-
bus remotis, et sex vel pluribus incisoribus in
vtraque maxilla instructis. Omnia carniuora
sunt et ad *Feras* L. pertinent.

Genus XVII. *Canis*.

Sp. 110. *C. fidelis* seu *familiaris* L.*) hanc speciem
secundum Cl. BVFFON in varias familias di-
uidit Noster.

α) *C. domesticus* L. *le chien de berger* BVFF.
V. t. 28. Ad illum accedunt 1) *C. Pomeranus*. *Chien loup* BVFF. t. 29. 2) *Sibiricus*. ib.
t. 30.

β) Auribus longis pendulis nudis. *sagax*. L. *chien*
courant BVFF. t. 32. ad illum pertinent 1)
le braque BVFF. t. 33 2) *dalmaticus*, *le bra-*
que de Bengale id. t. 34. 3) *le basset à jambes*
torses et à iambes droites id. t. 35. 4) *aquati-*
cus L. *le grand et petit barbet* BVFF. t. 37. 38.

γ) Auribus longis, pendulis, nudis f. *auicula-*
rius L.? *spaniel Anglorum*. 1) *le gredin* BVFF.
t. 39. f. 1. 2) *le pirame* ib. f. 2. 3. *C. melitaeus*
L. *bichon et chien lion* BVFF. t. 40. f. 1. 2.

δ) Auribus breuib. pendulis trunco elongato,
pedibus longis. 1) *C. graius hibernicus*. (*Le*
matin BVFF. t. 25.) 2) *C. graius vulgaris* f.
graius L. *leurier* BVFF. V. t. 27. orientales cau-

Y 5

dam-

*) Characterem huius speciei Cl. Auctor cum LIN-
NAEO in cauda finistrorsum recurvata ponit, quod
tamen non perpetuum est.

dam pilis longis vestitam habent, cum reliqui
laeues sint. 3) *danicus*. BVFF. 26. 4) *molos-*
sus L. BVFF. t. 45.

ε) auribus brevioribus pendulis, trunco, naso et
pedibus brevioribus 1) *le dogue* BVFF. V. t. 43.
2) *le doguin* ID. t. 44. 3. *le roquet* ID. t. 41. f. 2.
4. *nudus* f. *aegyptius* L. *Chien turc*. BVFF. t. 42.

Sp. III. C. *lupus* L. BVFF. VII. t. 1. Ad hanc
speciem quoque pertinet *Canis mexicanus* L.
feu *Lupus mexicanus* BVFF. XV. p. 149. *).

Sp. 112. C. *vulpes* L. BVFF. VII. t. 6. Varieta-
tes eius sunt: α) C. *alopex* **) β) *V. crucigera*.
BVFF. XIII. p. 276. γ) *V. nigra*. δ) Varie-
tas ex Pensylvania diuersis coloribus variegata,
quam Noster ibidem *Brant-Fox* vocari asse-
rit. ε) *V. Corsac* f. *Canis corsac* L.

Sp. 113. C. *arcticus* feu *lagopus* L. *Isatis* BVFF.
XIII. p. 272.

Sp. 114. C. *griseus* feu C. *ex cinereo argenteus*
BRISS.

Sp. 115. C. *argenteus*. Noua species ex Louisiana.

Sp. 116. C. *iackal* feu *aureus* L. *Chacal* vel *Adi-*
ve BVFF. XIII. p. 255.

Sp. 117. C. *Surinamensis* feu *thous* L.

Genus XVIII. *Hyaena*. Hoc genus palmis et plan-
tis tetradactylis est, et folliculum inter caudam
breuem et anum habet.

Sp. 118. H. *striata*. *Canis hyaena* L. BVFF.
IX. t. 25.

Sp. 119. H. *maculata*. Noua species, cuius in
variis itinerariis mentio fit, quae vero non-
dum

*) Canem et lupum coitu misceri et hybridum inde
animal nasci Cl. Auctor observatione conprobat.

**) Hunc nostri *brand-fuchs* vocant, quod nomen Au-
ctor varietati δ imponit.

dum a vulgari distincta fuit. Vivum animal
Cl. Auctor Londini observavit et depingere
curavit.

Genus XIX. *Felis*.

I. Cauda elongata.

Sp. 120. *F. leo* L. BVFF. IX. t. 1.

Sp. 121. *F. tigris* L. BVFF. IX. t. 9.

Sp. 122. *F. pardus* L. *Panthere* BVFF. IX. t. 11.

12. quam speciem et in America reperiri Cl.
Auctor probat.

Sp. 123. *F. leopardus*. BVFF. IX. t. 14.

Sp. 124. *F. leopardus minor*. Noua species ex
India orientali.

Sp. 125. *F. venatoria* (Hunting leopard).

Sp. 126. *F. uncia*. *L'once* BVFF. IX. t. 13.

Sp. 127. *F. brasiliensis*. *F. onca* L. *Jaguar* BVFF.
IX. t. 18.

Sp. 128. *F. mexicana*. *L'ocelot* BVFF. XIII. t.
35. 36.

Sp. 129. *F. fulva concolor* L. Mant. II. p. 522.
Cougar BVFF. IX. t. 19.

Sp. 130. *F. nigra*. *Iaguarete* MARCGRAV. VII.

Sp. 131. *F. Capensis*. Noua species.

Sp. 132. *F. Cayennensis*. *Margay* BVFF. XIII.
t. 37.

Sp. 133. *F. vulgaris* f. *sylvestris* BVFF. VI. t. 1.

ex qua *F. domestica* seu *F. catus* L. BVFF. VI.

t. 2. originem duxit. Varietates eius sunt: α)

F. angorensis BVFF. VI. t. 5. β) *F. colore*

testudinis seu *hispanica* BVFF. VI. t. 3. γ) *F.*

coerulea. *Chat des Chartreux* BVFF. VI. t. 4.

II. Cauda abbreviata.

S. 134. *F. montana* f. *pardalis* L. Varietas huius
est: *F. Serval* BVFF. XIII. t. 34.

Sp. 135. *F. Lynx*. L. BVFF. IX. t. 21.

Sp.

Sp. 136. *F. fusca* (bay). Ex America septentrionali haec noua species lyncis allata est.

Sp. 137. *F. Persica* seu *caracal* BVFF. lX. t. 24.

Genus XX *Vrsus*.

Sp. 138. *V. niger* seu *arctos* L. BVFF. Vlll. t. 31. 32.

Sp. 139. *V. polaris* seu *albus* BVFF. XV. p. 128. Species magnitudine et aliis characteribus a praecedente differt. Prioris tamen speciei quoque vrsi in Tartaria hyeme quandoque albescunt.

Sp. 140. *V. luscus* L. Ad eum pertinere *Mustelam gulonem* L. le *glutton* BVFF. Xlll. p. 278. seu potius vnam eandemque speciem esse Cl. Auctor putat, quod, si figuram, quae apud KLEINIVM in quadruped. histor. tab. 5. et in Actis Nidrosiensibus *) exstat, cum figura EDWARDI t. 103. comparamus, vix concedere possumus.

Sp. 141. *V. racoon* f. *lotor* L. *Raton* B. Vlll. t. 43.

Genus XXI. *Meles*. Vnguibus anticis longissimis et folliculo putorio ab vrsu differt.

Sp. 142. *M. vulgaris* seu *Vrsus meles* L. BVFF. Vlll. t. 7.

Sp. 143. *M. americanus*. Noua species ex freto Hudsonis.

Genus XXII. *Opossum* seu *Didelphis* L.

Sp. 144. *O. virginicus* f. *Didelphis marsupialis* L. *Sarique* f. *Opossum* BVFF. X. t. 45. 46.

Sp. 145. *murinus* f. *D. murina* L. la *Marmose* BVFF. X. t. 52. 53.

Sp. 146. *O. mexicanus*. *Cayopolin* BVFF. t. 55.

Sp. 147. *O. cauda abbreviata* seu *Philander obscu-*
re

*) vid. Vol. III. p. 121. comm. nostr. Vol. XVI. p. 676.

re rufus in dorso, in ventre helius, cauda breui et crassa BRISSON.

Sp. 148. *O. surinamensis* (*Phalanger* BVFF. XIII. t. 10. 11.) Est *Didelphis orientalis* PALLAS *Miscell. Zool.* p. 59. comm. nostr. XV. p. 243.

Sp. 149. *O. merianensis. Didelphis dorfigera* L. *Philandre de Surinam* BVFF. XV. p. 157.

Genus XXIII. *Mustela*.

Sp. 150. *M. vulgaris* feu *M. supra rutila infra alba* BRISSON. *la bellette* BVFF. VII. t. 29. *Mustela niualis* L.

Sp. 151. *M. erminea* L. *le roselet* BVFF. VII. t. 28. f. 1. quae, si hyemali tempore candida fit Var. β. LINNAEI feu *l'hermine* BVFF. VII. t. 29. f. 2. est.

Sp. 152. *M. putorius* L. BVFF. VII. t. 23.

Sp. 153. *M. furo* L.

Sp. 154. *M. martes* L. *Fouine* BVFF. VII. t. 18. (Nostratibus *Hausmarter*).

Sp. 155. *M. abietum*. Varietas prioris apud L. *la Marte* BVFF. t. 22. (*Steinmarter* Germanis.)

Sp. 156. *M. Zibellina* L. BVFF. XIII. p. 309.

Sp. 157. *M. piscator*. Ex America septentrionali, cum priori satis couenit.

Sp. 158. *M. Madagascariensis. Vansire* BVFF. XIII. f. 21.

Sp. 159. *M. Pekan* BVFF. XIII. t. 42. ad quam speciem etiam ea, quam IDEM l. c. t. 43. *Vison* vocat, a Nostro refertur.

Sp. 160. *M. Guineensis. Tayra* f. *Galera* BVFF. XV. p. 155.

Sp. 161. *M. guianensis. f. barbara* L.

Sp. 162. *M. ichneumon* f. *Vierra ichneumon* L. cum varietate β) quae *Vierra indica* BRIS-

SONII feu *Mangouste* BVFF. XIII.
t. 19. est.

Sp. 163. *M. digitis quatuor*. *Surikate* BVFF.
XIII. t. 8.

Sp. 164. *M. brasiliensis*. *Vierra nasua* L. *Coati*
brun BVFF. VIII. tab. 48. cum varietate,
quae *Coati noiratre* BVFFONII l. c. tab. 47.
feu *Coati mundi* MARGRAVII est.

Sp. 165. *M. foetens* feu *Isquiepatle* HERNAND.
an *Coase* BVFF. XIII. t. 38?

Sp. 166. *M. striata*. *Vierra putorius* L. *Cone-*
pate BVFF. XIII. t. 40.

Sp. 167. *M. Skunk*. *Chinche* BVFF. XIII. t. 39.

Sp. 168. *M. zorilla* (an *zorille* BVFF. XIII.
t. 41?)

Sp. 169. *M. pedens* (*fizzler*) ex Capite bonae
spei. Noua species.

Sp. 170. *M. zibetha* feu *Vierra zibetha* L. la
Ciuette BVFF. IX. t. 34. Huius varietas est
Zibet BVFF. ib. t. 31.

Sp. 171. *M.* feu *Vierra genetta* L. BVFF. IX.
t. 36.

Sp. 172. *M. fossane* BVFF. XIII. t. 20.

Genus XXIV. *Lutra*. Genus hoc palmas et plantas
pentadactylas et plantas palmatas habet.

Sp. 173. *L. maior* feu *Mustela Lutra* L. BVFF.
VII. t. 11. Varietatem maiorem nigri coloris
ex obseruatione Cl. BANKS addit.

Sp. 174. *L. minor* f. *Mustela lutreola* L.

Sp. 175. *L. marina* f. *Mustela lutris* L. *Saricoui-*
enne. BVFF. XIII. p. 319.

Tertia diuisio quadrupeda digitata continet, quae
dentibus lanariis carent, sed duos incisores in
vtraque maxillae habent. Herbiuora aut fru-
giuora sunt (*Glires* L).

Genus

Genus XXV. *Cavia*. Genus hoc ad *mures* LINNAEVS retulit. Palmis tetradactylis, plantis tridactylis instruitur. Aures eius breues sunt, ac cauda caret vel abbreviatam tantum habet.

Sp. 176. *C. inquieta*. *Mus porcellus*. L. *cochon d'Inde* BVFF. VIII. t. 1.

Sp. 177. *C. petrea*: *Aperea* BVFF. XV. p. 160.

Sp. 178. *C. maculata*. *M. paca* L. BVFF. X. t. 43.

Sp. 179. *C. longirostris*. *M. aguti*. L. BVFF. VIII. t. 5.

Sp. 180. *C. oliuacea*. *Akouchi*. BVFF. XV. p. 158.

Sp. 181. *C. Iauensis*. *M. leporinus*. L.

Sp. 182. *C. Capensis* PALL. Misc. zool. p. 30. Spicil. Fasc. II. t. 2. 3. vid. Comm. Vol. XV. p. 241. 493.

Sp. 183. *C. moschata*. *Rat musqué* BVFF. X. p. 2.

Genus XXVI. *Lepus*.

Sp. 184. *L. vulgaris* f. *timidus* LINN. BVFF. VI. t. 38.

Sp. 185. *L. Sibiricus* feu *alpinus*, qui hyeme albescit.

Sp. 186. *L. cuniculus* LINN. BVFF. VI. t. 50. 51. Varietates eius sunt. 1) *L. angorensis*, *Lapin d'Angora* BVFF. VI. t. 53. 2) *L. moscouiticus*, quae species cutaneam plicam in dorso, aliamque sub gula habet, in quae caput retrahere potest. In plica dorsali foramina sunt, per quae lux ad oculos venire potest. Singulare hoc animal ad figuram et descriptionem Cl. EDWARDI, quae in museo Britannico asseruatur, hic descriptum et depictum est.

Sp. 187. *L. Brasiliensis* LINN. *Tapeti* BVFF. XV. p. 162.

Sp. 188.

Sp. 188. *L. baikal* feu *Cuniculus*, insigniter caudatus, coloris leporini. Nou. Com. Petrop. V. t. II. Tolai BVFF. XV. p. 138.

Sp. 189. *L. Capensis* LINN. *).

Genus XXVII. *Castor*.

Sp. 190. *C. fiber* L. BVFF. VIII. t. 36.

Sp. 191. *C. moschatus* f. *zibethicus*. L. *Ondatra* BVFF. X. t. I. (S. G. GMELIN *Reise durch Rusland*. T. I. p. 28.)

Sp. 192. *C. longirostris* f. *moschatus* L. (*desman* BVFF. X. t. 2.)

Genus XXVIII. *Hystrix*.

Sp. 193. *H. cristata* L. *Porc - epic*. BVFF. XII. t. 51. 52.

Sp. 194. *H. macroura* L. **).

Sp. 195. *H. Brasiliensis* feu *prehenilis* L. *An Coendou* BVFF. XII. t. 54. ? quae cum sequente magis conuenit.

Sp. 196. *H. Canadensis* f. *dorsata* L. *Vrson* BVFF. XII. t. 55.

Genus XXIX. *Marmota*. Species, quae ad hoc genus pertinent omnes palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis breuioribus, cauda pilosa mediocri, vel abbreviata praeditae sunt, et a LINNAEO Ill. *muribus* annumerantur.

Sp. 197. *alpina* feu *Mus marmota* L. BVFFON VIII. t. 18. Animal, quod idem Cel. BVFFON sub nomine *Bobak* XIII. t. 18. describit est *marmota Ucranica, campestris*.

Sp.

*) Addi potuisset *Lepus pusillus* quem Cl. PALLAS in Comm. Petrop. Vol. XIII. p. 531. descripsit. Vide Comm. Vol. XVIII. p. 625. it. LINN. mant. II. p. 522.

**) Hanc dubiam esse speciem et forte animal laesum Ill. BVFFON asserit.

Sp. 198. *M. marilandica* seu *Mus monax* L.

Sp. 199. *M. canadensis*. Noua species.

Sp. 200. *M. germanica*. *Mus cricetus* L. *Hamster* BVFF. XIII. t. 14. 16.

Sp. 201. *M. casanensis*. *Souslik*. BVFF. XV. p. 144. 195. 205 *).

Sp. 202. *M. lapponica* seu *Mus lemmus* L. *lemming* BVFF. XIII. p. 314.

Sp. 203. *M. auriculis carens* f. *Mus citellus* L. *Ziesel* BVFF. p. 139 **).

Sp. 204. *M. podoliae*. *Zemni* BVFF. p. 142.

Sp. 205. *M. circaffiensis*. Noua species a SCHOBERO in MÜLL. *Russ. samlung*. VII. p. 124. descripta.

Genus XXX. *Sciurus*.

Sp. 206. *S. vulgaris* L. BVFF. VII. t. 32. cuius duae varietates ex freto Hudsonis et ex insula Ceylon adduntur.

Sp. 207. *S. zeylanicus* RAI, quem Cl. Auctor in *zoologia Indica* t. I. depinxit.

Sp. 208. *S. Bombayensis* cum varietate colore purpureo, flauo et aurantio variegata. Noua species.

Sp. 209. *S. cinereus* L. *le petit gris* BVFF X. t. 25. cuius minor quoque varietas extat.

Sp. 210. *S. niger* L. cum varietate ex griseo et nigro variegata.

Sp. 211. *S. variegatus* L. *Coquallin* BVFF. XIII. t. 13.

Sp. 212. *S. elegans* seu *flauus* L.

Sp. 213. *S. brasiliensis* f. *aestuanus* L.

Sp. 214. *S. mexicanus* SEB. T. I. tab. 47.

Sp. 215.

*) An *fuslick* GMELIN l.c. p. 31.?

**) Haec species etiam in Russia *fuslick* vocatur.

Sp. 215. *S. palmarum* L. *Palmiste* BVFF. X. t. 26.
huius varietas est *S. barbaricus* seu *getulus* L.
Barbaresque BVFF. X. t. 27.

Sp. 216. *S. terrestris* seu *striatus* L. *le Suisse* BVFF.
X. t. 28.

Sp. 217. *S. pinguis* seu *Glis* L. *le Loir* BVFF.
VIII. t. 24.

Sp. 218. *S. hortensis* f. *Mus quercinus* L. *le Lerot*
BVFF. VIII. t. 25.

Sp. 219. *S. auellana* seu *Mus auellanarius* L.
le Muscardin BVFF. VIII. t. 26.

Sp. 220. *S. vela faciens* (sailing) f. *Sagitta* L.
petaurista PALL. *Misc.* t. 6. *).

Sp. 221. *S. volans* L. *Polatouche* BVFF. X. t. 21.
Huius varietas est *Mus volans* L.

Genus XXXI. Ierboa. Comprehendit hoc genus
eas species *murini* generis, quae pedibus anti-
cis breuissimis, posticis longissimis, grallarum
pedibus similibus et cauda elongata, in apice
pilosa, instructae sunt.

Sp. 222. *I. aegyptiaca* f. *Mus iaculus* L. *Gerbo*
BVFF. XIII. p. 141. **).

Sp. 223. *I. sibirica*. Est: *Cuniculus pumilio saliens*
cauda longissima Nou. Com. Petrop. V. tab.
9. f. 1.

Sp. 224. *I. torrida*. f. *Mus longipes* L.

Sp. 225. *I. lanata*. *Tarsier* BVFF. XIII. t. 9.

Genus XXXII. Rattus seu *Mus*.

Sp. 226. *M. niger* f. *rattus* L. BVFF. VII. t. 36.

Sp. 227. *M. fulvus*. Est *R. sylvestris* BRISSON.
et *Surmulot* BVFF. VIII. t. 27.

Sp. 228. *M. aquaticus* f. *amphibius* L. *le Rat d'eau*
BVFF. VII. t. 43. Plantae minime palma-
tae sunt.

Sp. 229.

*) vid. comm. Vol. XV. p. 242.

**) Vide quoque S. G. GMELIN *Reise durch Rußland*,
T. I. p. 26.

- Sp. 229. *M. musculus* L. *la Souris* BVFF. VII. t. 39.
 Sp. 230. *M. agrestis* f. *sylvaticus* L. *le Mulot* BVFF.
 VII. t. 41. Varietas eius in America occurrit.
 Sp. 231. *M. messor* (harvest.) Noua species in
 Anglia messis tempore copiose occurrens.
 Sp. 232. *M. orientalis* f. *striatus* L.
 Sp. 233. *M. cauda breui* f. *terrestris* L. *le Campa-*
gnol BVFF. VII. t. 47.*).
 Sp. 234. *M. gregarius* L.
 Genus XXXIII. *Sorex*.
 Sp. 235. *S. foetidus* f. *araneus* L. BVFF. VIII,
 t. 10.
 Sp. 236. *S. aquaticus* BVFF. VIII. t. 11.
 Sp. 237. *S. minutus* L.
 Sp. 238. *S. murinus* L.
 Sp. 239. *S. brasiliensis* BVFF. XV. p. 160.
 Sp. 240. *S. mexicanus*. *Tucan* BVFF. XV. p. 159.
 Genus XXXIV. *Talpa*.
 Sp. 241. *T. europaea* L. BVFF. VIII. t. 12. Va-
 rietas flaua in America septentrionali oc-
 currit.
 Sp. 242. *T. sibirica* f. *asiatica* L. *Taupe d'orée*
 BVFF. XV. p. 145.
 Sp. 243. *T. radiata* f. *Sorex cristatus* L.
 Sp. 244. *T. cauda longissima*. Noua species.
 Sp. 245. *T. fulua* f. *Sorex aquaticus* L.
 Sp. 246. *T. rubra* SEB. T. I. t. 32. f. 2.
 Genus XXXV. *Erinaceus*.
 Sp. 247. *E. vulgaris* f. *europaeus* L. BVFF.
 VIII. c. 6.
 Sp. 248. *E. asiaticus*, *Tendrac* BVFF. XII. t. 56.
 et *Tanrec* EIVSD. ib. t. 57.
 Sp. 249. *E. guianensis* f. *inauris* L.

*) add. *Mus paludosus* LINN. Mant. 2. p. 522. muri ter-
 restri similis, ad Sueciae fossas viuens.

Sectio quarta sistit *quadrupeda digitata*, quae incisoribus plane carent.

Genus XXXVI. *Bradypus*,

Sp. 250. *B. tridactylus* L. l' *Ai* BVFF. XIII. t. 5. 6.

Sp. 251. *B. didactylus* L. l' *Vnau* BVFF. XIII. t. I.

Genus XXXVII. *Dasypus*.

Sp. 252. *D. tricinctus* L. *Apar* f. *Tatu à trois bandes* BVFF. X. p. 206.

Sp. 253. *D. sexcinctus*. l' *Encoubert*. BVFF. X. t. 42.

Sp. 254. *D. octocinctus* f. *septemcinctus* L. *Tatouette* BVFF. X. p. 212.

Sp. 255. *D. nouemcinctus* L. *Cachicame* BVFF. X. t. 37.

Sp. 256. *D. cingulis duodecim*. *Kabassou* BVFF. X. t. 40. An *unicinctus* L. Var. *α*.?

Sp. 257. *D. cingulis octodecim* f. *unicinctus* L. var. *β*. *Cirquinçon* BVFF. X. t. 42.

Quinta sectio continet *quadrupeda digitata*, quae omnibus dentibus carent.

Genus XXXVIII. *Manis*.

Sp. 258. *M. cauda elongata* f. *tetradactyla* L. *Phatagin* BVFF. X. t. 35.

Sp. 259. *M. cauda abbreviata* f. *pentadactyla* L. *Pangolin* BVFF. X. t. 34. *).

Genus XXXIX. *Myrmecophaga*.

Sp. 260. *M. maior* f. *iubata* L. *Tamanoir* BVFF. X. t. 29.

Sp. 261. *M. media* f. *tetradactyla* L. *Tamandua* BVFF. X. p. 144.

Sp. 262.

*) An *Manis* pedibus anticis pentadactylis, posticis tetradactylis; vid. Phil. Transact. Vol. LX. p. 36. huius varietas. Vocatur in India occidentali *Alangu*.

Sp. 262. *minor* f. *didactyla* L. *Fourmillier* BVFF.
X. t. 30.

Speciem a Cl. PALLAS Misc. zool. p. 64. (vid. Com.
nostr. Vol. XV. p. 243.) descriptam omittit,
cum eius descriptio ad fetum tantum facta sit.

Tertius *quadrupedum* ordo *pinnatorum* scilicet
sequentibus generibus compositus est.

Genus XL. *Trichecus* f. *Rosmarus*.

Sp. 263. *T. arcticus* f. *Rosmarus* L. *Morse* BVFF.
XIII. t. 54.

Sp. 264. *T. indicus*. *Dugon* BVFF. XIII. t. 56.

Genus XLI. *Phoca*.

Sp. 265. *P. vulgaris* f. *vitulina* L. *Phoque* BVFF.
XIII. t. 45.

Sp. 266. *P. maior*. *Le grand Phoque* BVFF.
XIII. p. 345.

Sp. 267. *P. hirsuta*.

Sp. 268. *P. pileata*.

Sp. 269. *P. psalterium* (harp). Omnes hae tres
species ex CRANZII *historia Groenlandiae*
desumptae sunt.

Sp. 270. *minor*. BVFF. XIII. t. 53.

Sp. 271. *P. ursina* L.

Sp. 272. *P. leonina* L. BVFF. XIII. p. 351.

Genus XLII. *Manati* pedibus anticis pinnatis,
posticis in caudam depressam desinentibus.

Sp. 273. *Manati* f. *Trichecus manatus* L. BVFF.
XIII. t. 57.

Obscurum animal, *simia marina* a STELLERO
dictum, aliudque *beluga*, quod ad phocas ac-
cedit, omittimus.

Ultimus tandem *quadrupedum* ordo *alata* conti-
net, et vnicum *vespertilionis* genus (Genus XIII.)
sistit, quod manus palmatas volitantes habet.

I. Huius generis sequentes species *cauda carent*.

Sp. 274. *V. ternatanus* f. *vampyrus* L. *la Rouffette*
et *Rougette* BVFF. X. t. 14. 17. Minorem
quoque eius varietatem Cl. PENNANT
vidit.

Sp. 275. *V. spectrum* L. *Vampire* BVFF. X p. 55.

Sp. 276. *V. naso lanceolato*. f. *perspicillatus* L.
fer de lance BVFF. Xlll. t. 33.

Sp. 277. *V. naso foliaceo*. *la feuille* BVFF. Xlll.
p. 227. *V. soricinus* PALL. *Misc.* t. 5. *).

Sp. 278. *V. cordatus* f. *Spasma* L.

II. *Caudati*.

Sp. 279. *V. peruuianus* cum *varietate minore*.

Sp. 280. *V. capite canino*. BVFF. X. t. 19. f. 1. 2.

Sp. 281. *V. senegalensis* BVFF. X. t. 18.

Sp. 282. *V. barbatus* BVFF. X. t. 20. f. 2.

Sp. 283. *V. Nou-Eboracensis*. *Nova species*.

Sp. 284. *V. striatus* BVFF. X. t. 20. f. 3.

Sp. 285. *V. moluccensis* f. *Cephalotes* PALL. *Spi-*
cil. Fasc. III. t. 1. com. Vol. XV. p. 493.

Sp. 286. *V. ferrum equinum* BVFF. Vlll. t. 17.
et 20.

Sp. 287. *V. noctula* BVFF. Vlll. t. 18. f. 1.

Sp. 288. *V. serotine* BVFF. Vlll. t. 18. f. 2.

Sp. 289. *V. Pipistrelle* BVFF. Vlll. t. 19. f. 2.

Sp. 290. *V. Barbastelle* BVFF. Vlll. t. 19. f. 1.

Sp. 291. *V. vulgaris* f. *murinus* L. BVFF. Vlll.
t. 16.

Sp. 292. *V. auritus* L. *oreillard* BVFF. Vlll.
t. 17.

*) vid. comm. nostr. Vol. XV. p. 242.

XIII.

CAROLI A LINNE' Systema Naturae ex editione duodecima, in epitomen redactum et praelectionibus academicis accommodatum a IOHANNE BECKMANNO, prof. oeconom. ordin. etc. Tom. I. Regnum Animale. Gottingae. Sumtu viduae Vandenhoeck. 1772. 8. pagg. 240. praeter praef. et indicem. Tomus II. Regnum Vegetabile. ib. eod. pagg. 356. index plagg. 24.

Indicamus solum Lectoribus nostris hunc librum, atque ipsas Cl. Auctoris rationes addimus, quae mouerunt Nostrum, ut hoc opus susciperet. Nimirum cum pretium maius, tum magna moles ingensque rerum naturalium systematis Linnaeani copia suaserunt Ei, ut tironibus seruire, atque hinc inde quaedam decerpta iis tradere institueret: quibus vterentur, donec satis versati vltiores naturae terminos attingere valerent. Resecuit synonyma, species, quarum vsus non adeo magnus, itemque genera minus cognita. Recepit contra prolegomena omnia, catalogos generum, cum characteribus contractis, species vel in vita communi vtilis, vel alio modo memoria dignas, maximeque indigenas. Praeterea numeros systematis Linnaeani retinuit, adscripsitque numerum specierum omnem cuilibet generi; additis quibusdam nominibus germanicis. Terminologiam historiae naturalis, cuius prima pars, terminologia conchyliologiae iam prostat, proxime etiam se editurum esse promittit.

Lehrbuch einer Naturhistorie; zu einem gemeinnützigen Gebrauch, wie auch zu Vorlesungen in Schulen eingerichtet und gesammelt von
 ADAM DANIEL RICHTERN. Direct.
 Gymnas. Zittau. Leipzig, bey Johann Gottfried Müller. 1772. 8. 24 Bogen.

i. e.

Compendium historiae naturalis, ad vsum scholarum conscriptum et collectum ab ADAMO DANIELE RICHTERO.

Laudamus non solum Cl. Auctoris institutum atque operam, verum etiam maximopere commendamus, vt in gymnasiis scholisque inferioribus historia naturalis, haec adeo utilis necessariaque disciplina magis colatur, atque iuuentuti studiosae fundamenta indicentur, vt de amoenitate, et vfu huius scientiae persuasa in posterum eam vltcrius prosequatur, atque ita incremento augmentoque huius scientiae magis consulatur. Offert hic Cl. Auctor breuem, atque explicationibus aptum libellum, de omnibus corporibus naturalibus succincte differentem, ita quidem, vt, expositis rerum naturalium generibus signisque distinctiuis, de earum vfu, natura aliisque proprietatibus, locis natalibus plerumque satis bene agatur: vt ita, et discentes breuem quandam habeant normam, et docentes, quid addant, interdum etiam emendent, reperiant. Omnibus enim numeris Cl. Auctor completum libellum tironibus vix necessarium esse putat, facileque, quam rogat, veniam accipiet, si in minoris momenti rebus interdum quidam irrepuerint errores.

Omnem

Omnem libellum in quatuor partitur partes; quarum prior de regno minerali exponit, in quo WOLTERSDORFII systema maxime sequitur, additis, quae recentioribus inuenta sunt temporibus: altera pars regnum vegetabile complectitur, ubi, exposita breui partium historia, classes ad LINNAEI systema enumerat; ommissis tamen pluribus generibus, omnibus speciebus, nominibus Latinis, quae, quamvis plura in indicibus addiderit, commodius certe unicuique plantae apposuisse. Tertia parte continentur animalia, excepto homine, cuius considerationem tradit pars quarta. Sequitur etiam in regno animali plerumque Linnaeanum systema, ita tamen, ut definitiones alias interdum addat. Hominis consideratio breuem et anatomiam et physiologiam offert.

In ipsa tractandi ratione ERXLEBIVM, cuius elegantissimum compendium proxime indicabimus, BECKMANN, SCOPOLI et VNZERVM sequitur. Atque haec in genere indicata sufficiant, cum neque in minoribus erroribus, quos doctoris eruditio facile corriget, neque in aliis passim inspersis, lectu dignis observationibus, ulterius nos retinere possimus.

XV.

Toilette de Flore, ou essai sur les plantes et les fleurs, qui peuvent servir d'ornement aux dames; contenant les différentes manières de préparer les essences, pommades, rouges, poudres, fards et eaux de senteurs: auquel on a ajouté différentes recettes pour enlever toutes sortes de taches sur le linge, et sur les étoffes etc. En deux parties. Par

Z 5

M. B V-

M. BVC'HOZ, D. en M. à Paris. 1771.
chez Valade, avec préface, 8vo.
237. pag.

i. e.

Consideratio plantarum, quae mundo muliebri
inferuire possunt, auctore Cl. BVC'HOZ
M. D.

Sexui sequiori indicare remedia, quibus venu-
statem conseruare, eamque formosiores red-
dere possit, immo consilia ad corrigendos defe-
ctus et varii generis maculas addere, placuit hoc
in libello Cl. BVC'HOZ. Sed, si veritatem fateri
liceat, multa insunt huic libro, quae vel experien-
tiae lumine careant, vel feminis cognitu difficilli-
ma esse videantur.

p. 1. Opusculum ipsum in duas partes diuisum est,
quarum prima plantas ordine alphabetico enume-
rat, quae in mensis ornatis mulierum superbire
solent, et quae formulas pharmaceuticas secundae
partis ingrediuntur. Etenim plantae, quae laetis
floribus et viuidis coloribus sese commendant, a
sexu amabili sedulo conquiruntur: et hanc ob
causam Noster magnum earum numerum recen-
suit, neque minorem earum exhibet, quae morbis
illius medentur; ex quibus tamen multae adiectae
sunt, quarum vsus vel obsoletus, vel nondum
certo confirmatus est.

p. 63. Excipit primam hancce partem altera, quae
methodum, varia medicamenta cosmetica parandi,
delineat. Inuenies hic sat amplam copiam balneo-
rum, essentiarum, pigmentorum, vnguentorum
pommadinorum, puluerum, aquarumque destil-
latarum, quibus feminae pulchritudinem, ridiculo
saepe euentu, conseruare et alere student.

Ad

Ad calcem Cl. Auctor adiecit supplementa, p. 219. quibus continentur remedia, ad delendas ex linteis et aliis texturis maculas: his accedit methodus, diuersa tabaci sternutatorii genera conficiendi, illique bonum et gratum odorem conciliandi.

XVI.

Nova physico medica.

Societates scientiarum duae, quae *Philadelpiae* in America boreali, per aliquot annos floruerunt, die 2 ianuar. 1769. coniunctae sunt. Praeest semper huic societati scientiarum is, qui prouinciam gubernat. Inter socios eiusdem exteris reperimus Cll. viros LINNAEVM, BUFFONIVM, BERGIVM, HAHNIVM, cet. Colligit praeterea haec societas corpora naturalia, instrumenta et exemplaria. Sociorum sex classes constitutae sunt, quarum prima geographiam, mathematicam, physicam et astronomiam spectat, altera anatomiae et medicinae rationem habet, tertia historiam naturalem et chemiam attinet, quarta negotia et mercaturam curat, quinta mechanicae et architecturae se dicat et sexta persequitur oeconomiam. Commentaria vulgantur quidem; attamen grauitas et numerus eorum dirigunt vulgationem, eamque vel accelerant, vel retardant. Primam eius partem, cuius titulum nunc communicamus *), iam vulgarunt.

Societas *Bruxellensis*, non multum antea academia Caesareo regia scientiarum elegantiorum literarum et bonarum artium designata **), conuentu suo, die 3 aprilis 1773. habito, praemia, tribus quaestionibus dicata, distribuit.

Pri-

*) paulo infra, p. 368.

**) v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 716.

Primum, quaestioni: *quinam fuerunt nationis Belgicae ante septimum seculum vestitus, quatenam lingua etc.* *) proprium, Cl. RONDEAU medicinae doctor, et l'accessit Cl. HEYLEN philosophiae Professor acceperunt.

Alterum praemium Cl. MÜNNICHYSEN, et l'accessit Cl. GODART medicinae doctores obtinuerunt. Quaestio erat haec: *quodnam est remedium efficacissimum et paratissimum erucas arboribus plantisque inimicas destruendi etc.* **).

Tertium, dicatum quaestioni, *quatenam sint plantae in Belgio noxiae, quae venenata sua indole hominibus aequae ac bestiis officiant etc.* ***) Cl. CAELS medicinae licentiatus deportavit.

His peractis et in ordinem redactis rebus Eadem academia tres rursus quaestiones ad annum 1774, cum viris eruditis communicavit; quas liceat hic commemorare, etiam si, saltem quaedam, non omnino ad nos pertinere videantur.

Prima est: *quatenam sunt praecipuae mutationes, quae ex constructione magnarum abbatiarum, apud Batauos seculo septimo, et ex invasione Normanorum seculo nono in moribus, politia et consuetudine populorum huius provinciae productae sunt? (Quels sont les principaux changemens, que l'établissement des grandes abbayes aux Pays-Bas dans le 7^e siècle et l'invasion des Normands dans le 9^e ont apportés aux mœurs, à la police et aux usages des peuples de cette contrée?)*

Altera quaestio est ita formata: *quatenam mutationes litora praecipuorum fluviorum per Batauiam defluentium subiere, per quatenam studia ad imperium CAROLI QUINTI usque incolae quaesiverunt, hos fluviis navigationi aptiores reddere, vel ad varias urbes*

*) v. idem Volum. p. 152.

**) v. ibid.

***) ibid. p. 153.

urbes atque diuersa loca derivare? (Quels changemens ont subi les lits des principales rivières, qui arrosent les Pays-Bas: quels sont les travaux, qu'on a entrepris en différens tems jusqu'au regne de CHARLES QUINT, soit pour rendre ces rivières plus navigables, soit pour établir une communication entre elles et différentes villes ou divers cantons.)

Tertia eo redit: Conducitne distributio agrorum in circulos, in Angliâ usitata, agrorum novae adaptationi; quonam generatim optimo et efficacissimo modo terrae hae noviter adaptatae possunt fertiles reddi? (La pratique des enclos adaptée en Angleterre, est-elle avantageuse aux défrichemens, quel est en général, le moyen le plus prompt, le plus efficace de fertiliser les terres nouvellement défrichées?)

Qui praemia haec, singulum viginti quinque aureorum, ambient, elaborationes, Latine, Flammandice, vel Gallice conscriptas, ante 16 iulii 1774. Cl. GERARD, Secretario huius academiae perpetuo, tradant.

*Regia academia scientiarum atque literarum elegantiorum Berolinensis praemium theseos super arsenicum *) Cl. MONNET tribuit; l'accessit vero auctor elaborationis latinae, hoc dicto notatae: Jehova super mea etc. obtinuit.*

*Academia scientiarum Electoralis Moguntino Erfordiensis, experientissimum IOANNEM ERNESTVM NEUBÄVER et excellentissimum IOANNEM ERNESTVM IMMANVELEM WALCH *) sodales ordinarios physicae classis sibi associauit.*

In Academia Gryphiswaldina experientissimus atque excellentissimus CHRISTIANVS EHRENFRIED

*) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 355.

**) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 705.

FRIED WEIGEL facultati medicae adiunctus
et horto botanico praefectus est.

Lipsiae experientissimus et excellentissimus
IOANNES CAROLVS GEHLER *) physiologiae
professoris ordinarii munus auspicatus est die
5 septembr. 1773. programme *de prima fetus*
respiratione et oratione *de physiologia compa-*
rata.

Ibidem B. HAVBOLDO **) CHRISTOPHILVS
BENEDICTVS FVNCKIVS successit, et Physices
professor publicus ordinarius Lipsiae est factus.
Adiit hoc munus Vir excellentissimus disputatione
et programme *de ascensu fluidorum in tubis ca-*
pillaribus, commentatione prima et secunda et ora-
tione die 31 iulii 1773 habita: *de physices ad vi-*
tam communem usu.

Numerum medicorum, rei rusticae dicatorum,
potentissimus Rex Sueciae insigniter auxit. Quilibet
eorum stipendium annuum sexcentorum imperia-
lium obtinens, id attendere debet, vt obstetrices
iuste instituantur exerceanturque. Holmiae quo-
que tres medici cum stipendio annuo quadringen-
torum thalerorum designati, qui curam pauperum
medelamque suscipiant, dicuntur.

Ienae die 24 iulii 1773. experientissimus atque
excellentissimus CHRISTIANVS THEOPHILVS
MAYER medicinae doctor et professor extraordi-
narius publicus vigesimo septimo aetatis anno
phthisi pulmonali extinctus est.

Gedani

*) vid. comm. nostr. vol. hoc. p. 156.

**) vid. ib. vol. XVIII. p. 358.

Gedani Celebris physices Professor MICHAEL
CHRISTOPHORVS HANOW, aetate confectus
exeunte anno 1773. desiit viuere.

Argentorati nimis praematura morte erepti
sunt Cll. viri WEIGEN et FRIED*), arti obste-
triciae imprimis dicati finiente septembri, 1773.

Monetam, memoriae b. L. B. A SWIETEN
sacram, Augustissima et Clementissima Imperatrix
Romanorum MARIA THERESIA excudi iussit.
Conspicitur in parte aduersa imago magni huius
viri, induti vestibus praefecti Ordinis Regii San-
cti, Steph. circa quam haec verba leguntur: GER.
L. B. V. SWIETEN Ord. S. Stephan. Com. A.
Con. Aul. Arch. Co. Bib. P. In parte auersa appa-
ret illud superbum monumentum, in aede aulica pa-
trum Augustinorum exstructum, cuius non mul-
tum ante mentionem fecimus**), et ita inscriptum:
MARIA THERESIA Augusta memoriae GER.
Lib. B. VAN SWIETEN. Nat. 7. mai. 1700. de-
nat. 18 iun. 1772. Ob doctrinam et integritatem.

Parisiis iam litterae publicae salubres (*gazette
de santé*) a salutaribus (*gazette salulaire*) prorsus
diuersae prodeunt. Auctor earum doctor regens
facultatis Parisinae dicitur, qui simplici scribendi
genere cum lectoribus res medicas communicat.
Nec minus et scripta noua, disputationibus exceptis,
ibi inferuntur. Ac potissimum quidem Cl. Auctor
in occupatione inuentorum nouorum ex physica et
historia naturali versabitur.

Gothae

*) vid. comm. nostr. Vol. XV. p. 553.

**) vid. ib. Vol. XVIII. p. 543.

Gothae excellentissimus atque experientissimus IOANNES ANDREAS BIEBER, deliciis botanicis captus, iam per multos annos foliorum exsiccationi, macerationi et praeparationi infixus, eorum sceleta iam exhibet, quae bonitate atque elegantia Ruyschianis haud cedunt. Quae vero, prouti ad notitiam botanices et plantarum collectioni necessaria, ita historiae naturalis cultoribus grata fore acceptaque sperat: quorum quidem decadem chartae papyraceae nigrae cum nominibus Latinis Linnaeanis et Germanicis appositis, quibuslibet Lipsiensi nundinis, amicis duorum et dimidii thalerorum pretio offert.

Haec in prima decade continentur: *Acer Pseudo-Platanus*, *Acer campestre*, *Pyrus*, *Crataegus torminalis*, *Salix caprea*, *Tilia Europea*, *Populus tremula*, *Populus alba*, *Populus balsamifera*, *Buxus sempervirens*.

XVII.

Index scriptorum physico medicorum, quae anno 1771. prodierunt.

Catalogue hebdomadaire : etc. Année. 1771. 8.

Philosophical transactions; giving some account, of the present undertakings, studies and labours, of the ingenious in many considerable parts of the world. Vol. LX. for the year. 1770. Lond. 4. c. fig.

Transactions of the American philosophical society held at Philadelphia, for promoting useful Knowledge Volume I. ib. 4.

Medical observations and inquiries by a society of Physicians in London. Vol. IV. ib. 8. c. fig.

Essais

Essais and observations physical and literary, read before the philosophical society of Edinburgh. Edinb. 4. c. fig.

Histoire de l'academie royale des sciences, année 1769. avec les mémoires de mathematiques, et de physiques, pour la même année. Tirés de registres de cette academie. à Paris. 4. c. tab. aen.

Recueil des pieces, qui ont remporté le prix de l'academie royale des sciences. Tom. VIII, qui contient une partie des pieces de 1753. celles 1756 et 57. et le reste de celles de 1760. ib. 4. (*Auctore* DE LA LANDE).

Choix de meilleurs mémoires de mathematique et de physique de la société royale de Montpellier. ib. 4. (*Est novus titulus libri iam vulgati. v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 545.*)

Séance publique de l'academie des sciences. à Besançon. 4.

Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen te Haarlem XIII. Deel. Te Haarlem. 8. c. fig.

Verhandelingen uitgegeeven door het zeeuwsch genootschap der weetenschappen te Vlissingen. — Tweede Deel. Te Middelburg. 8. mai. c. f.

Histoire et mémoires de la société formée à Amsterd. en faveur des noyés. à Amsterdam. 8. Voll. 3.

Kongl. Vetenskaps akademiens handlingar, for aor 1771. Vol. XXXII. Stockh. 8. c. fig.

Der Königlich Schwedischen Academie der Wissenschaften Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltung, der Mechanick, auf das Jahr 1771. Tom. XIX. P. II.

A a

Aus

Aus den Schwedischen übersetzt, von ABRAH. GOTTHELF KAESTNER. 31ster Band. Hamb. u. Leipz. 8. m. K.

Zwiefaches Universalregister über die ersten XXV Bände, von den Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanick, der Königl. Schwedischen Academie der Wissenschaften, nach der deutschen Uebersetzung des Herrn Hofraths KAESTNERS gefertigt, Leipzig. 1771. 8.

Atti dell' academia delle scienze di Siena detta dei fisico critichi. Tomo IV. In Siena. fol. c. f.

Acta philosophico - medica societatis academicae scientiarum principalis Hassiacae. Gieslae Cattorum. Francof. et Lipsi. 4.

Auserlesene medicinische, anatomische und botanische Abhandlungen, der Römisch - Kayserl. Akademien der Naturforscher. 10ter Theil. Nürnberg. 4. m. K.

Histoire de l' academie royale des sciences et belles lettres année. 1768. à Berlin. 4. c. f.

Berlinische Sammlungen. 4ter Band. ib. 4. (Auctores Cl. MARTINI.)

Neues Hamburgisches Magazin. 10ter Band. Hamb. 8.

Novi commentarii societatis Regiae scientiarum Gottingensis. Tom. II. Gotting. 4. c. f.

Deutsche Schriften der Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 1ster Band. ib. 8. m. K.

Physicalisch - oekonomische Bibliothek, worinnen von den neuesten Büchern, welche die Naturgeschichte, Naturlehre, und die Land- und Stadtwirthschaft betreffen, zuverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden. III. Band. ib. 8. (Auctore Cl. BECKMANN.)

Neue

Neue Sammlungen auserlesener Wahrnehmungen, aus allen Theilen der Arzneywissenschaft. Aus den Französischen übersetzt. Fünfter Band, oder 14ter Band der ganzen Sammlung. Strasburg. 8. m. K.

Observations curieuses sur toutes les parties de la physique, extraites des meilleurs mémoires. à Paris. 8. c. f. Vol. I – IV. (Iam prodiit 1719. huius libri pars prima. Auctore P. BOUGEANT eodem titulo, multaque continet recentiorum conaminibus magis correcta.)

Auszüge aus den besten ausländischen Wochen und Monathschriften für das Jahr 1771. XIII. und XIV Theil. Hanau. 8.

Mannichfaltigkeiten. Eine gemeinnutzige Wochenschrift, des 2ten Jahrganges 3tes und 4tes Vierteljahr. Berlin. 8. mai.

Schlesischer Landwirth in Patriotischer Freyheit. Breslau. 8. mai.

The farmer's letters to the people of England, to which are added occasional tracts on Husbandry and rural oeconomies. Lond. 8. mai. (Auctor est ARTHUR YOUNG et editio tertia.)

Monathliche Beschäftigungen für einen Baum- und Pflanzen-Gärtner bey Wildnissen, Pflanzungen, Pflanzschulen, Obstbäumen, Spalieren, Orangerien und Gewächshäusern, auch Forsten mit Kupfern, als eine Zugabe zum fünften Theil des Hausvaters. Hannover. 8.

Der Arzt der Frauenzimmer. Eine medicinische Wochenschrift. Erster Band. Leipz. 8.

Bemerkungen der Churpfälzischen physicalisch-oeconomischen Gesellschaft von Jahre 1770. Erster und andrer Theil. Mannheim. 4.

Abhandlungen und Erfahrungen der fränckisch-physicalischen - oeconomischen Bienengesellschaft auf das Jahr 1771. Nürnberg. 8.

Mémoires et observations recueillies par la société économique de Berne. Part. I - IV. pour l'année 1770. à Berne. 8.

Abhandlungen und Beobachtungen der oekonomischen Gesellschaft in Bern. 1769. Bern. 8. mai.

Berliner Beyträge zur Landwirthschafts - Wissenschaft, sowohl aus der Theorie, als Erfahrung. I - 5tes Stück. Berlin. 8. mai.

Anzeige von der Leipziger oekonomischen Societät in der Ostermesse 1771. nebst Auszügen bey derselben eingelaufenen halbjährigen Nachrichten. Dresden. 8.

Schriften der Leipziger ökonomischen Societät. Erster Theil. ib. 8. mai. m. K.

Encyclopédie oeconomique ou systême général d'oeconomie rustique, d'oeconomie domestique et politique. Ouvrage extrait des meilleurs livres, qui ont paru iusqu' à ce iour sur ces matieres, traités chacune, par des personnes instruites, principalement, par une constante expérience: le tout revu par quelques membres de la société oeconomique de Berne. Tom. VIII-XI. Yverdon. 8. mai.

Der Königl. Großbritt. Churfürstlich Braunschweig Lüneburgischen Landwirthschaft Gesellschaft Nachrichten von Verbesserung der Landwirthschaft und des Gewerbes. Zweyten Bandes 5te Sammlung. Zelle. 8.

Ueber die Abstellung des Herrendienstes. Braunschweig und Hildesheim. 8.

Betrachtungen über das heutige Gartenwesen, durch Beyspiele erläutert. Leipz. 8. (Est translatio Anglici libri: observations on modern gardening, qui prodiit. Londini. 1767. per Cl. ZEHER.)

Der wohlunterrichtende Gärtner, welcher nicht nur von den Obst- und Küchengarten, vornehmlich der Baumzucht, zuverlässigen Unterricht ertheilet, sondern auch viele neue Versuche entdeckt. Nach der neuesten vielvermehrten Auflage, aus dem Französischen übersetzt, und auf den deutschen Erdstrich praktisch eingerichtet. Bayreuth und Leipzig. 8.

Vom Getreidemagazinen, von Lebensmitteln, und von dem Unterhalte des Volcks. Franckf. am Mayn. 8.

Treugemeinte Aufmunterung des Baden Durlachischen Landmannes zu der Bienenzucht; wobey die großen Vortheile derer Magazinkörbe, vor denen bishero gewöhnlichen einzelnen Behältnissen gezeigt werden. Carlsruhe. 8. m. K.

Die nützliche Biene oder Anweisung, wie man zu allgemeinen Besten eines Landes, die Bienen vermehren, erhalten, und benützen könne; aus unterschiedlichen Büchern, und eigener Erfahrnüß zusammen getragen. Franckf. und Leipz. 8.

Kurzgefaßte Beschreibung verschiedener Maschinen, und eines Koch und Bratofens zum Gebrauche und Nutzen der Oeconomie zu Closterbergen, in Großen errichtet. Leipzig. 8. m. K.

Traité de la nature et de l'utilité des pommes de terre. Par un ami des hommes. à Lausanne. 8. (Auctor dicitur LAYNEL.)

Traité des bois et des différentes manières de les
femer, planter, cultiver, exploiter, transpor-
ter et conserver; nouvelle édition. à Paris.
8. Voll. 2.

*Patriotische Anleitung zur Verbesserung des Acker-
baues. Leipz. 8.*

*Zur Aufnahme der Landwirthschafft. Zweyte und
verbesserte Auflage. Rostock. 4.*

Eiusdem libri altera pars. ib. 4.

*Eine Anleitung für die Landleute, in Absicht auf die
Beförderung der Fruchtbarkeit, durch die Ver-
mischung verschiedener Erdarten, und geschickter
Bearbeitung des Landes. Zürich. 8.*

*Sichere Anleitung, wie man bey diesen theuren Zeiten
wohlfeil, und gut leben könne. Anspach. 8.*

*Forstcalender oder Anweisung für die Förster, was sie
das ganze Jahr durch zu beobachten und zu ver-
richten haben. Rostock. 8.*

*Allgemeiner Landwirthschafts- Calender, auf das Jahr
1721. Zweyter Jahrgang. Stuttgard. 4.*

Le bon jardinier almanach pour l'année Bissextile
1772: contenant une idée générale de qua-
tre sorte de jardins, les regles pour les
cultiver, la manière de les planter et celles
d'élever les plus belles fleurs. à Paris. 12.

Histoire naturelle générale et particulière, avec la
description du Cabinet du Roi. Tom. XVII.
à Paris c. f. (Auctore Cl. BUFFON.)

La nature considérée, sous ses différens aspects:
ou lettres sur les animaux, les végétaux et les
minéraux etc. 1 cahier à Paris. 12.

La nature considérée sous ses différens aspects; ou
lettres sur les animaux, les végétaux et les
miné-

minéraux; contenant des observations intéressans sur l'histoire naturelle, les mœurs, et le caractère des animaux, sur la minéralogie, la botanique etc. et vn detail de leurs différens usages dans l'oeconomie domestique et rurale. Sécond cahier. ib. 12.

Natuurlyke historie of uytvoerige beschryving der dieren, planten en mineralien, volgens het samenstel van CARL LINNAEVS. Te Amsterdam. Eerste Deel. XV Stück. 8.

Neue physicalische Belustigungen. 2ten Bandes. 1ste Abtheilung. Prag. 8. mai. m. K.

Synopsis of quadrupeds. Chester. 8. c. f. (*Auctore* THOM. PENNANT.)

Mémoires de l'éléphant, écrits sous sa dicté et traduits de l'Indien, par un Suisse. à Paris. 8.

Versuch einer teutschen Nomenclatur der Linnäischen Gattung zur Uebersetzung der generum plantarum LINNAEI. Erfurth. 8.

Index plantarum horti botanici Halensis. Hal. Magdeb. 8. (*Auctore* PHIL. CASP. IVNG-HANSS.)

Fasciculus plantarum cum novis generibus et speciebus. Lisabon. 4. c. f.

Mineralogische Belustigungen zum Behuf der Chymie und Naturgeschichte des Mineralreichs. Sechster und letzter Theil. Leipz. 8. m. K.

Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen in einem ausführlichen Auszuge. Neunter Band. Berlin. 8.

Allgemeine Reisen zu Wasser und zu Lande. 2oster Band. Leipzig. 4. c. f.

Voyage autour du monde par la frégate du Roi la Bouteuse et la flûte, l'étoile en 1766. 1767. 1768.

1769. à Paris. 4. c. f. (*Auctore* DE BOVGAINVILLE).

The farmer's tour through the east of England, being the register of a journey through various countries of this kingdom, to enquire into the state of agriculture with other subjects, that tend to explain the present state of English husbandry. By the Author of the farmer's letters and the tours through the Nord and south of England. In four Volumes. London. 8.

A tour in Scotland 1769. Chester. 8. (*Auctore* CL. PENNANT.)

Reise durch Sicilien und Großgriechenland. Zürich. 8.
(*Auctor* CL. RIEDESEL *dicitur et varia continget, ad historiam naturalem spectantia.*

De la fermentation des vins et de la meilleure manière de faire l'eau de vie: mémoires qui ont concouru pour le prix proposé en 1766. par la société royale de l'agriculture de Limoges. à Lyon et à Paris. 8.

Abhandlung von Potaschfieden und Versuche zur Bestimmung des wahren Gehalts verschiedener Pflanzen zur Potasche. Dresden. 8.

Beschreibung dreyerley bequemer Hausapotheken, aus Tissots Anleitung für den gemeinen Mann. Bremen. 8.

Pharmacopoea Helvetica, in duas partes divisa, quarum prior materiam medicam botanico-physico-historico-medice descriptam; posterior composita et praeparata; modum praeparandi, vires et vsum exhibet. Scitu et consensu gratiosi collegii medici Basileensis digesta, praefatus est ALBERTVS DE HALLER: Accedunt syllabus medicamentorum in classes

ses diuifus et duo indices neceffarii, primus morborum et curationum; alter trilinguis Lat. Germ. Gall. Bafileae. fol.

Pharmacopée de Londres traduit de l'Anglois de M. PIMPERTON avec des notes. à Paris 4.

Laboratoire de flore: ou chymie champêtre végétale contenant la manière de faire, avec les plantes, les liqueurs, les ratafiats, les effences, les huiles, les eaux cosmetiques et officinales etc. pour fervir de fuite à la Toilette de flore. à Paris. 12. (*Auctor creditur Cl. BUCHHOZ.*)

Dictionnaire anatomique. Vol. I et II. à Paris. 8.

Briefe eines Arztes an die Frauenzimmer, oder Regeln der Kunst, die Gesundheit und Schönheit zu erhalten. Aus den Englischen. Leipz. 8.

Plan über die Einrichtung der Gesundheitsversicherungs - Gesellschaft. Aus den Französischen. ib. 4.

Dictionnaire portatif de santé 4. ed. auët. à Paris. 8.

Le médecin des hommes depuis la puberté jusqu'à l'extrême vieillesse. ib. 12.

Le médecin des dames, ou l'art de les conserver en santé ib. 12.

Physicalische Abhandlungen über die Schädlichkeit der Federbetten. Berlin. 8.

Die Haushaltungskunst im Kriege und in der Theurung, nebst den dazu gehörigen Policeyanstalten, und einer Anzeige der vornehmsten Pflanzen und Gewächse, die statt des Brodtes zur Nahrung dienen können. Stuttgart. 8.

Aufmunterung und Anleitung zur Verfertigung guten und schmackhaften Brodtes. Zürich. 8.

De la salubrité du Coffé. à Genève. 12.

Der Einwohner in Franckfurt am Mayn, in Absicht auf seine Fruchtbarkeit, Mortalität und Gesundheit geschildert. Franckf. 8. m. K.

Dictionnaire de diagnostic, ou l'art de connoître les maladies et de les distinguer exactement les unes des autres. à Paris. 12.

Nachricht von der Kriebelkrankheit welche im Herzogthum Lüneburg, 1770. et 1771. grassiret, und wie selbige geheilet worden. Zelle. 8.

Dissertation sur les vapeurs et les pertes de sang. à Paris. 12.

Avis aux meres sur la petite vérole et la rougeole, ou lettres de M. de ***. sur la manière de traiter et de gouverner les enfans dans ces maladies, suivie d'une question proposée, à MM. de la société royale des sciences de Montpellier. à Lyon et à Paris. 12.

Some remarks on CADOGAN'S diss. on the gout and all chronic diseases jointly considered. Lond. 8.

Manuel du ieune chirurgien, contenant toutes les vérités anatomiques, physiologiques et pratiques, dont la connoissance constitue le véritable chirurgien et un precis de pharmacie chirurgicale, avec quelques formules des plus communes des remèdes internes et les doses des médicamens, simples et composés. Nouvelle édition augmentée d'une pharmacopée chirurgicale, théorique et pratique, avec des notes et des éclaircissiemens sur chaque composition; une introduction dans laquelle on examine les indications curatives particulières, qui demandent l'usage des médicamens, et ou l'on fait connoître la nature et l'efficacité

cité de différens simples, dont on se sert. Tom. I et II. à Paris. 12.

Diſtionnaire vétérinaire des animaux domeſtiques. ib. 8. c. f.

Gründliche Anleitung, worinnen die ſo gefährliche als höchſtſchädliche Seuche bey dem Hornvieh erklärt wird, neſt Entdeckung der Uebel dieſer Seuche, und vollkommenen Heilungsart derſelben: Aus den allerneueſten franzöſiſchen Beobachtungen der école vétérinaire, in das Deutſche überſetzt. Wien. 8.

Bewährte Arzneymittel für das Rindvieh, Schweine, wie auch Gänſe und Hühner. Franckf. 8.

Anweiſung zur Abwartung des Hornviehes, in Abſicht der Seuche von einem Landmanne an der Niederweſer. Bremen. 8.

Neuvermehrtes Viehbüchlein, darinnen zu finden allerhand bewährte Haußarzneymittel, die Krankheiten des Rindviehes, Schaafe, Ziegen, Schweine etc. Schleitz. 8.

Lebensordnung für das Rindvieh. f. l.

Mélanges curieux et intéreſſans des divers objets relatifs à la phyſique, à la médecine et à l'hiſtoire naturelle, à Avignon. 12. mai. (Auctore Cl. HAGVENOT).

Observations ſur la phyſique, ſur l'hiſtoire naturelle et ſur les arts. Tom. II. à Paris.

Anatomique et chirurgical traité d'après les meilleurs maitres anciens et modernes en médecine et en chirurgie. ib. 8. Voll. 2.

Manuel des médecins: ou recueil d'aphorismes tirés des ouvrages d'HIPPOCRATE et de CELSE. Ouvage tres utile aux chirurgiens. ib. 12.

Secrets utiles et éprouvés dans la pratique, de la médecine et de la chirurgie, pour conserver la santé et prolonger la vie etc. Ouvrage utile à tous les chirurgiens, sages - femmes, curés etc. ib. 12.

Medicinisches und chirurgisches Handbuch für angehende Wundärzte, und andere Liebhaber der Arzneywissenschaft. Aus dem Englischen übersetzt. Franckfurt und Leipzig. 8.

Sammlungen von Beobachtungen aus der Arzneygelehrtheit. Dritter Band. Nordlingen. 8. (Auctore PHIL. AVGVST. GESNER.)

Aduersaria medico practica. Vol. II. Pars I. II. III. Lips. 8. c. f.

Offenbahrung natürlicher Einsichten verschiedener Heimlichkeiten, die Wesenheit des Magnets und aller magnetischen Anziehungskraft, wie auch die verborgene und noch nicht gründlich genug erkannte Heimlichkeit des Feuers betreffend. 8. s. l.

Unterricht von Pferden, Kühen, Schaafen und Schweinen, wie man dieselben warten und aufziehen muß, ingleichen von ihren Kranckheiten u. s. w. Erster Theil auf Königlichen Befehl herausgegeben von P. E. ABILDGAARD D. M. Kopenhagen und Leipzig 8. m. K.

Commentatio epistolaris de insitione variolarum, ad auunculum suum, aeterne colendum, virum illustrem et celeberrimum D. GEORG. GOTTLLOB RICHTER, qua simul de quinquagenarii doctoratus secularibus sacris et septuagesimo octauo natali die pie gratulatur IO. FRIDERICVS ACKERMANN. Kilonii. 8.

IO. FRID. ACKERMANN commentarius obseruationum physico astronomicarum et meteorologicarum. Kilon. 4. c. f.

EIVSD. diff. de morbo et sectione fulmine nuper adusti. ibid. 4.

EIVSD. diff. inaug. obseruationes quasdam chirurgicas complexa. Resp. *Adolph. Frid. Vogel.* ib. 4.

Anmerckungen über das Bierbrauen von D. CARL BENIAMIN ACOLVTHEN auf Semmichau. Budissin. 8. m. K.

AEPINI *zwo Schriften von der Aehnlichkeit der electrischen und magnetischen Kraft, und von den Eigenschaften des Tourmalins. Aus den Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Grätz. 8. mai.*

Observations on the external use of lead, with some general remarks on topic medicines. By JOHN AITKIN. Lond. 8. mai.

EIVSD. essays on several important subjects in surgery, chiefly on the nature and cure of fractures. ib. 8. mai.

An experimental enquiry concerning the causes which have generally been said to produce putrid diseases. By WILL. ALEXANDER. ib. 8. mai.

CHRIST. ALLARDI diff. de respirationis mechanismo. Groning. 4.

P. C. AMMANNI quadrans' astronomicus descriptus, examinatus inspeculo vranico Ingolstadtienfi. Aug. Vindel. 4. c. f.

Dissertations sur la dilatation des artères et sur la sensibilité, appuyées de plusieurs expériences, faites sur les animaux vivans, aux quelles on a joint deux observations, sur l'hydropisie du peritoine. Par M. ARTHAUD Lic. en médéc. à Paris. 8. mai.

Second


Sécond mémoire sur l'action d'un feu égal violent et continué pendant plusieurs iours sur un grand nombre de terres, de pierres et de chaux métalliques essayées pour la plupart telles, qu'elles sortent du sein de la terre. Lu à l'academie royale des sciences le 7 et 11 mai. 1768. Par M. D'ARCEY ib. 8. mai.

An essay on the diseases most fatal to infants. To which are added rules to be observed in the nursing of children: with a particular view to those, who are brought up by Hand. By GEORG. ARMSTRONG. Lond. 8. (*Editio prima prodiit. 1767. Ibidem.*)

Mémoire sur la maladie epizootique du pays Laonnois. Par M. AVGIER DV FOT. à Laon. 8.

Antidote ou examen du mauvais livre, superbement imprimé, intitulé: Voyage en Sibérie Par l'Abbé CHAPPE D'AUTEROCHE. Amsterdam. 8.

Reliqua proxime.



Contenta in hac parte.

I.	Medical Transactions in London. Vol II.	p. 195
II.	<i>Vermehrtes und verbessertes Blackwelli- sches Kräuterbuch etc. Fünftes u. sechstes hundert</i>	224
III.	KNORRS <i>allgemeines Blumen, Kräu- ter, Frucht - und Gartenbuch</i>	230
IV.	KEMME <i>Einleitung in die Medicin über- haupt</i>	233
V.	Mémoires et observations anatomi- ques, physiologiques et physiques sur l'oeil etc. par M. IANIN	238
VI.	Novi commentarii Gottingens. Tom. I et II	255
VII.	VOGEL <i>academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis C. H. affectibus</i>	267
VIII.	FAVKEN <i>das in Wien im Jahre 1771 und 1772. sehr viele Menschen anfallen- de Fäulungsfieber etc.</i>	289
IX.	Recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires. Tom. II. Par. M. RICHARD DE HAVTESIERCK	292
	X. Ver-	

- | | | |
|-------|--|-----|
| X. | Verhandelingen uitgegeeven door de
Hollandsche maatschappye der wee-
tenschappen te Haarlem XIII. Deel | 318 |
| XI. | The natural history of the human
teeth etc. By HUNTER. | 325 |
| XII. | Synopsis of Quadrupeds (By PEN-
NANT) | 334 |
| XIII. | BECKMANNI Linnaeani systematis epi-
tome | 359 |
| XIV. | RICHTERS <i>Lehrbuch einer Naturhisto-
rie</i> | 360 |
| XV. | Toilette de Flore par M. BUC'HOZ. | 361 |
| XVI. | Nova physico medica | 363 |
| XVII. | Index scriptorum physico medicorum,
quae anno 1771. prodierunt | 368 |
-